＜表3＞ 水生生物調査 結果一覧（令和4年度）

	河川名	調査団体名	調査地点名	調査日時	天気	水温（℃）	川幅（m）	生物採取場所	水深（cm）	流れの速さ	川底の状態	水質階級	指標生物の出現状況																										
													Ⅰ きれいな水										Ⅱ ややきれいな水								Ⅲ きたない水						Ⅳ とてもきたない水				
													アミカ類	ナミウズムシ	カワゲラ類	サワガニ	ナガレトビケラ類	ヒラタカゲロウ類	ブユ類	ヘビトンボ	ヤマトビケラ類	ヨコエビ類	イシマキガイ※	オオシマトビケラ	カワニナ類	ゲンジボタル	コオニヤンマ	コガタシマトビケラ類	ヒラタドロムシ類	ヤマトシジミ※	イソコツブムシ類※	タニシ類	ニホンドロソコエビ※	シマイシビル	ミズカマキリ	ミズムシ	アメリカザリガニ	エラミミズ	サカマキガイ	ユスリカ類	チョウバエ類
1	葛谷川	高松市	新葛谷橋	8/1	晴	23.6	2.0	中心	10	普通	1	Ⅰ				●		●			●	○					○													○	
2	春日川	高松市	大亀新橋上流	8/1	晴	22.0	3.0	右岸	15	速い	1	Ⅰ									●	○			○									○							
3	春日川	高松市	元山橋	8/1	晴	26.5	2.0	中心	5	遅い	3	Ⅰ										●																			
4	香東川	高松西高	御殿橋	7/31	晴	29.5	3.5	左岸	23	遅い	2,3	Ⅲ																							●						
5	香東川	高松商業高	潜水橋付近	7/17	晴	28.0	20.0	中心	30	遅い	3,5	Ⅲ																●		●			●					○		
6	本津川	高松市	上流	8/1	晴	24.6	2.0	左岸	5	遅い	2	Ⅰ		●		●	○	○			○													○						
7	本津川	高松市	悠悠香南前	8/1	晴	30.0	0.4	左岸	10	遅い	3	Ⅱ									○				●									○			○			
8	本津川	高松市	本津川橋上流	8/1	晴	32.0	20.0	右岸	30	遅い	2	Ⅳ					○																						●	
9	綾川	綾川中	柏原渓谷(タツタの森 西1km)	8/2	晴	26.0	4.0	右岸/中心/左岸	30	普通	1	Ⅰ		●	○			○		○	○			○	○		○	○	●											
10	綾川	綾上小	綾上小学校横	6/16	曇	22.5	2.5	左岸	30	遅い	3,7	Ⅱ										○					●							●						
11	綾川	綾川中	綾上小学校東	8/2	晴	26.0	10.0	右岸/中心/左岸	30	遅い	1,2	Ⅱ		●													○		●	○										
12	綾川	綾川中	御山大橋	8/2	晴	27.0	12.0	右岸/中心/左岸	30	遅い	2,3	Ⅱ															○		○					○						
13	綾川	羽床小	宮武橋 上流部	7/8	雨	24.2	2.0	右岸	40	普通	2	Ⅰ		○				○		○		●					○							○	○	○	○				
14	綾川	府中小	府中町城山橋上流付近	9/29	晴	20.0	20.0	右岸	20	普通	2,3,5,6,7	Ⅱ															●						●							
15	大東川	宇多津小	大東川富士見橋南側	9/16	晴	28.0	40.0	中心	10	普通	3,4	Ⅲ											○							●		●	○	○	○	○					
16	土器川	大手前丸亀中・高	城東小東	7/26	晴	32.0	3.2	右岸	23	遅い	3,5,7	Ⅱ			○	○							○					○	●	○	●	○		●							

＜表3＞ 水生生物調査 結果一覧（令和4年度）

	河川名	調査団体名	調査地点名	調査日時	天気	水温（℃）	川幅（m）	生物採取場所	水深（cm）	流れの速さ	川底の状態	水質階級	指標生物の出現状況																										
													Ⅰ きれいな水										Ⅱ ややきれいな水							Ⅲ きたない水						Ⅳ とてもきたない水				
													アミカ類	ナミウズムシ	カワゲラ類	サワガニ	ナガレトビケラ類	ヒラタカゲロウ類	ブユ類	ヘビトンボ	ヤマトビケラ類	ヨコエビ類	イシマキガイ※	オオシマトビケラ	カワニナ類	ゲンジボタル	コオニヤンマ	コガタシマトビケラ類	ヒラタドロムシ類	ヤマトシジミ※	イソコツブムシ類※	タニシ類	ニホンドロソコエビ※	シマイシビル	ミズカマキリ	ミズムシ	アメリカザリガニ	エラミミズ	サカマキガイ	ユスリカ類	チョウバエ類
17	金倉川	豊原小	健康橋下流	6/10	晴	22.0	14.0	右岸	15	遅い	6	Ⅲ		○		○						●			○		○		○		○	○	○		●	○	○		○	○	○	○
18	弘田川	四箇小	山階橋下流	6/9	晴	21.0	3.0	中心	20	遅い	2	Ⅲ		○								○								○	○	○	○	●	○	●					

・ 生物採取場所　　:中心（川の中心）、 右岸（上流から見て右岸）、 左岸（上流から見て左岸）

・ 流れの速さ　　:速い（60cm以上/秒）、 普通（30～60cm/秒）、 遅い（30cm以下/秒）

・ 川底の状態　　:1（頭大の石が多い）、 2（こぶし大の石が多い）、 3（小石と砂）、4（コンクリート）、 5（砂と泥）、 6（泥）、 7（コケ）、 8（その他）

・ 指標生物の出現状況　:○見つかった指標生物、 ●見つかった指標生物のうち、数が多かった上位から2種類

・ 水質階級の判定方法　:Ⅰ～Ⅳの水質階級ごとに、○印と●印の数の合計（A）、●印だけの数の合計（B）を求める。

合計（A）と合計（B）の合計（C）を求める。

合計（C）が最も大きい水質階級を、その地点の水質階級と判定する。

・ ※は、海水の少し混ざっている汽水域(きすいいき)の生物