

我が家の家庭果樹



大川普及センター

掛鯛 吉洋

家庭果樹を育てる楽しみと云えば自分で収穫することでしょう。今月号では、収穫を中心に話します。

収穫

ウメ

甲州最小などの早生種はすでに収穫したと思いますが、大玉系の品種はこれから収穫時期を迎えます。梅酒用などは青ウメと呼ばれ、果実表面の柔らかい毛がなくなり光沢を帯びてきたころ（果実が黄化する前）収穫し、梅干し用などは漬けウメと呼ばれ樹上で完熟させてから収穫します。

品種	樹勢	樹姿	果実重	果形	収穫時期	耐病性	開花期	その他の特性
豊後小梅	強	やや直立	5g	円形	5月中下旬	中	早	
甲州最小	◇	◇	◇	宝珠形	5月下旬	中	やや早	結実安定、家庭用梅干に適する
佐藤小梅	◇	◇	◇	◇	◇	中	早	
月世界	やや強	◇	20~25g	豊円形	6月上中旬	強	やや遅	生理落果少ない
鶯宿	強	◇	28~32g	◇	6月中下旬	強	中	外観良く梅酒用、やにぶき果多
高南	強	やや開張	25~30g	楕円形	6月下旬	強	◇	結実安定、梅干用の優良品種
古城	◇	やや直立	◇	豊円形	6月中下旬	強	◇	花粉少ない、梅酒用

オウトウ

品種ごとに満開後の日数でおおよそその収穫適期がつかめます。また、成熟期に近づくと、降雨による裂果が起きやすいので溝切りによる排水対策や雨よけテントなどの設置をお勧めします。

品種名	両親、来歴	果						熟期※	目安	
		果形	果重g	糖度%	酸	果皮色	果肉硬さ			
セネカ	アメリカ、日の出の実生	長心臓	3~4	12~14	多	鮮赤~紫赤	極多	軟	30~40	5/中下
香夏錦	福島、佐藤錦×高砂	短心臓	4~5	13~15	少	黄色赤斑	中	軟	35~45	5/下
ジャンボ錦	青森、偶発実生	長心臓	5~7	14~17	少	黄色赤斑	中	軟	41~50	6/上
高砂	アメリカ、福寿の実生	短心臓	5~7	14~17	少	黄色赤斑	中	やや軟	41~50	6/上
佐藤錦	山県、ナポリレオン×實王?	短心臓	5~7	15~19	少	黄色微赤斑	少	硬	46~55	6/上中
ナポリレオン	不明	長心臓	6~8	14~17	多	黄色微赤斑	中	硬	51~60	6/中

※熟期は満開から収穫までの日数


ピワ

成熟期は果実の成る位置により異なり、樹の下部より上部が、樹の内外部より外部に成った果実のほうが早く成熟します。

品種名	来歴	果実			樹勢(樹姿)	特性(農所)	留意点
		果重g	果形	糖度			
長崎早生	茂木×本田早生	40~50	卵形	12~13度	5月下旬~6月上旬 強(直立性)	食味良好、香氣あり、早生としては耐薬性あり	がんしゅ病に弱い
茂木	偶発実生	40	卵形	11~12度	6月上旬~中旬 強(直立性)	食味良、生産安定	がんしゅ病に弱い
田中	偶発実生	60	短卵形	10~11度	6月下旬 強(開張性)	大果、耐薬性あり	がんしゅ病に弱い

袋かけ (モモ、ブドウ、リンゴ、ナシ)

袋かけは、主に果実に発生する病気や害虫の侵入を防止するために行います。殺虫剤などの散布回数を極力減らしたい方には重要な作業ですので、摘果作業が終了しだい作業にかかりましょう。



モモの場合

ブドウの場合

キウイフルーツの摘果

基本的には、葉数5~6枚に1果の割合で残します。

