

我が家の家庭果樹



大川普及センター
掛網 吉洋

今回はモモ、ピワとカキの摘果の管理についてお話します。

モモの管理

モモの果実は成熟期の20日前から急に大きくなり始め、その変化は成熟直前まで続きますので次のことに注意してください。

- ・梅雨明け後、晴天が1週間以上続くようであれば灌水をします。反対に、梅雨が長く続くようであれば、排水を良くするために溝切りを行います。
- ・果実の重みで枝が重なる場合は、竹などで支柱をし、枝の間隔を保ちます。
- ・垂直に伸びた長い枝（徒長枝）が多く発生している場合は、徒長枝を間引きし木漏れ日程度の明るさに調整します。
- ・モモは傷みやすいので収穫適期を逃さず丁寧に収穫します。日当たりの良い樹の上部や外回りの果実が早く成熟しますので、そのようなものから収穫します。
- ・収穫時期を地色のぬげぐあいと判断する場合は、無袋の果実で青みがうすれて緑白色になった時期、有袋の果実で青みがほとんどぬけて黄緑色になった時期が目安です。

カキの摘果

着果程度は、1枝に1果程度にしますが、これよりやや少なくなると大きな果実が収穫できません。へたが大きく無傷なものを中心に残しましょう。将来、枝に挟まれる果実やとりの果実とくつつく果実は落としましょう。

(富有の摘果の目安)



前年の枝から7本以上新梢が発生したものを。
5～6本程度発生
3本程度発生

●摘果する果実
○残す果実

ピワの管理

芽かき……収穫後、発生する新梢はハサミで1枝あたり1～2本に整理します。せん定……混み合った枝の除去や長く伸び垂れ下がった枝を短縮します。



芽かき後
芽かき前

混み合った枝の間引き



枝の短縮

品種名	来歴	果実			花粉の有無	特性(産所)	留意点
		果重(g)	着色	日持ち性			
ちよひめ	高陽白桃×さおとめ	180	10～11	良	有	6月中下	小玉、糖割れ多い
武井白鳳	白鳳の突生	220	10	やや不良	有	6月下旬	奇形、糖割れ多い
サマエース	白鳳枝変わり	200	10～11	良	有	7月上旬	日川よりやや小玉
日川白鳳	白鳳枝変わり	220	11～12	良	有	7月上旬	早採りしやすい
山梨白鳳	白鳳突生	230	11～12	良	有	7月上旬	着色玉強良好
みさか白鳳	白鳳枝変わり	250	11～12	良	有	7月上旬	早採りで糖味強い
橋場白鳳	白鳳枝変わり	240	11～12	中	有	7月中旬	日川と同時期
加納岩白桃	浅間枝変わり	260	11～13	中	有	7月中旬	無袋は果実多い
白鳳	白鳳×橘早生	230	12～13	中	有	7月中旬	せんこう病に弱い
あかつき	白桃×白鳳	230	12～14	良	有	7月中旬	日持や不良
浅間白桃	高陽白桃枝変わり	250	12～13	良	無	7月中下	せんこう病に強い
清水白桃	調榮突生	250	12～13	不良	有	7月下旬	夜腐被害多い
長沢白鳳	白鳳枝変わり	280	12～13	極良	有	7月中下	肉質軟、着色遅
よしひめ	21-18×あかつき	280	12～13	良	有	7月下旬	果樹に紅が入る
まさひめ	21-18×あかつき	240	13～14	良	有	7月下旬	よしひめより小果
川中島白桃	調榮突生	300	12～14	良	無	8月上旬	盆前後の収穫
ゆうぞら	あかつき×白桃	280	12～14	良	有	8月中下	やや小果
ゴキブリビナ	調榮突生	330	12～13	少	有	9月上旬	収穫前果実多い