

水稻作況試験情報 【令和6年産 早期コシヒカリ】

香川県農業試験場 (5月31日現在)

移植後の気温は5月前半はやや低く、5月後半はやや高かった。降水量は5月6半旬でかなり多かった。日照時間は5月1、4、5半旬で多照であった。田植30日後の調査では、過去5か年平均に比べ草丈は長く、茎数、主稈葉数は多かった。

1. 作況試験の方法


- 1) 供試品種：コシヒカリ
- 2) 播種期：4月10日 移植期：5月1日
- 3) 育苗方法：播種後、加温出芽させた後、ハウス内で緑化、硬化させた。
- 4) 栽植密度及び移植方法
18.5株/m² (30cm×18cm)、1株4本程度、機械移植
なお、生育調査株は移植後1株4本に調整した。
- 5) 本田施肥 (N成分kg/a)

	基肥	穂肥Ⅰ(予定)	穂肥Ⅱ(予定)
コシヒカリ	0.35	0.15	0.1

- 6) 使用肥料：化成肥料 (N : P₂O₅ : K₂O = 14 : 10 : 12%)

2. 具体的データ

令和6年産水稻 気象表 (播種～5月6半旬まで)



※5月6半旬の降水量は、130.0mm

令和6年産 水稲作況試験生育調査結果(5月31日現在)

調査 (月/日)	供試品種 項目	早期コシヒカリ		
		本年	過去5か年平均値	差(比)
田植時 (5/1)	草丈(cm)	13.9	15.2	▲ 1.3
	主稈葉数(枚)	2.3	2.0	0.3
田植20日後 (5/21)	草丈(cm)	26.1	26.5	▲ 0.4
	茎数(本/m ²)	180	150	20 %
	主稈葉数(枚)	5.7	5.1	0.6
田植30日後 (5/31)	草丈(cm)	32.9	30.4	2.5
	茎数(本/m ²)	415	315	32 %
	主稈葉数(枚)	8.0	6.8	1.2
田植40日後 (6/10)	草丈(cm)		43.0	
	茎数(本/m ²)		567	%
	主稈葉数(枚)		8.4	
田植50日後 (6/20)	草丈(cm)		59.8	
	茎数(本/m ²)		609	%
	主稈葉数(枚)		9.6	
田植期(月/日)		5/1	5/1	0
幼穂形成始期(月/日)			6/23	
出穂期(月/日)			7/14	
主稈止葉葉数(枚)			12.0	
稈長(cm)			87.6	
穂長(cm)			20.2	
穂数(本/m ²)			401	%
成熟期(月/日)			8/16	

注1) 差(比)は、過去5か年平均値との比較で示した。なお、茎数については対比(増減%)で表し、これ以外の項目については対差(実数値)で表した。なお▲は少ない、短い、早いことを示す。