

水稲作況試験情報 【令和8年産 普通期栽培】

香川県農業試験場（出穂期）

移植期以降、最高気温は7月2半旬までは平年より低く経過し、3半旬以降高温に転じた。降水量は6月5半旬から7月1半旬にかけて多雨、7月3半旬以降は少雨で経過した。日照時間は、7月2半旬までは平年より寡照、3半旬以降は多照となった。過去5か年平均と比べ、幼穂形成始期はコシヒカリ、ヒノヒカリが1日、おいでまいが2日遅くなった。出穂期はコシヒカリが1日早く、ヒノヒカリ、おいでまいが同等であった。主幹止葉葉数はいずれの品種も同等であった。

1. 作況試験の方法


- 1) 供試品種：コシヒカリ、ヒノヒカリ、おいでまい
- 2) 播種期：5月29日 移植期：6月19日
- 3) 育苗方法：播種後、加温出芽させ、その後露地育苗した。
- 4) 栽植密度及び移植方法
18.5株/㎡（30cm×18cm）、1株4本程度、機械移植
なお、生育調査株は移植直後1株4本に調整した。
- 5) 本田施肥（N成分kg/a）

	基肥	穂肥Ⅰ	穂肥Ⅱ
コシヒカリ	0.3	0.15 (7/31)	0.10 (8/6)
ヒノヒカリ	0.5	0.25 (8/10)	0.15 (8/17)
おいでまい	0.5	0.25 (8/12)	0.15 (8/19)

- 6) 使用肥料：化成肥料（N：P₂O₅：K₂O＝14：10：12％）
- 7) 1区面積及び区制 1区250㎡（コシヒカリ500㎡）、2反復

2. 具体的データ

令和8年産水稲 気象表（8月5半旬まで）



令和8年産 水稲作況試験生育調査結果(8月27日現在)

調 査 (月／日)	供試品種 項 目	コシヒカリ			ヒノヒカリ			おいでまい		
		本年	過去5か年 平均値	差(比)	本年	過去5か年 平均値	差(比)	本年	過去5か年 平均値	差(比)
移植時 (6/19)	草丈(cm)	14.7	14.4	0.3	12.6	11.7	0.9	11.0	11.2	▲ 0.2
	主稈葉数(枚)	2.3	2.4	▲ 0.1	2.6	2.6	0.0	2.6	2.5	0.1
移植20日後 (7/9)	草丈(cm)	36.3	39.3	▲ 3.0	29.6	30.4	▲ 0.8	30.5	31.5	▲ 1.0
	茎数(本/㎡)	234	265	▲ 12 %	299	310	▲ 4 %	308	351	▲ 12 %
	主稈葉数(枚)	7.0	7.4	▲ 0.4	7.3	7.6	▲ 0.3	7.5	7.8	▲ 0.3
移植30日後 (7/19)	草丈(cm)	52.7	60.3	▲ 7.6	46.4	50.0	▲ 3.6	44.3	50.2	▲ 5.9
	茎数(本/㎡)	586	483	21 %	716	571	25 %	761	642	19 %
	主稈葉数(枚)	9.5	9.6	▲ 0.1	10.0	9.8	0.2	10.3	10.0	0.3
移植40日後 (7/29)	草丈(cm)	74.9	76.9	▲ 2.0	66.7	68.6	▲ 1.9	61.6	68.9	▲ 7.3
	茎数(本/㎡)	624	511	22 %	800	632	27 %	852	751	13 %
	主稈葉数(枚)	11.2	11.1	0.1	11.6	11.2	0.4	12.1	11.7	0.4
播種期(月／日)		5/29	5/31	▲ 2	5/29	5/31	▲ 2	5/29	5/31	▲ 2
移植期(月／日)		6/19	6/20	▲ 1	6/19	6/20	▲ 1	6/19	6/20	▲ 1
幼穂形成始期(月／日)		7/26	7/25	1	8/5	8/4	1	8/8	8/6	2
出穂期(月／日)		8/14	8/15	▲ 1	8/26	8/26	0	8/27	8/27	0
主稈止葉葉数(枚)		12.6	12.8	▲ 0.2	14.7	14.1	0.6	15.4	14.7	0.7
穂数(本/㎡)			409	%		470	%		495	%
稈長(cm)			96.6			87.9			87.1	
穂長(cm)			19.3			18.5			19.4	
成熟期(月／日)			9/18			10/3			10/3	

注1)コシヒカリ、ヒノヒカリ、おいでまいの差は過去5か年平均との比較で示した。

注2) 茎数・穂数については対比(増減%)で表し、これ以外の項目については対差(実数値)で表した。なお▲は少ない、短い、早いことを示す。