


ノリ養殖情報

(令和7年度：第8報 7年12月2日)

香川県漁業協同組合連合会

指導課 (TEL 087-825-0351)

1. 屋島湾の海水温 (午前9時)



12月2日の屋島湾の海水温は 17.4℃で、昨年度より 0.1℃高く、平年値より 1.4℃高くなっています。

2. 育苗について

水温は大きく下がることもなく停滞状態が続き、昨年同時期とほぼ同等になっています。
冷凍入庫はほぼ終了し、本張りについても多くの漁場で開始しています。

東讃: 東讃は11月27日、引田、鴨庄、牟礼は11月29日、津田は11月30日に本張り開始。

庵治は12月2日に本張り終了、摘採は未定。

高松: 瀬戸内、香西は12月2日に本張り開始。下笠居は12月6～8日に本張り開始予定。

小豆: 土庄中央は11月26日に冷凍入庫終了、12月3日に本張り開始予定。

四海は12月5日に冷凍入庫終了予定、本張りは11月27日に開始。

唐櫃は11月27日、大部、北浦は11月29日、内海は11月30日に本張り開始。

中讃: 与島は11月30日に冷凍入庫終了、12月1日に本張り開始。中讃西部は11月28日に冷凍入庫終了、12月7日に本張り開始予定。宇多津は12月6日に本張り開始予定。

3. 栄養塩及びプランクトン

採水日：令和7年12月2日

① 栄 養 塩

(分析機関：香川県水産試験場、単位： $\mu\text{g at/l}$)

漁 場		三 態 窒 素										
		10/28	11/4	11/11	11/18	11/25	12/2	12/9	12/16	12/26	1/7	1/14
引 田	本 年 度	3.9	2.1	1.8	2.7	1.9	1.8					
	前 年 度	4.0	5.6	5.6	7.6	3.3	3.8	3.7	4.0	2.4	2.6	2.6
東 讃	本 年 度	1.3	0.7	1.4	0.7	1.3	1.4					
	前 年 度	9.6	6.8	6.6	6.2	1.6	4.9	4.4	2.2	1.2	2.0	1.1
津 田	本 年 度	1.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.1					
	前 年 度	14.2	7.3	6.3	15.9	1.8	5.0	6.1	3.7	1.4	2.4	1.8
志 度 湾	本 年 度	1.1	0.7	1.1	1.1	1.0	1.2					
	前 年 度	4.2	8.8	7.4	7.4	3.9	5.0	4.2	3.1	0.4	2.1	1.9
庵 治	本 年 度	1.4	0.9	1.3	1.0	1.2	1.5					
	前 年 度	4.9	11.6	8.6	8.9	5.1	5.0	3.8	3.0	0.7	2.0	2.5
瀬 戸 内	本 年 度	3.6	1.0	1.7	1.4	2.0	1.8					
	前 年 度	7.4	10.3	10.2	8.9	4.8	4.6	3.3	3.1	1.9	2.2	3.0
香 西	本 年 度	3.3	1.1	1.6	1.2	1.2	1.9					
	前 年 度	7.4	10.3	10.1	8.1	5.3	5.1	3.1	2.7	1.8	2.0	2.5
下 笠 居	本 年 度	4.1	1.5	0.9	1.0	1.9	1.7					
	前 年 度	7.3	10.3	10.4	8.4	4.6	2.8	2.4	1.7	1.2	2.1	2.2
直 島	本 年 度	3.8	1.7	3.0	2.1	2.9	1.6					
	前 年 度	7.2	10.9	10.6	10.8	6.1	5.2	3.5	3.1	1.6	2.7	1.7
土 庄	本 年 度	3.4	1.1	1.1	0.7	1.4	1.4					
	前 年 度	7.2	7.5	6.4	8.3	4.9	5.0	3.8	3.0	0.7	3.3	欠測
四 海	本 年 度	1.6	0.8	1.0	0.5	1.1	1.9					
	前 年 度	5.7	10.4	10.8	9.9	7.6	6.1	5.0	3.5	1.3	2.0	2.0
唐 櫃	本 年 度	2.5	1.0	0.8	0.3	1.0	1.2					
	前 年 度	8.8	16.1	13.9	10.6	7.9	5.5	3.3	2.3	0.9	1.5	1.4
北 浦	本 年 度	2.3	0.7	1.8	1.1	1.7	1.6					
	前 年 度	4.7	12.0	8.6	10.4	6.7	6.0	4.8	3.0	1.8	1.6	1.5
大 部	本 年 度	2.1	0.6	0.9	0.6	1.5	1.3					
	前 年 度	3.6	9.8	5.7	7.9	3.2	6.7	4.5	3.4	1.1	4.4	2.9
内 海	本 年 度	1.2	0.7	0.7	0.8	1.1	1.0					
	前 年 度	3.2	4.9	4.5	5.2	1.9	4.3	4.4	3.9	2.0	3.1	2.3
与 島	本 年 度	1.0	5.5	1.9	1.9	1.4	2.0					
	前 年 度	10.3	9.3	11.2	4.2	5.3	0.4	3.4	3.5	2.0	4.3	3.9
丸 亀 市	本 年 度	欠測	1.3	1.1	0.3	0.6	0.3					
	前 年 度	7.6	10.4	4.2	3.8	0.7	0.4	2.3	0.5	2.3	1.4	2.4
箱 浦	本 年 度	2.4	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7					
	前 年 度	6.3	5.6	4.5	2.2	1.1	1.6	1.5	0.6	1.6	1.1	1.3
宇 多 津	本 年 度	1.2	2.7	9.8	0.7	0.3	1.6					
	前 年 度	8.4	欠測	11.4	1.3	4.0	1.6	2.4	2.2	欠測	欠測	欠測
平 均	本 年 度	2.4	1.3	1.3	1.0	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前 年 度	6.9	9.3	8.1	8.0	4.2	4.3	3.8	2.8	1.5	2.4	2.2

※三態窒素：アンモニア・硝酸・亜硝酸態窒素の合計で、 $3\mu\text{g at/l}$ 以下になると色落ちの原因となる。

(調査結果)

本年度第8回目の栄養塩調査を実施しました。調査結果は、 $0.3\sim 2.0\mu\text{g at/l}$ 。全漁場における平均は $1.4\mu\text{g at/l}$ で、前年度($4.3\mu\text{g at/l}$)より低い結果となっています。

② 植物プランクトン

(分析機関：香川県赤潮研究所、 単位：個/ℓ)

漁 場	植 物 プ ラ ン ク ト ン 数						備 考	
	コ シ ノ デ ィ ス カ ス				ユ ー カ ン ピ ア		珪藻優占種第1位	
	12月2日		前年同時期		12月2日	前年同時期		
	ワイレシー	全数	ワイレシー	全数				
引 田	25	50	50	300	0	0	ニッチャ	650
東 讃	75	75	0	300	0	0	ニッチャ	825
津 田	125	175	100	350	0	0	ニッチャ	400
志 度 湾	25	50	0	0	0	0	ニッチャ	75
庵 治	100	175	0	150	0	0	キートセロス	4,175
高松市瀬戸内	0	100	0	400	0	0	キートセロス	7,125
香 西	75	125	0	100	0	0	キートセロス	3,675
下 笠 居	75	75	0	0	0	0	キートセロス	5,575
直 島	50	75	250	900	0	0	キートセロス	3,875
土 庄	50	75	0	100	0	0	グイナルディア	5,650
四 海	0	75	0	50	0	0	キートセロス	3,675
唐 櫃	150	175	0	350	0	0	キートセロス	2,600
北 浦	225	225	50	600	0	0	ニッチャ	500
大 部	100	125	100	150	0	0	コシノディスカス	125
内 海	75	100	0	100	0	0	ニッチャ	575
与 島	125	425	0	50	0	0	キートセロス	16,750
丸 亀 市	50	450	0	300	0	0	バキラリア	14,500
箱 浦	25	50	0	0	0	0	キートセロス	1,250
宇 多 津	25	275	50	100	0	0	キートセロス	1,500

(調査結果)

i) コシノディスカス ワイレシー

北浦の225個/ℓを最高に17漁場で検出されています。

ii) ユーカンピア

全漁場で検出されていません。

iii) 珪藻優占種

ニッチャ、キートセロスが主に優占して出現しています。

※ 次回調査は、12月9日(火)に予定します。

ノリ養殖漁場米養塩調査結果 第8回(令和7年12月2日)

