


1. 屋島湾の海水温 (午前9時)

1月6日の屋島湾の海水温は 11.3℃で、昨年度より 0.5℃高く、平年値より 0.7℃高くなっています。

2. 摘採の状況

水温は年始の冷え込みと強風に伴って徐々に低下しましたが、昨年よりやや高くなっています。全漁場で摘採を始め、早い漁場では4回目の摘採中です。

東讃: 引田、東讃、津田、牟礼は2回目、鴨庄は3回目、庵治は4回目を摘採。

伸びは概ね良いが一部鈍い漁場がある。色は黒い。病障害は特に見られない。

高松: 下笠居で2回目、瀬戸内、香西で3回目、直島で4回目を摘採。伸び、色ともにまずまず。魚による食害が多い漁場が見られる。

小豆: 四海、土庄中央、大部は2回目、北浦、唐櫃、内海は3回目を摘採。

伸び、色ともにまずまず。一部で食害あり。

中讃: 丸亀と宇多津は1回目、与島は2回目を摘採。伸び、色ともにまずまず。病障害は特に見られない。

3. 栄養塩及びプランクトン

採水日:令和8年1月6日

① 栄 養 塩

(分析機関:香川県水産試験場、単位: $\mu\text{g at/l}$)

漁 場		三 態 窒 素										
		11/25	12/2	12/9	12/16	12/26	1/6	1/13	1/20	1/27	2/3	2/10
引 田	本 年 度	1.9	1.8	3.0	3.7	5.8	2.4					
	前 年 度	3.3	3.8	3.7	4.0	2.4	2.6	2.6	1.4	0.5	2.4	0.8
東 讃	本 年 度	1.3	1.4	2.5	2.1	3.0	1.0					
	前 年 度	1.6	4.9	4.4	2.2	1.2	2.0	1.1	1.9	0.4	1.7	0.1
津 田	本 年 度	1.2	1.1	2.1	2.6	3.4	0.8					
	前 年 度	1.8	5.0	6.1	3.7	1.4	2.4	1.8	2.0	2.2	欠測	0.3
志 度 湾	本 年 度	1.0	1.2	2.4	2.1	欠測	1.1					
	前 年 度	3.9	5.0	4.2	3.1	0.4	2.1	1.9	2.2	1.6	1.0	0.5
庵 治	本 年 度	1.2	1.5	2.4	2.2	2.9	1.6					
	前 年 度	5.1	5.0	3.8	3.0	0.7	2.0	2.5	2.6	2.9	1.3	0.8
瀬 戸 内	本 年 度	2.0	1.8	3.2	3.1	3.0	1.0					
	前 年 度	4.8	4.6	3.3	3.1	1.9	2.2	3.0	2.3	1.6	1.0	0.4
香 西	本 年 度	1.2	1.9	2.3	2.9	3.3	0.8					
	前 年 度	5.3	5.1	3.1	2.7	1.8	2.0	2.5	3.4	2.1	1.4	0.1
下 笠 居	本 年 度	1.9	1.7	1.4	1.6	2.2	0.6					
	前 年 度	4.6	2.8	2.4	1.7	1.2	2.1	2.2	2.0	0.8	0.5	0.0
直 島	本 年 度	2.9	1.6	2.2	2.1	2.5	0.6					
	前 年 度	6.1	5.2	3.5	3.1	1.6	2.7	1.7	4.8	1.1	0.6	0.3
土 庄	本 年 度	1.4	1.4	2.1	1.7	5.9	0.8					
	前 年 度	4.9	5.0	3.8	3.0	0.7	3.3	欠測	3.2	1.2	0.4	0.1
四 海	本 年 度	1.1	1.9	2.1	2.3	3.0	0.8					
	前 年 度	7.6	6.1	5.0	3.5	1.3	2.0	2.0	2.2	1.5	0.4	0.4
唐 櫃	本 年 度	1.0	1.2	1.7	1.9	3.0	0.6					
	前 年 度	7.9	5.5	3.3	2.3	0.9	1.5	1.4	1.9	0.7	0.3	1.1
北 浦	本 年 度	1.7	1.6	2.4	2.3	3.0	0.9					
	前 年 度	6.7	6.0	4.8	3.0	1.8	1.6	1.5	2.2	1.2	0.4	0.1
大 部	本 年 度	1.5	1.3	2.2	2.4	3.0	1.5					
	前 年 度	3.2	6.7	4.5	3.4	1.1	4.4	2.9	2.0	1.3	0.9	2.7
内 海	本 年 度	1.1	1.0	1.8	2.3	2.7	0.9					
	前 年 度	1.9	4.3	4.4	3.9	2.0	3.1	2.3	1.9	2.2	1.1	1.4
与 島	本 年 度	1.4	2.0	4.7	2.2	3.8	0.7					
	前 年 度	5.3	0.4	3.4	3.5	2.0	4.3	3.9	0.6	1.3	1.9	1.7
丸 亀 市	本 年 度	0.6	0.3	0.3	0.8	1.4	1.4					
	前 年 度	0.7	0.4	2.3	0.5	2.3	1.4	2.4	0.7	0.0	0.4	0.2
箱 浦	本 年 度	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6	0.2					
	前 年 度	1.1	1.6	1.5	0.6	1.6	1.1	1.3	0.2	0.0	0.1	0.0
宇 多 津	本 年 度	0.3	1.6	欠測	2.0	欠測	1.9					
	前 年 度	4.0	1.6	2.4	2.2	欠測	欠測	欠測	0.1	欠測	欠測	欠測
平 均	本 年 度	1.4	1.4	2.2	2.2	3.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前 年 度	4.2	4.3	3.8	2.8	1.5	2.4	2.2	2.1	1.3	0.9	0.6

※三態窒素：アンモニア・硝酸・亜硝酸態窒素の合計で、 $3\mu\text{g at/l}$ 以下になると色落ちの原因となる。

(調査結果)

本年度第12回目の栄養塩調査を実施しました。調査結果は、 $0.2\sim 2.4\mu\text{g at/l}$ 。全漁場における平均は $1.0\mu\text{g at/l}$ で、前年度($2.4\mu\text{g at/l}$)より低い結果となっています。

② 植物プランクトン

(分析機関：香川県赤潮研究所、 単位：個/ℓ)

漁 場	植 物 プ ラ ン ク ト ン 数						備 考	
	コ シ ノ デ ィ ス カ ス				ユ ー カ ン ピ ア		珪藻優占種第1位	
	1月6日		前年同時期		1月6日	前年同時期		
	ワイレシー	全数	ワイレシー	全数				
引 田	0	200	150	1,500	3,500	0	キートセロス	91,250
東 讃	0	225	0	1,900	1,750	0	キートセロス	32,425
津 田	0	0	0	800	300	0	キートセロス	13,325
志 度 湾	125	200	0	150	3,550	0	キートセロス	9,400
庵 治	0	175	0	50	0	2,700	キートセロス	16,125
高松市瀬戸内	0	0	0	50	3,025	0	ユーカンピア	3,025
香 西	25	50	0	0	0	0	キートセロス	20,125
下 笠 居	0	0	0	50	9,025	0	キートセロス	26,250
直 島	25	50	0	100	675	0	キートセロス	29,925
土 庄	0	150	0	0	0	0	キートセロス	66,500
四 海	0	75	0	150	4,200	0	キートセロス	20,575
唐 櫃	0	0	0	0	5,100	0	キートセロス	32,250
北 浦	0	175	0	0	4,250	0	キートセロス	31,925
大 部	0	200	0	0	0	0	キートセロス	30,575
内 海	0	50	0	100	1,650	0	キートセロス	92,250
与 島	0	0	0	50	1,150	0	キートセロス	10,675
丸 亀 市	0	0	0	0	0	0	キートセロス	14,300
箱 浦	0	0	0	300	900	1,600	キートセロス	30,500
宇 多 津	50	125	欠測	欠測	4,450	欠測	キートセロス	13,700

(調査結果)

i) コシノディスカス ワイレシー

志度湾の125個/ℓを最高に4漁場で検出されています。

ii) ユーカンピア


下笠居の9,025個/ℓを最高に14漁場で検出されています。

iii) 珪藻優占種

キートセロスが主に優占して出現しています。

※ 次回調査は、1月13日(火)に予定します。

ノリ養殖漁場米養塩調査結果
第12回(令和8年1月6日)



県下ノリ養殖状況調査(令和8年1月6日現在)

漁場名	摘採		摘採		病障害等	その他(特記事項)
	開始(予定)日	回数	伸び	色・ツヤ		
引田	12月16日	<u>2</u>	<u>かなり悪い</u>	普通	-	-
東讃	12月16日	<u>2</u>	普通	普通	<u>特には見られない</u>	-
津田	12月20日	<u>2</u>	普通	普通	<u>特には見られない</u>	-
鴨庄	12月13日	<u>3</u>	良い	黒い	<u>特には見られない</u>	-
牟礼	12月17日	<u>2</u>	普通	普通	<u>特には見られない</u>	-
庵治	12月6日	<u>4</u>	普通	黒い	<u>特には見られない</u>	-
瀬戸内	12月16日	<u>3</u>	<u>良い</u>	<u>やや浅い</u>	<u>特には見られない</u>	色が徐々に落ちている
香西	12月18日	<u>3</u>	普通	普通	<u>一部で魚による食害</u>	-
下笠居	<u>12月24日</u>	<u>2</u>	<u>かなり悪い</u>	普通	<u>魚の食害が多い</u>	-
直島	12月13日	<u>4</u>	普通	やや浅い	-	-
四海	12月15日	<u>2</u>	普通	普通	<u>特には見られない</u>	一部食害、トリフン病あり
土庄中央	12月22日	<u>2</u>	普通	黒い	<u>特には見られない</u>	-
大部	12月17日	2	普通	普通	<u>特には見られない</u>	-
北浦	12月15日	<u>3</u>	<u>良い</u>	普通	-	-
唐櫃	12月13日	<u>3</u>	普通	黒い	<u>特には見られない</u>	-
内海	12月16日	<u>3</u>	<u>良い</u>	普通	-	-
与島	12月21日	<u>2</u>	普通	普通	-	-
中讃西部	<u>12月30日</u>	<u>1</u>	普通	普通	<u>特には見られない</u>	-
宇多津	<u>1月4日</u>	<u>1</u>	<u>良い</u>	普通	<u>特には見られない</u>	伸びが悪い(?)

※下線部は前回からの更新点 ※下線部は前回からの更新点