


1. 屋島湾の海水温 (午前9時)

1月20日の屋島湾の海水温は 11.0℃で、昨年度より 1.7℃高く、平年値より1.6℃高くなっています。

2. 摘採の状況

水温は気温の上昇に合わせて徐々に上昇し続け、昨年より高くなっています。

全漁場で摘採中であり、早い漁場では6回目の摘採中です。

東讃: 引田、東讃、津田は3回目、牟礼は4回目、鴨庄は5回目、庵治は6回目を摘採。

伸びはやや悪く、色艶もやや浅い。

高松: 瀬戸内、香西、下笠居で4回目、直島で5回目を摘採。

伸びは一部良いが概ねやや悪い。色艶はかなり浅い。

小豆: 土庄中央は3回目、四海、大部、唐櫃は4回目、北浦、内海は5回目を摘採。伸びは

まずまずだが色艶はやや浅く一部漁場でかなり色落ちが見られる。一部漁場で食害あり

中讃: 丸亀、宇多津、与島は2回目を摘採。伸びはやや悪く、色艶もやや浅い。

一部漁場で食害あり。

3. 栄養塩及びプランクトン

採水日:令和8年1月20日

① 栄 養 塩

(分析機関:香川県水産試験場、単位: $\mu\text{g at/l}$)

漁 場		三 態 窒 素										
		12/9	12/16	12/26	1/6	1/13	1/20	1/27	2/3	2/10	2/17	2/24
引 田	本 年 度	3.0	3.7	5.8	2.4	1.1	0.8					
	前 年 度	3.7	4.0	2.4	2.6	2.6	1.4	0.5	2.4	0.8	0.6	0.8
東 讃	本 年 度	2.5	2.1	3.0	1.0	0.5	0.4					
	前 年 度	4.4	2.2	1.2	2.0	1.1	1.9	0.4	1.7	0.1	1.3	0.1
津 田	本 年 度	2.1	2.6	3.4	0.8	0.5	0.3					
	前 年 度	6.1	3.7	1.4	2.4	1.8	2.0	2.2	欠測	0.3	0.3	0.1
志 度 湾	本 年 度	2.4	2.1	欠測	1.1	0.9	0.3					
	前 年 度	4.2	3.1	0.4	2.1	1.9	2.2	1.6	1.0	0.5	0.6	0.1
庵 治	本 年 度	2.4	2.2	2.9	1.6	0.7	0.9					
	前 年 度	3.8	3.0	0.7	2.0	2.5	2.6	2.9	1.3	0.8	0.5	0.1
瀬 戸 内	本 年 度	3.2	3.1	3.0	1.0	0.3	0.7					
	前 年 度	3.3	3.1	1.9	2.2	3.0	2.3	1.6	1.0	0.4	0.6	0.2
香 西	本 年 度	2.3	2.9	3.3	0.8	0.6	0.7					
	前 年 度	3.1	2.7	1.8	2.0	2.5	3.4	2.1	1.4	0.1	0.5	1.0
下 笠 居	本 年 度	1.4	1.6	2.2	0.6	0.4	0.5					
	前 年 度	2.4	1.7	1.2	2.1	2.2	2.0	0.8	0.5	0.0	0.1	0.0
直 島	本 年 度	2.2	2.1	2.5	0.6	0.4	0.4					
	前 年 度	3.5	3.1	1.6	2.7	1.7	4.8	1.1	0.6	0.3	0.2	0.2
土 庄	本 年 度	2.1	1.7	5.9	0.8	0.6	0.3					
	前 年 度	3.8	3.0	0.7	3.3	欠測	3.2	1.2	0.4	0.1	0.8	0.3
四 海	本 年 度	2.1	2.3	3.0	0.8	0.4	0.3					
	前 年 度	5.0	3.5	1.3	2.0	2.0	2.2	1.5	0.4	0.4	0.2	欠測
唐 櫃	本 年 度	1.7	1.9	3.0	0.6	0.3	0.2					
	前 年 度	3.3	2.3	0.9	1.5	1.4	1.9	0.7	0.3	1.1	0.1	0.3
北 浦	本 年 度	2.4	2.3	3.0	0.9	0.6	0.6					
	前 年 度	4.8	3.0	1.8	1.6	1.5	2.2	1.2	0.4	0.1	0.1	0.1
大 部	本 年 度	2.2	2.4	3.0	1.5	0.9	0.2					
	前 年 度	4.5	3.4	1.1	4.4	2.9	2.0	1.3	0.9	2.7	0.7	0.6
内 海	本 年 度	1.8	2.3	2.7	0.9	0.7	0.5					
	前 年 度	4.4	3.9	2.0	3.1	2.3	1.9	2.2	1.1	1.4	0.8	1.1
与 島	本 年 度	4.7	2.2	3.8	0.7	0.4	0.7					
	前 年 度	3.4	3.5	2.0	4.3	3.9	0.6	1.3	1.9	1.7	0.9	2.0
丸 亀 市	本 年 度	0.3	0.8	1.4	1.4	0.6	0.7					
	前 年 度	2.3	0.5	2.3	1.4	2.4	0.7	0.0	0.4	0.2	0.1	0.1
箱 浦	本 年 度	0.5	0.5	0.6	0.2	0.3	0.3					
	前 年 度	1.5	0.6	1.6	1.1	1.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
宇 多 津	本 年 度	欠測	2.0	欠測	1.9	欠測	欠測					
	前 年 度	2.4	2.2	欠測	欠測	欠測	0.1	欠測	欠測	欠測	0.1	0.4
平 均	本 年 度	2.2	2.2	3.1	1.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前 年 度	3.8	2.8	1.5	2.4	2.2	2.1	1.3	0.9	0.6	0.5	0.4

※三態窒素: アンモニア・硝酸・亜硝酸態窒素の合計で、 $3 \mu\text{g at/l}$ 以下になると色落ちの原因となる。

(調査結果)

本年度第14回目の栄養塩調査を実施しました。調査結果は、 $0.2 \sim 0.9 \mu\text{g at/l}$ 。全漁場における平均は $0.5 \mu\text{g at/l}$ で、前年度($2.1 \mu\text{g at/l}$)より低い結果となっています。

② 植物プランクトン

(分析機関：香川県赤潮研究所、 単位：個/ℓ)

漁 場	植 物 プ ラ ン ク ト ン 数						備 考	
	コ シ ノ デ ィ ス カ ス				ユ ー カ ン ピ ア		珪藻優占種第1位	
	1月20日		前年同時期		1月20日	前年同時期		
	ワレシ-	全数	ワレシ-	全数				
引 田	0	0	0	0	6,300	0	キートセロス	42,500
東 讃	0	0	0	0	3,325	0	キートセロス	12,900
津 田	0	0	0	0	3,475	0	キートセロス	27,500
志 度 湾	0	0	0	0	2,950	0	キートセロス	7,725
庵 治	0	0	0	0	2,200	0	キートセロス	12,000
高松市瀬戸内	0	0	0	0	10,900	0	キートセロス	26,900
香 西	0	0	0	0	1,900	0	キートセロス	23,500
下 笠 居	0	0	0	0	23,400	0	キートセロス	28,500
直 島	0	100	0	800	19,900	0	キートセロス	58,900
土 庄	0	0	0	0	12,600	0	キートセロス	37,700
四 海	0	0	0	50	34,200	0	キートセロス	50,300
唐 櫃	0	0	0	400	16,600	0	キートセロス	44,200
北 浦	0	0	0	0	17,000	0	キートセロス	54,500
大 部	0	100	0	50	0	0	キートセロス	81,900
内 海	0	0	0	0	1,000	0	キートセロス	7,900
与 島	0	0	150	250	1,700	1,650	キートセロス	30,400
丸 亀 市	0	0	0	0	10,500	2,450	キートセロス	45,500
箱 浦	0	0	0	0	0	0	キートセロス	22,200
宇 多 津	欠測	欠測	0	300	欠測	2,150	キートセロス	欠測

(調査結果)


i) コシノディスカス ワイレシー
全漁場で検出されていません。

ii) ユーカンピア
四海の34,200個/ℓを最高に16漁場で検出されています。

iii) 珪藻優占種
キートセロスが主に優占して出現しています。

※ 次回調査は、1月27日(火)に予定します。

ノリ養殖漁場米養塩調査結果 第14回(令和8年1月20日)



県下ノリ養殖状況調査(令和8年1月20日現在)

漁場名	摘採			病障害等	色落ちについて	その他(特記事項)
	回数	伸び	色・ツヤ			
引田	3	<u>やや悪い</u>	<u>やや浅い</u>	-	<u>やや落ちている</u>	-
東讃	3	<u>かなり悪い</u>	<u>やや浅い</u>	<u>タビラリア?</u>	やや落ちている	-
津田	3	やや悪い	<u>やや浅い</u>	特には見られない	<u>やや落ちている</u>	-
鴨庄	5	普通	<u>かなり浅い</u>	-	<u>かなり落ちている</u>	-
牟礼	4	<u>やや悪い</u>	やや浅い	特には見られない	やや落ちている	-
庵治	6	普通	<u>普通</u>	特には見られない	<u>やや落ちている</u>	-
瀬戸内	4	<u>良い</u>	かなり浅い	特には見られない	かなり落ちている	-
香西	4	普通	<u>やや浅い</u>	<u>特には見られない</u>	<u>かなり落ちている</u>	-
下笠居	4	<u>やや悪い</u>	<u>かなり浅い</u>	-	<u>かなり落ちている</u>	色落ちが進んでいる
直島	5	<u>やや悪い</u>	<u>かなり浅い</u>	-	<u>かなり落ちている</u>	-
四海	4	普通	やや浅い	<u>特には見られない</u>	やや落ちている	-
土庄中央	3	<u>やや悪い</u>	<u>かなり浅い</u>	<u>食害あり</u>	<u>かなり落ちている</u>	-
大部	4	普通	<u>やや浅い</u>	特には見られない	やや落ちている	-
北浦	5	<u>やや悪い</u>	かなり浅い	特には見られない	かなり落ちている	-
唐櫃	4	普通	<u>やや浅い</u>	特には見られない	<u>かなり落ちている</u>	-
内海	5	<u>普通</u>	<u>かなり浅い</u>	-	<u>かなり落ちている</u>	-
与島	2	やや悪い	やや浅い	特には見られない	やや落ちている	食害あり
中讃西部	2	やや悪い	<u>やや浅い</u>	特には見られない	<u>保たれている</u>	-
宇多津	2	普通	やや浅い	特には見られない	やや落ちている	-

※下線部は前回からの更新点