


1. 屋島湾の海水温 (午前9時)

2月3日の屋島湾の海水温は 9.1℃で、昨年度より0.3℃高く、平年値より0.6℃高くなっています。

2. 摘採の状況

水温は徐々に低下しつつ概ね維持し、昨年度よりやや高くなっています。全漁場で摘採中であり、早い漁場では7回目の摘採中、一部漁場では網揚げを開始。

東讃: 東讃、津田は3回目、引田、鴨庄、牟礼は5回目、庵治は7回目を摘採。伸びは一部漁場ではまずまずだが概ねかなり悪く、色艶はかなり浅い。一部漁場で網揚げを検討中。

高松: 瀬戸内、下笠居で5回目、香西で6回目、直島で7回目を摘採。

伸びはやや悪く、色艶はかなり浅い。一部漁場で網揚げを検討中。

小豆: 土庄中央は4回目、大部、北浦、唐櫃、内海は5回目、四海は6回目を摘採。伸びはかなり悪く、色艶もかなり浅い。北浦は状態の悪い網を5%整理中。内海は40%網揚げ。

中讃: 丸亀は2回目、与島、宇多津は3回目を摘採。伸びはやや悪く、色艶もやや浅い。一部漁場で網揚げを検討中。

### 3. 栄養塩及びプランクトン

採水日:令和8年2月3日

#### ① 栄 養 塩

(分析機関:香川県水産試験場、単位:  $\mu\text{g at/l}$ )

| 漁 場   |       | 三 態 窒 素 |       |       |     |      |      |      |     |      |      |      |
|-------|-------|---------|-------|-------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|
|       |       | 12/9    | 12/16 | 12/26 | 1/6 | 1/13 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/24 |
| 引 田   | 本 年 度 | 3.0     | 3.7   | 5.8   | 2.4 | 1.1  | 0.8  | 0.5  | 1.4 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 3.7     | 4.0   | 2.4   | 2.6 | 2.6  | 1.4  | 0.5  | 2.4 | 0.8  | 0.6  | 0.8  |
| 東 讃   | 本 年 度 | 2.5     | 2.1   | 3.0   | 1.0 | 0.5  | 0.4  | 0.4  | 0.8 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 4.4     | 2.2   | 1.2   | 2.0 | 1.1  | 1.9  | 0.4  | 1.7 | 0.1  | 1.3  | 0.1  |
| 津 田   | 本 年 度 | 2.1     | 2.6   | 3.4   | 0.8 | 0.5  | 0.3  | 欠測   | 0.2 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 6.1     | 3.7   | 1.4   | 2.4 | 1.8  | 2.0  | 2.2  | 欠測  | 0.3  | 0.3  | 0.1  |
| 志 度 湾 | 本 年 度 | 2.4     | 2.1   | 欠測    | 1.1 | 0.9  | 0.3  | 0.5  | 0.1 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 4.2     | 3.1   | 0.4   | 2.1 | 1.9  | 2.2  | 1.6  | 1.0 | 0.5  | 0.6  | 0.1  |
| 庵 治   | 本 年 度 | 2.4     | 2.2   | 2.9   | 1.6 | 0.7  | 0.9  | 0.8  | 0.4 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 3.8     | 3.0   | 0.7   | 2.0 | 2.5  | 2.6  | 2.9  | 1.3 | 0.8  | 0.5  | 0.1  |
| 瀬 戸 内 | 本 年 度 | 3.2     | 3.1   | 3.0   | 1.0 | 0.3  | 0.7  | 2.2  | 0.2 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 3.3     | 3.1   | 1.9   | 2.2 | 3.0  | 2.3  | 1.6  | 1.0 | 0.4  | 0.6  | 0.2  |
| 香 西   | 本 年 度 | 2.3     | 2.9   | 3.3   | 0.8 | 0.6  | 0.7  | 0.7  | 0.2 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 3.1     | 2.7   | 1.8   | 2.0 | 2.5  | 3.4  | 2.1  | 1.4 | 0.1  | 0.5  | 1.0  |
| 下 笠 居 | 本 年 度 | 1.4     | 1.6   | 2.2   | 0.6 | 0.4  | 0.5  | 0.4  | 0.1 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 2.4     | 1.7   | 1.2   | 2.1 | 2.2  | 2.0  | 0.8  | 0.5 | 0.0  | 0.1  | 0.0  |
| 直 島   | 本 年 度 | 2.2     | 2.1   | 2.5   | 0.6 | 0.4  | 0.4  | 0.3  | 0.1 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 3.5     | 3.1   | 1.6   | 2.7 | 1.7  | 4.8  | 1.1  | 0.6 | 0.3  | 0.2  | 0.2  |
| 土 庄   | 本 年 度 | 2.1     | 1.7   | 5.9   | 0.8 | 0.6  | 0.3  | 0.2  | 欠測  |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 3.8     | 3.0   | 0.7   | 3.3 | 欠測   | 3.2  | 1.2  | 0.4 | 0.1  | 0.8  | 0.3  |
| 四 海   | 本 年 度 | 2.1     | 2.3   | 3.0   | 0.8 | 0.4  | 0.3  | 0.6  | 0.2 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 5.0     | 3.5   | 1.3   | 2.0 | 2.0  | 2.2  | 1.5  | 0.4 | 0.4  | 0.2  | 欠測   |
| 唐 櫃   | 本 年 度 | 1.7     | 1.9   | 3.0   | 0.6 | 0.3  | 0.2  | 0.5  | 0.1 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 3.3     | 2.3   | 0.9   | 1.5 | 1.4  | 1.9  | 0.7  | 0.3 | 1.1  | 0.1  | 0.3  |
| 北 浦   | 本 年 度 | 2.4     | 2.3   | 3.0   | 0.9 | 0.6  | 0.6  | 0.3  | 0.2 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 4.8     | 3.0   | 1.8   | 1.6 | 1.5  | 2.2  | 1.2  | 0.4 | 0.1  | 0.1  | 0.1  |
| 大 部   | 本 年 度 | 2.2     | 2.4   | 3.0   | 1.5 | 0.9  | 0.2  | 0.2  | 0.1 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 4.5     | 3.4   | 1.1   | 4.4 | 2.9  | 2.0  | 1.3  | 0.9 | 2.7  | 0.7  | 0.6  |
| 内 海   | 本 年 度 | 1.8     | 2.3   | 2.7   | 0.9 | 0.7  | 0.5  | 0.3  | 0.1 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 4.4     | 3.9   | 2.0   | 3.1 | 2.3  | 1.9  | 2.2  | 1.1 | 1.4  | 0.8  | 1.1  |
| 与 島   | 本 年 度 | 4.7     | 2.2   | 3.8   | 0.7 | 0.4  | 0.7  | 0.7  | 0.2 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 3.4     | 3.5   | 2.0   | 4.3 | 3.9  | 0.6  | 1.3  | 1.9 | 1.7  | 0.9  | 2.0  |
| 丸 亀 市 | 本 年 度 | 0.3     | 0.8   | 1.4   | 1.4 | 0.6  | 0.7  | 0.6  | 欠測  |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 2.3     | 0.5   | 2.3   | 1.4 | 2.4  | 0.7  | 0.0  | 0.4 | 0.2  | 0.1  | 0.1  |
| 箱 浦   | 本 年 度 | 0.5     | 0.5   | 0.6   | 0.2 | 0.3  | 0.3  | 0.4  | 0.1 |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 1.5     | 0.6   | 1.6   | 1.1 | 1.3  | 0.2  | 0.0  | 0.1 | 0.0  | 0.1  | 0.0  |
| 宇 多 津 | 本 年 度 | 欠測      | 2.0   | 欠測    | 1.9 | 欠測   | 欠測   | 欠測   | 欠測  |      |      |      |
|       | 前 年 度 | 2.4     | 2.2   | 欠測    | 欠測  | 欠測   | 0.1  | 欠測   | 欠測  | 欠測   | 0.1  | 0.4  |
| 平 均   | 本 年 度 | 2.2     | 2.2   | 3.1   | 1.0 | 0.6  | 0.5  | 0.6  | 0.3 | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
|       | 前 年 度 | 3.8     | 2.8   | 1.5   | 2.4 | 2.2  | 2.1  | 1.3  | 0.9 | 0.6  | 0.5  | 0.4  |

※三態窒素：アンモニア・硝酸・亜硝酸態窒素の合計で、 $3\mu\text{g at/l}$ 以下になると色落ちの原因となる。

(調査結果)

本年度第16回目の栄養塩調査を実施しました。調査結果は、 $0.1\sim 1.4\mu\text{g at/l}$ 。全漁場における平均は $0.3\mu\text{g at/l}$ で、前年度( $0.9\mu\text{g at/l}$ )より低い結果となっています。

② 植物プランクトン

(分析機関：香川県赤潮研究所、 単位：個/ℓ)

| 漁 場    | 植 物 プ ラ ン ク ト ン 数 |     |       |     |             |       | 備 考      |        |
|--------|-------------------|-----|-------|-----|-------------|-------|----------|--------|
|        | コ シ ノ デ ィ ス カ ス   |     |       |     | ユ ー カ ン ピ ア |       | 珪藻優占種第1位 |        |
|        | 2月3日              |     | 前年同時期 |     | 2月3日        | 前年同時期 |          |        |
|        | ワレシ-              | 全数  | ワレシ-  | 全数  |             |       |          |        |
| 引 田    | 0                 | 0   | 0     | 0   | 0           | 0     | グイナルディア  | 6,025  |
| 東 讃    | 0                 | 0   | 0     | 0   | 0           | 0     | グイナルディア  | 4,200  |
| 津 田    | 0                 | 0   | 欠測    | 欠測  | 975         | 欠測    | グイナルディア  | 7,525  |
| 志 度 湾  | 0                 | 0   | 0     | 0   | 50          | 0     | グイナルディア  | 33,750 |
| 庵 治    | 0                 | 0   | 0     | 0   | 27,400      | 0     | グイナルディア  | 49,300 |
| 高松市瀬戸内 | 0                 | 0   | 0     | 0   | 3,300       | 0     | グイナルディア  | 74,500 |
| 香 西    | 0                 | 0   | 0     | 0   | 2,000       | 0     | グイナルディア  | 81,400 |
| 下 笠 居  | 0                 | 0   | 0     | 0   | 2,900       | 0     | グイナルディア  | 51,600 |
| 直 島    | 0                 | 0   | 0     | 0   | 0           | 0     | グイナルディア  | 80,200 |
| 土 庄    | 欠測                | 欠測  | 0     | 0   | 欠測          | 0     | 欠測       | 欠測     |
| 四 海    | 0                 | 100 | 0     | 0   | 0           | 0     | グイナルディア  | 62,500 |
| 唐 櫃    | 100               | 100 | 0     | 0   | 1,900       | 0     | グイナルディア  | 40,900 |
| 北 浦    | 100               | 100 | 50    | 150 | 6,400       | 0     | グイナルディア  | 53,000 |
| 大 部    | 0                 | 0   | 0     | 0   | 0           | 0     | グイナルディア  | 29,900 |
| 内 海    | 0                 | 0   | 0     | 0   | 3,600       | 0     | グイナルディア  | 15,700 |
| 与 島    | 0                 | 0   | 0     | 0   | 3,100       | 0     | グイナルディア  | 95,700 |
| 丸 亀 市  | 欠測                | 欠測  | 0     | 0   | 欠測          | 0     | 欠測       | 欠測     |
| 箱 浦    | 0                 | 0   | 0     | 0   | 0           | 0     | グイナルディア  | 75,000 |
| 宇 多 津  | 欠測                | 欠測  | 欠測    | 欠測  | 欠測          | 欠測    | 欠測       | 欠測     |

(調査結果)

i) コシノディスカス ワレシー

唐櫃、北浦の100個/ℓを最高に2漁場で検出されています。

ii) ユーカンピア

庵治の27,400個/ℓを最高に10漁場で検出されています。

iii) 珪藻優占種

グイナルディアが主に優占して出現しています。

※ 次回調査は、2月10日(火)に予定します。

# ノリ養殖漁場米養塩調査結果 第16回(令和8年2月3日)

