


1. 屋島湾の海水温 (午前9時)

2月10日の屋島湾の海水温は 8.5℃で、昨年度より1.0℃高く、平年値より0.2℃高くなっています。

2. 摘採の状況

水温は寒波の影響で急激に低下しましたが、昨年度より高くなっています。全漁場で摘採中であり、早い漁場では8回目の摘採中、一部漁場では網揚げを開始。

東讃: 東讃は3回目、津田は4回目、引田、牟礼は5回目、鴨庄は6回目、庵治は8回目を摘採。伸びは一部漁場ではまずまずだがかなり悪く、色艶はかなり浅い。引田は30%、牟礼は10%、庵治は20%状態の悪い網を整理中。東讃は2月1日から網揚げ開始。

高松: 下笠居で5回目、瀬戸内、香西で6回目、直島で7回目を摘採。伸びはかなり悪く、色艶もかなり浅い。香西は2月9日より網揚げを開始し、15%網揚げ。直島は2月12日より網揚げを開始予定。

小豆: 土庄中央は4回目、北浦、唐櫃、内海は5回目、四海、大部は6回目を摘採。伸びはかなり悪く、色艶もかなり浅い。唐櫃は状態の悪い網を整理中。大部は状態の悪い網を60%整理中。北浦、内海は60%網揚げ。土庄中央は2月13日網揚げ開始予定。

中讃: 丸亀は2回目、与島、宇多津は4回目を摘採。伸びはやや悪く、色艶もやや浅い。与島は2月中旬に網揚げ開始予定。

3. 栄養塩及びプランクトン

採水日:令和8年2月10日

① 栄 養 塩

(分析機関:香川県水産試験場、単位: $\mu\text{g at/l}$)

漁 場		三 態 窒 素										
		12/9	12/16	12/26	1/6	1/13	1/20	1/27	2/3	2/10	2/17	2/24
引 田	本 年 度	3.0	3.7	5.8	2.4	1.1	0.8	0.5	1.4	0.6		
	前 年 度	3.7	4.0	2.4	2.6	2.6	1.4	0.5	2.4	0.8	0.6	0.8
東 讃	本 年 度	2.5	2.1	3.0	1.0	0.5	0.4	0.4	0.8	0.5		
	前 年 度	4.4	2.2	1.2	2.0	1.1	1.9	0.4	1.7	0.1	1.3	0.1
津 田	本 年 度	2.1	2.6	3.4	0.8	0.5	0.3	欠測	0.2	0.4		
	前 年 度	6.1	3.7	1.4	2.4	1.8	2.0	2.2	欠測	0.3	0.3	0.1
志 度 湾	本 年 度	2.4	2.1	欠測	1.1	0.9	0.3	0.5	0.1	0.2		
	前 年 度	4.2	3.1	0.4	2.1	1.9	2.2	1.6	1.0	0.5	0.6	0.1
庵 治	本 年 度	2.4	2.2	2.9	1.6	0.7	0.9	0.8	0.4	0.3		
	前 年 度	3.8	3.0	0.7	2.0	2.5	2.6	2.9	1.3	0.8	0.5	0.1
瀬 戸 内	本 年 度	3.2	3.1	3.0	1.0	0.3	0.7	2.2	0.2	0.1		
	前 年 度	3.3	3.1	1.9	2.2	3.0	2.3	1.6	1.0	0.4	0.6	0.2
香 西	本 年 度	2.3	2.9	3.3	0.8	0.6	0.7	0.7	0.2	0.2		
	前 年 度	3.1	2.7	1.8	2.0	2.5	3.4	2.1	1.4	0.1	0.5	1.0
下 笠 居	本 年 度	1.4	1.6	2.2	0.6	0.4	0.5	0.4	0.1	0.1		
	前 年 度	2.4	1.7	1.2	2.1	2.2	2.0	0.8	0.5	0.0	0.1	0.0
直 島	本 年 度	2.2	2.1	2.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2		
	前 年 度	3.5	3.1	1.6	2.7	1.7	4.8	1.1	0.6	0.3	0.2	0.2
土 庄	本 年 度	2.1	1.7	5.9	0.8	0.6	0.3	0.2	欠測	欠測		
	前 年 度	3.8	3.0	0.7	3.3	欠測	3.2	1.2	0.4	0.1	0.8	0.3
四 海	本 年 度	2.1	2.3	3.0	0.8	0.4	0.3	0.6	0.2	0.1		
	前 年 度	5.0	3.5	1.3	2.0	2.0	2.2	1.5	0.4	0.4	0.2	欠測
唐 櫃	本 年 度	1.7	1.9	3.0	0.6	0.3	0.2	0.5	0.1	0.1		
	前 年 度	3.3	2.3	0.9	1.5	1.4	1.9	0.7	0.3	1.1	0.1	0.3
北 浦	本 年 度	2.4	2.3	3.0	0.9	0.6	0.6	0.3	0.2	0.1		
	前 年 度	4.8	3.0	1.8	1.6	1.5	2.2	1.2	0.4	0.1	0.1	0.1
大 部	本 年 度	2.2	2.4	3.0	1.5	0.9	0.2	0.2	0.1	0.1		
	前 年 度	4.5	3.4	1.1	4.4	2.9	2.0	1.3	0.9	2.7	0.7	0.6
内 海	本 年 度	1.8	2.3	2.7	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0.2		
	前 年 度	4.4	3.9	2.0	3.1	2.3	1.9	2.2	1.1	1.4	0.8	1.1
与 島	本 年 度	4.7	2.2	3.8	0.7	0.4	0.7	0.7	0.2	0.3		
	前 年 度	3.4	3.5	2.0	4.3	3.9	0.6	1.3	1.9	1.7	0.9	2.0
丸 亀 市	本 年 度	0.3	0.8	1.4	1.4	0.6	0.7	0.6	欠測	欠測		
	前 年 度	2.3	0.5	2.3	1.4	2.4	0.7	0.0	0.4	0.2	0.1	0.1
箱 浦	本 年 度	0.5	0.5	0.6	0.2	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2		
	前 年 度	1.5	0.6	1.6	1.1	1.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
宇 多 津	本 年 度	欠測	2.0	欠測	1.9	欠測	欠測	欠測	欠測	0.3		
	前 年 度	2.4	2.2	欠測	欠測	欠測	0.1	欠測	欠測	欠測	0.1	0.4
平 均	本 年 度	2.2	2.2	3.1	1.0	0.6	0.5	0.6	0.3	0.2	0.0	0.0
	前 年 度	3.8	2.8	1.5	2.4	2.2	2.1	1.3	0.9	0.6	0.5	0.4

※三態窒素：アンモニア・硝酸・亜硝酸態窒素の合計で、 $3 \mu\text{g at/l}$ 以下になると色落ちの原因となる。

(調査結果)

本年度第17回目の栄養塩調査を実施しました。調査結果は、 $0.1 \sim 0.6 \mu\text{g at/l}$ 。全漁場における平均は $0.2 \mu\text{g at/l}$ で、前年度 ($0.6 \mu\text{g at/l}$) より低い結果となっています。

② 植物プランクトン

(分析機関：香川県赤潮研究所、 単位：個/ℓ)

漁 場	植 物 プ ラ ン ク ト ン 数						備 考	
	コ シ ノ デ ィ ス カ ス				ユ ー カ ン ピ ア		珪藻優占種第1位	
	2月10日		前年同時期		2月10日	前年同時期		
	ワイレシー	全数	ワイレシー	全数				
引 田	0	25	0	0	0	0	グイナルディア	13,725
東 讃	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	30,250
津 田	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	24,000
志 度 湾	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	52,250
庵 治	0	0	0	0	7,725	0	グイナルディア	38,250
高松市瀬戸内	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	38,800
香 西	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	156,000
下 笠 居	0	0	0	0	6,200	0	グイナルディア	54,200
直 島	0	0	0	50	0	0	グイナルディア	47,300
土 庄	欠測	欠測	0	0	欠測	0	欠測	欠測
四 海	0	0	0	100	0	0	グイナルディア	111,900
唐 櫃	0	0	0	50	0	0	グイナルディア	62,800
北 浦	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	56,800
大 部	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	74,700
内 海	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	25,000
与 島	0	0	0	0	0	0	グイナルディア	112,500
丸 亀 市	欠測	欠測	0	0	欠測	0	欠測	欠測
箱 浦	0	0	0	0	0	350	グイナルディア	17,800
宇 多 津	0	0	欠測	欠測	1,100	欠測	グイナルディア	64,200

(調査結果)

i) コシノディスカス ワイレシー
全漁場で検出されていません。

ii) ユーカンピア
庵治の7,725個/ℓを最高に3漁場で検出されています。

iii) 珪藻優占種
グイナルディアが主に優占して出現しています。

※ 次回調査は、2月17日(火)に予定します。

ノリ養殖漁場栄養塩調査結果
第17回(令和8年2月10日)

