


ノリ養殖情報

(令和8年度：第1報 8年10月13日)

香川県漁業協同組合連合会

指導課 (TEL 087-825-0351)

1. 屋島湾の海水温 (午前9時)



10月13日の屋島湾の海水温は 25.2℃で、昨年度より1.1℃低く、平年値より1.3℃高くなっています。

2. 育苗について

県内の海水温は平年値より高めの状態が続いており、育苗の開始は水温の降下待ちとなっています。平年より気温の高い日が続くことが予報されていることから、県内の海水温が育苗の目安となる23℃以下まで降下するのは月末になる可能性があります。

漁場ごとの水温を十分に把握して、育苗の開始時期を検討してください。

3. 栄養塩及びプランクトン

採水日:令和8年10月13日

① 栄 養 塩

(分析機関:香川県水産試験場、単位: $\mu\text{g at/l}$)

漁 場		三 態 窒 素										
		10/13	10/20	10/27	11/4	11/10	11/17	11/24	12/1	12/8	12/15	12/22
引 田	本 年 度	4.6										
	前 年 度	3.1	欠測	3.9	2.1	1.8	2.7	1.9	1.8	3.0	3.7	5.8
東 讃	本 年 度	4.3										
	前 年 度	2.7	1.5	1.3	0.7	1.4	0.7	1.3	1.4	2.5	2.1	3.0
津 田	本 年 度	9.7										
	前 年 度	2.7	5.3	1.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.1	2.1	2.6	3.4
志 度 湾	本 年 度	7.6										
	前 年 度	4.1	2.2	1.1	0.7	1.1	1.1	1.0	1.2	2.4	2.1	欠測
庵 治	本 年 度	7.5										
	前 年 度	4.8	2.5	1.4	0.9	1.3	1.0	1.2	1.5	2.4	2.2	2.9
瀬 戸 内	本 年 度	9.0										
	前 年 度	5.4	3.8	3.6	1.0	1.7	1.4	2.0	1.8	3.2	3.1	3.0
香 西	本 年 度	7.9										
	前 年 度	5.2	2.7	3.3	1.1	1.6	1.2	1.2	1.9	2.3	2.9	3.3
下 笠 居	本 年 度	5.3										
	前 年 度	5.0	4.7	4.1	1.5	0.9	1.0	1.9	1.7	1.4	1.6	2.2
直 島	本 年 度	9.3										
	前 年 度	7.5	5.4	3.8	1.7	3.0	2.1	2.9	1.6	2.2	2.1	2.5
土 庄	本 年 度	4.9										
	前 年 度	3.0	5.0	3.4	1.1	1.1	0.7	1.4	1.4	2.1	1.7	5.9
四 海	本 年 度	9.6										
	前 年 度	6.0	5.2	1.6	0.8	1.0	0.5	1.1	1.9	2.1	2.3	3.0
唐 櫃	本 年 度	9.6										
	前 年 度	4.1	4.4	2.5	1.0	0.8	0.3	1.0	1.2	1.7	1.9	3.0
北 浦	本 年 度	10.1										
	前 年 度	5.9	5.1	2.3	0.7	1.8	1.1	1.7	1.6	2.4	2.3	3.0
大 部	本 年 度	7.8										
	前 年 度	3.4	3.3	2.1	0.6	0.9	0.6	1.5	1.3	2.2	2.4	3.0
内 海	本 年 度	5.5										
	前 年 度	2.3	2.1	1.2	0.7	0.7	0.8	1.1	1.0	1.8	2.3	2.7
与 島	本 年 度	1.0										
	前 年 度	1.8	5.5	1.0	5.5	1.9	1.9	1.4	2.0	4.7	2.2	3.8
丸 亀 市	本 年 度	欠測										
	前 年 度	1.7	2.5	欠測	1.3	1.1	0.3	0.6	0.3	0.3	0.8	1.4
箱 浦	本 年 度	0.8										
	前 年 度	0.7	0.7	2.4	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6
宇 多 津	本 年 度	欠測										
	前 年 度	28.9	欠測	1.2	2.7	9.8	0.7	0.3	1.6	欠測	2.0	欠測
平 均	本 年 度	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前 年 度	3.9	3.6	2.4	1.3	1.3	1.1	1.4	1.4	2.2	2.2	3.1

※三態窒素：アンモニア・硝酸・亜硝酸態窒素の合計で、 $3\mu\text{g at/l}$ 以下になると色落ちの原因となる。

(調査結果)

本年度第1回目の栄養塩調査を実施しました。調査結果は、 $0.8\sim 10.1\mu\text{g at/l}$ 。全漁場における平均は $6.7\mu\text{g at/l}$ で、前年度($3.9\mu\text{g at/l}$)より高い結果となっています。

② 植物プランクトン

(分析機関：香川県赤潮研究所、 単位：個/ℓ)

漁 場	植 物 プ ラ ン ク ト ン 数						備 考	
	コ シ ノ デ ィ ス カ ス				ユ ー カ ン ピ ア		珪藻優占種第1位	
	10月13日		前年同時期		10月13日	前年同時期		
	ワイルー	全数	ワイルー	全数				
引 田	20	300	1,975	1,975	0	150	ベロケア	62,000
東 讃	20	80	525	525	0	300	ベロケア	56,000
津 田	0	10	775	775	0	6,175	コシノディスカス	10
志 度 湾	10	50	550	550	0	0	プレウロシグマ	1,000
庵 治	10	40	375	375	0	0	コシノディスカス	40
高松市瀬戸内	330	370	225	675	0	0	リゾソレニア	3,000
香 西	1,110	1,160	325	1,200	0	0	レプトシリンドラス	6,000
下 笠 居	2,520	2,560	75	550	0	0	コシノディスカス	2,560
直 島	220	240	225	225	0	0	ベロケア	20,000
土 庄	0	20	600	1,750	0	0	メロシラ	16,000
四 海	50	130	425	425	0	0	コシノディスカス	130
唐 櫃	50	170	200	200	0	1,425	コシノディスカス	170
北 浦	20	50	500	500	0	0	タラシオネマ	4,000
大 部	20	350	550	550	0	0	プレウロシグマ	1,000
内 海	20	90	175	175	0	0	ラウデリア	7,000
与 島	1,940	1,970	350	2,750	0	0	プレウロシグマ	2,000
丸 亀 市	欠測	欠測	250	1,575	欠測	0	欠測	欠測
箱 浦	1,030	1,090	575	2,525	0	0	プレウロシグマ	2,000
宇 多 津	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測

(調査結果)

i) コシノディスカス ワイレシー

下笠居の2,520個/ℓを最高に15漁場で検出されています。

ii) ユーカンピア

全漁場で検出されていません。

iii) 珪藻優占種

コシノディスカス、プレウロシグマが主に優占して出現しています。

※ 次回調査は、10月20日(火)に予定します。

ノリ養殖漁場米養塩調査結果 第1回(令和8年10月13日)

