
ノ　リ　養　殖　情　報

（令和８年度　：　第３報　８年１０月２７日）

香川県漁業協同組合連合会
指導課（TEL 087-825-0351）

１．屋島湾の海水温（午前９時）



10月27日の屋島湾の海水温は 24.0℃で、昨年度より0.4℃高く、平年値より2.1℃高くなっています。

２．育苗について

県内の海水温は高気温の影響からほぼ横ばいとなり、24日以降は昨年より高水温で推移しています。漁場ごとの水温を十分に把握して、育苗の開始時期を検討してください。

東讃：全地区で種網確保。鴨庄は10月27日に育苗開始。庵治は10月28日、牟礼は10月30日に育苗開始予定。引田、東讃、津田の育苗開始は未定。

高松：全地区で種網確保。直島は一部10月24日に育苗開始。瀬戸内は10月29日、香西は10月30日に育苗開始予定。下笠居は育苗開始が未定。

小豆：土庄以外の全地区で種網確保。唐櫃は10月23日、内海は10月25日、四海、北浦は10月27日に育苗開始。内海は10％育苗中。土庄、大部は育苗開始が未定。

中讃：全地区で種網確保、育苗開始は未定。

3. 栄養塩及びプランクトン

採水日：令和8年10月27日

① 栄 養 塩

（分析機関：香川県水産試験場、 単位：μg at/ℓ）

漁場		三態窒素										
		10/13	10/20	10/27	11/4	11/10	11/17	11/24	12/1	12/8	12/15	12/22
引田	本年度	4.6	1.7	5.4								
	前年度	3.1	欠測	3.9	2.1	1.8	2.7	1.9	1.8	3.0	3.7	5.8
東讃	本年度	4.3	3.8	3.6								
	前年度	2.7	1.5	1.3	0.7	1.4	0.7	1.3	1.4	2.5	2.1	3.0
津田	本年度	9.7	7.0	2.3								
	前年度	2.7	5.3	1.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.1	2.1	2.6	3.4
志度湾	本年度	7.6	5.1	4.0								
	前年度	4.1	2.2	1.1	0.7	1.1	1.1	1.0	1.2	2.4	2.1	欠測
庵治	本年度	7.5	6.4	5.1								
	前年度	4.8	2.5	1.4	0.9	1.3	1.0	1.2	1.5	2.4	2.2	2.9
瀬戸内	本年度	9.0	11.3	8.3								
	前年度	5.4	3.8	3.6	1.0	1.7	1.4	2.0	1.8	3.2	3.1	3.0
香西	本年度	7.9	5.6	7.1								
	前年度	5.2	2.7	3.3	1.1	1.6	1.2	1.2	1.9	2.3	2.9	3.3
下笠居	本年度	5.3	6.5	6.7								
	前年度	5.0	4.7	4.1	1.5	0.9	1.0	1.9	1.7	1.4	1.6	2.2
直島	本年度	9.3	7.8	6.7								
	前年度	7.5	5.4	3.8	1.7	3.0	2.1	2.9	1.6	2.2	2.1	2.5
土庄	本年度	4.9	3.2	4.7								
	前年度	3.0	5.0	3.4	1.1	1.1	0.7	1.4	1.4	2.1	1.7	5.9
四海	本年度	9.6	7.1	4.9								
	前年度	6.0	5.2	1.6	0.8	1.0	0.5	1.1	1.9	2.1	2.3	3.0
唐櫃	本年度	9.6	8.5	5.6								
	前年度	4.1	4.4	2.5	1.0	0.8	0.3	1.0	1.2	1.7	1.9	3.0
北浦	本年度	10.1	6.9	4.1								
	前年度	5.9	5.1	2.3	0.7	1.8	1.1	1.7	1.6	2.4	2.3	3.0
大部	本年度	7.8	4.1	1.3								
	前年度	3.4	3.3	2.1	0.6	0.9	0.6	1.5	1.3	2.2	2.4	3.0
内海	本年度	5.5	2.5	2.7								
	前年度	2.3	2.1	1.2	0.7	0.7	0.8	1.1	1.0	1.8	2.3	2.7
与島	本年度	1.0	4.6	6.6								
	前年度	1.8	5.5	1.0	5.5	1.9	1.9	1.4	2.0	4.7	2.2	3.8
丸亀市	本年度	欠測	3.1	6.1								
	前年度	1.7	2.5	欠測	1.3	1.1	0.3	0.6	0.3	0.3	0.8	1.4
箱浦	本年度	0.8	1.5	1.5								
	前年度	0.7	0.7	2.4	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6
宇多津	本年度	欠測	7.5	8.1								
	前年度	28.9	欠測	1.2	2.7	9.8	0.7	0.3	1.6	欠測	2.0	欠測
平均	本年度	6.7	5.4	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前年度	3.9	3.6	2.4	1.3	1.3	1.1	1.4	1.4	2.2	2.2	3.1

※三態窒素：アンモニア・硝酸・亜硝酸態窒素の合計で、３μg at/ℓ以下になると色落ちの原因となる。

（調査結果）

本年度第３回目の栄養塩調査を実施しました。調査結果は、１．３～８．３μg at/ℓ。全漁場における平均は４．８μg at/ℓで、前年度（２．４μg at/ℓ）より高い結果となっています。

② 植物プランクトン

（分析機関：香川県赤潮研究所、 単位：個/ℓ）

漁場	植物プランクトン数						備考	
	コシノディスカス				ユーカンピア		珪藻優占種第1位	
	10月27日		前年同時期		10月27日	前年同時期		
	ワイレシー	全数	ワイレシー	全数				
引田	90	140	1,350	1,525	0	0	キートセロス	34,000
東讃	160	190	250	325	0	0	ベレロケア	23,000
津田	160	220	2,975	3,025	0	0	ベレロケア	39,000
志度湾	90	90	3,500	3,775	0	1,450	キートセロス	21,000
庵治	60	80	1,975	2,225	0	53,225	ベレロケア	31,000
高松市瀬戸内	60	100	2,725	4,000	0	0	ベレロケア	28,000
香西	160	160	2,950	4,375	0	3,675	プレウロシグマ	3,000
下笠居	40	80	2,275	4,350	0	3,050	プレウロシグマ	2,000
直島	70	90	1,725	1,850	0	0	プレウロシグマ	2,000
土庄	40	70	375	950	0	2,700	ベレロケア	74,000
四海	20	100	1,475	3,225	0	0	ベレロケア	101,000
唐櫃	0	50	1,400	2,875	0	575	ベレロケア	65,000
北浦	10	30	2,575	5,700	0	475	ベレロケア	66,000
大部	20	60	575	3,150	0	0	ベレロケア	84,000
内海	50	90	1,300	1,425	0	1,875	ベレロケア	44,000
与島	10	110	3,275	7,575	0	725	プレウロシグマ	1,000
丸亀市	0	0	欠測	欠測	0	欠測	プレウロシグマ	2,000
箱浦	20	120	625	2,375	0	2,675	タラシオシラ	7,000
宇多津	10	40	欠測	欠測	0	欠測	プレウロシグマ	2,000

（調査結果）

ⅰ）コシノディスカス ワイレシー

東讃、津田、香西の１６０個/ℓを最高に１７漁場で検出されています。


ⅱ）ユーカンピア

全漁場で検出されていません。

ⅲ）珪藻優占種

ベレロケア、プレウロシグマが主に優占して出現しています。

※ 次回調査は、11月4日(水)に予定します。


ノリ養殖漁場栄養塩調査結果
第3回（令和8年10月27日）
1.29
4.11
5.59
4.88
6.68
4.72
2.72
5.12
6.70
7.13
8.34
3.97
6.58
8.12
6.14
2.27
1.51
3.60
5.35
県平均　4.82 μg at/ℓ
0 5 10 15 20km