
ノ　リ　養　殖　情　報

（令和８年度　：　第４報　８年１１月４日）

香川県漁業協同組合連合会
指導課（TEL 087-825-0351）

１．屋島湾の海水温（午前９時）



11月4日の屋島湾の海水温は 22.2℃で、昨年度より0.7℃高く、平年値より1.6℃高くなっています。

２．育苗について

県内の海水温は日中の高気温の影響からほぼ横ばいとなり、昨年より高水温で推移しています。育苗は概ね順調に経過しており、順次冷凍入庫される予定です。

東讃：鴨庄は10月27日、庵治は10月28日、東讃、牟礼は10月29日、引田、津田は10月30日に育苗開始。東讃、津田、鴨庄、牟礼、庵治は100%、引田は40%育苗中。

高松：直島は10月24日、瀬戸内は10月29日、下笠居10月31日、香西は11月1日に育苗開始。瀬戸内、下笠居、直島は100%育苗中。瀬戸内は11月18日冷凍入庫開始予定。

小豆：唐櫃は10月23日、内海は10月25日、四海、大部、北浦は10月27日、土庄は10月31日に育苗開始。大部、北浦、唐櫃、内海は100％、四海は70%育苗中。

中讃：与島は10月31日、丸亀は11月3日に育苗開始。宇多津は未定。

3. 栄養塩及びプランクトン

採水日：令和8年11月4日

① 栄 養 塩

（分析機関：香川県水産試験場、 単位：μg at/ℓ）

漁場		三態窒素										
		10/13	10/20	10/27	11/4	11/10	11/17	11/24	12/1	12/8	12/15	12/22
引田	本年度	4.6	1.7	5.4	3.6							
	前年度	3.1	欠測	3.9	2.1	1.8	2.7	1.9	1.8	3.0	3.7	5.8
東讃	本年度	4.3	3.8	3.6	2.7							
	前年度	2.7	1.5	1.3	0.7	1.4	0.7	1.3	1.4	2.5	2.1	3.0
津田	本年度	9.7	7.0	2.3	2.5							
	前年度	2.7	5.3	1.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.1	2.1	2.6	3.4
志度湾	本年度	7.6	5.1	4.0	5.7							
	前年度	4.1	2.2	1.1	0.7	1.1	1.1	1.0	1.2	2.4	2.1	欠測
庵治	本年度	7.5	6.4	5.1	7.0							
	前年度	4.8	2.5	1.4	0.9	1.3	1.0	1.2	1.5	2.4	2.2	2.9
瀬戸内	本年度	9.0	11.3	8.3	8.7							
	前年度	5.4	3.8	3.6	1.0	1.7	1.4	2.0	1.8	3.2	3.1	3.0
香西	本年度	7.9	5.6	7.1	9.0							
	前年度	5.2	2.7	3.3	1.1	1.6	1.2	1.2	1.9	2.3	2.9	3.3
下笠居	本年度	5.3	6.5	6.7	7.4							
	前年度	5.0	4.7	4.1	1.5	0.9	1.0	1.9	1.7	1.4	1.6	2.2
直島	本年度	9.3	7.8	6.7	7.7							
	前年度	7.5	5.4	3.8	1.7	3.0	2.1	2.9	1.6	2.2	2.1	2.5
土庄	本年度	4.9	3.2	4.7	6.2							
	前年度	3.0	5.0	3.4	1.1	1.1	0.7	1.4	1.4	2.1	1.7	5.9
四海	本年度	9.6	7.1	4.9	7.5							
	前年度	6.0	5.2	1.6	0.8	1.0	0.5	1.1	1.9	2.1	2.3	3.0
唐櫃	本年度	9.6	8.5	5.6	9.4							
	前年度	4.1	4.4	2.5	1.0	0.8	0.3	1.0	1.2	1.7	1.9	3.0
北浦	本年度	10.1	6.9	4.1	7.1							
	前年度	5.9	5.1	2.3	0.7	1.8	1.1	1.7	1.6	2.4	2.3	3.0
大部	本年度	7.8	4.1	1.3	3.9							
	前年度	3.4	3.3	2.1	0.6	0.9	0.6	1.5	1.3	2.2	2.4	3.0
内海	本年度	5.5	2.5	2.7	3.5							
	前年度	2.3	2.1	1.2	0.7	0.7	0.8	1.1	1.0	1.8	2.3	2.7
与島	本年度	1.0	4.6	6.6	7.4							
	前年度	1.8	5.5	1.0	5.5	1.9	1.9	1.4	2.0	4.7	2.2	3.8
丸亀市	本年度	欠測	3.1	6.1	2.4							
	前年度	1.7	2.5	欠測	1.3	1.1	0.3	0.6	0.3	0.3	0.8	1.4
箱浦	本年度	0.8	1.5	1.5	1.9							
	前年度	0.7	0.7	2.4	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6
宇多津	本年度	欠測	7.5	8.1	2.2							
	前年度	28.9	欠測	1.2	2.7	9.8	0.7	0.3	1.6	欠測	2.0	欠測
平均	本年度	6.7	5.4	4.8	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前年度	3.9	3.6	2.4	1.3	1.3	1.1	1.4	1.4	2.2	2.2	3.1

※三態窒素：アンモニア・硝酸・亜硝酸態窒素の合計で、３μg at/ℓ以下になると色落ちの原因となる。

（調査結果）

本年度第４回目の栄養塩調査を実施しました。調査結果は、１．９～９．４μg at/ℓ。全漁場における平均は５．７μg at/ℓで、前年度（１．３μg at/ℓ）より高い結果となっています。

② 植物プランクトン

（分析機関：香川県赤潮研究所、 単位：個/ℓ）

漁場	植物プランクトン数						備考	
	コシノディスカス				ユーカンピア		珪藻優占種第1位	
	11月4日		前年同時期		11月4日	前年同時期		
	ワイレシー	全数	ワイレシー	全数				
引田	0	60	875	950	0	0	プレウロシグマ	2,000
東讃	0	160	1,250	1,300	0	0	タラシオシラ	46,000
津田	0	110	2,025	2,200	0	775	タラシオシラ	134,000
志度湾	0	50	1,925	2,000	0	0	タラシオシラ	2,000
庵治	0	40	3,950	4,050	0	1,000	ベレロケア	6,000
高松市瀬戸内	0	140	2,775	2,925	6,000	2,375	ユーカンピア	6,000
香西	0	60	2,650	2,875	0	0	コシノディスカス	60
下笠居	20	90	1,725	2,275	0	0	タラシオシラ	4,000
直島	10	90	4,900	4,950	0	875	タラシオシラ	2,000
土庄	0	130	2,775	3,000	0	800	ベレロケア	4,000
四海	0	50	2,400	2,475	0	0	タラシオシラ	4,000
唐櫃	0	90	4,700	4,775	0	150	ヘミアウルス	6,000
北浦	0	60	2,050	2,150	0	150	プレウロシグマ	3,000
大部	0	80	1,400	1,600	0	7,150	キートセロス	13,000
内海	0	90	5,475	5,550	0	875	タラシオシラ	31,000
与島	0	240	3,500	4,250	0	0	キートセロス	6,000
丸亀市	0	120	3,775	5,150	0	1,700	タラシオシラ	114,000
箱浦	0	40	2,400	3,000	0	2,600	レプトシリンダラス	11,000
宇多津	0	100	欠測	欠測	0	欠測	タラシオシラ	84,000

（調査結果）

ⅰ）コシノディスカス ワイレシー

下笠居の２０個/ℓを最高に２漁場で検出されています。

ⅱ）ユーカンピア

高松市瀬戸内の６，０００個/ℓ、１漁場のみで検出されています。

ⅲ）珪藻優占種

タラシオシラが主に優占して出現しています。

※ 次回調査は、11月10日（火）に予定します。

ノリ養殖漁場栄養塩調査結果
第4回（令和8年11月4日）

