ノ　リ　養　殖　情　報

（令和８年度　：　第６報　８年１１月１７日）

香川県漁業協同組合連合会
指導課（TEL 087-825-0351）

１．屋島湾の海水温（午前９時）



11月17日の屋島湾の海水温は 20.3℃で、昨年度より0.6℃高く、平年値より1.7℃高くなっています。

２．育苗について

県内の海水温は気温の低下に伴い徐々に低下していますが、昨年より高水温で推移しています。育苗は概ね順調に経過しており、順次冷凍入庫されています。

東讃：庵治は11月15日に入庫開始、80％入庫で11月18日に入庫終了予定。牟礼は11月16日に入庫開始、60％入庫で11月19日に入庫終了予定。鴨庄は11月16日に入庫開始、30％入庫。引田は11月18日に入庫開始予定。東讃、津田は未定。

高松：直島は11月14日に入庫開始。瀬戸内は11月16日に入庫開始、60％入庫で11月22～23日に入庫終了予定。下笠居は11月16日に入庫開始、20％入庫。香西は11月20日に入庫開始予定。

小豆：唐櫃は11月11日に入庫開始、11月16日には入庫終了、本張りは未定。内海は11月12日に入庫開始、80％入庫中で11月18日には終了。北浦は11月14日に入庫開始、30％入庫。大部は11月16日に入庫開始、50％入庫。四海は11月18日に入庫開始予定。土庄中央は未定。

中讃：与島は11/20以降、中讃西部は11月25日に入庫開始予定。宇多津は未定。

3. 栄養塩及びプランクトン

採水日：令和8年11月17日

① 栄 養 塩

（分析機関：香川県水産試験場、 単位：μg at/ℓ）

漁場		三態窒素										
		10/13	10/20	10/27	11/4	11/10	11/17	11/24	12/1	12/8	12/15	12/22
引田	本年度	4.6	1.7	5.4	3.6	4.9	6.4					
	前年度	3.1	欠測	3.9	2.1	1.8	2.7	1.9	1.8	3.0	3.7	5.8
東讃	本年度	4.3	3.8	3.6	2.7	3.3	5.7					
	前年度	2.7	1.5	1.3	0.7	1.4	0.7	1.3	1.4	2.5	2.1	3.0
津田	本年度	9.7	7.0	2.3	2.5	17.8	5.7					
	前年度	2.7	5.3	1.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.1	2.1	2.6	3.4
志度湾	本年度	7.6	5.1	4.0	5.7	6.2	7.4					
	前年度	4.1	2.2	1.1	0.7	1.1	1.1	1.0	1.2	2.4	2.1	欠測
庵治	本年度	7.5	6.4	5.1	7.0	7.0	9.0					
	前年度	4.8	2.5	1.4	0.9	1.3	1.0	1.2	1.5	2.4	2.2	2.9
瀬戸内	本年度	9.0	11.3	8.3	8.7	9.0	10.0					
	前年度	5.4	3.8	3.6	1.0	1.7	1.4	2.0	1.8	3.2	3.1	3.0
香西	本年度	7.9	5.6	7.1	9.0	8.7	81.7					
	前年度	5.2	2.7	3.3	1.1	1.6	1.2	1.2	1.9	2.3	2.9	3.3
下笠居	本年度	5.3	6.5	6.7	7.4	8.5	7.8					
	前年度	5.0	4.7	4.1	1.5	0.9	1.0	1.9	1.7	1.4	1.6	2.2
直島	本年度	9.3	7.8	6.7	7.7	8.0	10.2					
	前年度	7.5	5.4	3.8	1.7	3.0	2.1	2.9	1.6	2.2	2.1	2.5
土庄	本年度	4.9	3.2	4.7	6.2	6.0	7.8					
	前年度	3.0	5.0	3.4	1.1	1.1	0.7	1.4	1.4	2.1	1.7	5.9
四海	本年度	9.6	7.1	4.9	7.5	7.3	9.1					
	前年度	6.0	5.2	1.6	0.8	1.0	0.5	1.1	1.9	2.1	2.3	3.0
唐櫃	本年度	9.6	8.5	5.6	9.4	8.7	10.5					
	前年度	4.1	4.4	2.5	1.0	0.8	0.3	1.0	1.2	1.7	1.9	3.0
北浦	本年度	10.1	6.9	4.1	7.1	7.5	9.0					
	前年度	5.9	5.1	2.3	0.7	1.8	1.1	1.7	1.6	2.4	2.3	3.0
大部	本年度	7.8	4.1	1.3	3.9	5.6	7.5					
	前年度	3.4	3.3	2.1	0.6	0.9	0.6	1.5	1.3	2.2	2.4	3.0
内海	本年度	5.5	2.5	2.7	3.5	4.7	6.1					
	前年度	2.3	2.1	1.2	0.7	0.7	0.8	1.1	1.0	1.8	2.3	2.7
与島	本年度	1.0	4.6	6.6	7.4	6.9	欠測					
	前年度	1.8	5.5	1.0	5.5	1.9	1.9	1.4	2.0	4.7	2.2	3.8
丸亀市	本年度	欠測	3.1	6.1	2.4	3.0	7.9					
	前年度	1.7	2.5	欠測	1.3	1.1	0.3	0.6	0.3	0.3	0.8	1.4
箱浦	本年度	0.8	1.5	1.5	1.9	2.7	3.5					
	前年度	0.7	0.7	2.4	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6
宇多津	本年度	欠測	7.5	8.1	2.2	6.3	5.6					
	前年度	28.9	欠測	1.2	2.7	9.8	0.7	0.3	1.6	欠測	2.0	欠測
平均	本年度	6.7	5.4	4.8	5.7	7.0	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前年度	3.9	3.6	2.4	1.3	1.3	1.1	1.4	1.4	2.2	2.2	3.1

※三態窒素：アンモニア・硝酸・亜硝酸態窒素の合計で、３μg at/ℓ以下になると色落ちの原因となる。

（調査結果）

本年度第６回目の栄養塩調査を実施しました。調査結果は、３．５～８１．７μg at/ℓ。全漁場における平均は１２．１μg at/ℓで、前年度（１．１μg at/ℓ）より高い結果となっています。

※香西の８１．７μg at/ℓは河川水が沖合まで流入した可能性あり。

② 植物プランクトン

（分析機関：香川県赤潮研究所、 単位：個/ℓ）

漁場	植物プランクトン数						備考	
	コシノディスカス				ユーカンピア		珪藻優占種第1位	
	11月17日		前年同時期		11月17日	前年同時期		
	ワイレシー	全数	ワイレシー	全数				
引田	0	20	100	100	0	0	タラシオスリックス	2,000
東讃	10	30	575	650	0	0	プレウロシグマ	1,000
津田	0	10	125	125	0	0	プレウロシグマ	3,000
志度湾	0	0	1,025	1,100	0	1,025	キートセロス	12,000
庵治	0	10	1,250	1,300	0	0	タラシオスリックス	2,000
高松市瀬戸内	0	10	2,100	2,250	0	0	コシノディスカス	10
香西	0	0	3,125	3,250	0	0		0
下笠居	0	0	1,750	1,975	0	0		0
直島	0	0	1,500	1,525	0	0	スケレトネマ	7,000
土庄	0	0	975	975	0	0		0
四海	0	20	2,625	2,825	0	0	コシノディスカス	20
唐櫃	0	20	1,975	2,200	0	0	タラシオシラ	6,000
北浦	0	10	2,300	2,475	0	0	ギナルディア	6,000
大部	0	20	675	1,275	0	0	プレウロシグマ	2,000
内海	0	20	1,050	1,125	0	1,400	ベレロケア	26,000
与島	欠測	欠測	1,675	1,875	欠測	0	欠測	欠測
丸亀市	0	0	925	1,075	0	0	タラシオシラ	7,000
箱浦	0	0	200	250	0	0		0
宇多津	0	20	725	875	0	0	スケレトネマ	38,000

（調査結果）

ⅰ）コシノディスカス　ワイレシー

東讃の１０個/ℓ、１漁場でのみ検出されています。

ⅱ）ユーカンピア

全漁場で検出されていません。

ⅲ）珪藻優占種

タラシオスリックス、プレウロシグマ、スケレトネマ、タラシオシラ等が主に優占して出現しています。

※ 次回調査は、11月24日（火）に予定します。

ノリ養殖漁場栄養塩調査結果
第6回（令和8年11月17日）

