

令和8年度病虫害発生予報第4号の発表について

このことについて、次のとおり発表したの送付します。

《予報の概要》

作物名	病虫害名	予想発生量	作物名	病虫害名	予想発生量
水 稲	葉いもち (早・短期栽培)	並	露 地 キュウリ	べと病	並
	(普通期栽培)	並		炭疽病	並
	穂いもち (早・短期栽培)	やや少		褐斑病	やや少
	斑点米カメムシ類	やや多		うどんこ病	やや少
	ツマグロヨコバイ	やや少		斑点細菌病	並
	セジロウンカ	並		モザイク病	並
	ヒメトビウンカ	並		アブラムシ類	並
	縞葉枯病	やや少		ハダニ類	やや多
カンキツ	そうか病	やや少	青 ネ ギ	疫病	並
	黒点病	並		黒斑病	並
	ミカンハダニ	やや多		軟腐病	並
	ミカンサビダニ	やや多		ネギアザミウマ	やや多
	ゴマダラカミキリ	やや少		ネギハモグリバエ	並
	ミカンハモグリガ	並		ネギコガ	やや多
	アザミウマ類	並		アスパラ ガス	褐斑病
アブラムシ類	やや少	ネギアザミウマ	やや多		
モ モ	せん孔細菌病	やや多	ハダニ類		並
	褐さび病	やや少	アブラムシ類	やや多	
	ハダニ類	並	イ チ ゴ (育苗床)	炭疽病	並
	ナシヒメシンクイ	やや少		うどんこ病	並
モノゴマダラノメイガ	並	アブラムシ類	やや多		
カ キ	炭疽病	やや多	ハダニ類	並	
	落葉病	やや多	露地キク	白さび病	並
	うどんこ病	並		アブラムシ類	並
	カキノヘタムシガ	並	ハダニ類	並	
フジコナカイガラムシ	並	アザミウマ類	並		
ブ ド ウ	べと病	やや少	野菜、花 きの共通 害虫	シロイチモジヨトウ	多
果 樹 の 共通害虫	カメムシ類	やや多		タバコガ類 (タバコ ガ、オオタバコガ)	やや多
	吸蛾類 (アカエグリバ、ヒメエ グリバ)	やや多			

太文字の病虫害：向こう1か月の間、発生状況に特に注意を要する病虫害を示す。

* 予報根拠中の記号 (＋)：発生量を多くする要因 (－)：発生量を少なくする要因
(±)：発生量が平年並になる要因

令和8年度 病虫害発生予報 第4号（7月）

A. 水稻の病虫害

1. 葉いもち

予 想 発生地域： 県内全域
発生時期： 並
発生量： 早・短期栽培： 並
普通期栽培： 並

- 根 拠 (1) 6月中旬の早・短期栽培での発生は平年と同様に認められなかった。
(±)
(2) 6月中旬の普通期栽培の育苗箱での発生は平年と同様に認められなかった。
(±)
(3) B L A S T A M (いもち病発生予察システム) による6月の感染好適日の出現頻度は平年よりやや多かった。(+)
(4) 7月の気象は気温が高く(－)、降水量は平年並か少ない(－)の予報である。

- 対 策 (1) いもち病対象の育苗箱施薬または本田防除を行っていない圃場で、発生を認める場合は早急に薬剤防除を行う。
(2) 育苗箱施薬を行っている圃場においても、発生状況に注意し、上位葉への進展が認められる場合には、追加防除を行う。

2. 穂いもち (早・短期栽培)

予 想 発生地域： 県内全域
発生時期： 並
発生量： やや少

- 根 拠 (1) 出穂期に当たる7月の葉いもちの発生量は平年並の予想である。(±)
(2) 7月の気象は気温が高く(－)、降水量は平年並か少ない(－)の予報である。

- 対 策 今後の葉いもちの発生状況に注意して、止葉に病斑の進展が認められる場合には出穂期に必ず薬剤防除を行う。

3. 斑点米カメムシ類

予 想 発生地域： 県内全域
発生時期： やや早
発生量： **やや多**

- 根 拠 (1) 6月中旬の早・短期栽培水稻の畦畔雑草でのすくい取り調査では、大型のカメムシ5種(ホソハリ、クモヘリ、シラホシ、トゲシラホシ、ミナミアオ)の発生量は多く(+)、特にミナミアオカメムシの発生量は多かった(+)。カスミカメ類2種(アカスジ、アカヒゲホソミドリ)の発生量は少なかった(－)。
(2) 綾歌郡綾川町の高圧水銀灯での6月第1半旬から6月第6半旬のミナミアオカメムシの誘殺数は多く(+)、シラホシカメムシの誘殺数は平年並であった。(±)
(3) 7月の気象は気温が高く(+)、降水量は平年並か少ない(+)の予報である。

- 対 策 (1) 出穂の早い圃場には集中的に飛来するおそれがあるので注意する。
(2) 畦畔等圃場周辺の除草を行い、カメムシ類の発生源を少なくする。ただ

し、出穂直前に行うと、カメムシ類の圃場への移動を促すことになるので、雑草の刈り取りを行う場合は、出穂10日前までに行う。また、休耕地はミナミアオカメムシの繁殖場所になるので、耕起等によって雑草の少ない状態を保つ。

- (3) 薬剤防除の時期は、液剤や粉剤等の場合は出穂期頃とその10～15日後であり、粒剤の場合は7日程度早めて処理する。なお、穂揃期以降にミナミアオカメムシ及びイネカメムシが水稻で繁殖している場合は、粒剤よりも速効的で効果が高いとされる液剤や粉剤の使用が望ましい。
- (4) 防除効果を高めるために、地域一斉防除に努める。

4. ツマグロヨコバイ

予 想 発生地域： 県内全域
発生時期： 並
発生量： やや少

- 根 拠 (1) 6月中旬の早・短期栽培での発生量は少なかった。(－)
(2) 綾歌郡綾川町の高圧水銀灯での6月第1半旬から6月第6半旬の誘殺数は、平年並であった。(±)

対 策 出穂期以降の密度増加により、すす症状の現れる圃場もあるため、ツマグロヨコバイ対象の防除薬剤が入っていない圃場では、発生状況に注意しつつ本田での薬剤防除を実施する。

5. セジロウンカ

予 想 発生地域： 県内全域
発生時期： ー
発生量： 並

- 根 拠 (1) 6月中旬の早・短期栽培での発生は平年と同様に認められなかった。(±)
(2) 綾歌郡綾川町の高圧水銀灯での6月第1半旬から6月第6半旬の第1世代成虫の誘殺数は平年並であった。(±)

対 策 飛来成虫の産卵による葉鞘の変色に注意し、変色が目立つ圃場では、定期的に払い落とし調査を行い、幼虫が10株あたり300頭を超えた時点で薬剤防除する。

6. ヒメトビウンカと縞葉枯病

予 想 発生地域： 県内全域
発生時期： 並
発生量： ヒメトビウンカ： 並
縞葉枯病： やや少

- 根 拠 (1) 6月中旬の早・短期栽培でのヒメトビウンカの発生量は平年並であった。(±)
(2) 綾歌郡綾川町の高圧水銀灯での6月第1半旬から6月第6半旬の第1世代成虫の誘殺数は平年より少なかった。(－)
(3) 6月中旬の早・短期栽培での縞葉枯病の発生量はやや少なかった。(－)
(4) 今年度のヒメトビウンカの保毒虫率は低かった。(－)

対 策 (1) 縞葉枯病の発生の多い地域で、ウンカ、ヨコバイ類対象の育苗箱施薬を行っていない圃場では、本田初期にヒメトビウンカ対象に薬剤防除を行う。普通期栽培での防除適期は7月上中旬である。
(2) 本田初期の発病株は2次伝染を引き起こすため、抜き取って処分する。

B. 果樹の病害虫

－カンキツ－

1. そうか病

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： やや少
- 根 拠 (1) 県予察圃場での6月下旬の発生は平年と同様に認められなかった。(±)
(2) 一般圃場での6月中旬の発生は平年と同様に認められなかった。(±)
(3) 7月の気象は降水量が平年並か少ない予報である。(－)
- 対 策 (1) 発病した夏梢、葉、果実は早めに切除し、適正に処分する。
(2) 樹勢を健全に保ち、防風対策を行う。

2. 黒点病

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並
- 根 拠 (1) 県予察圃場での6月下旬の発生は平年と同様に認められなかった。(±)
(2) 一般圃場での6月中旬の発生は平年と同様に認められなかった。(±)
(3) 6月下旬の降水量が多く推移した。(＋)
(4) 7月の気象は降水量が平年並か少ない予報である。(－)
- 対 策 (1) 伝染源である枯枝は切除し、適正に処分する。
(2) 薬剤散布は、降水量が多い場合は固着性の高い展着剤を加用する。

3. ミカンハダニ

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： **やや多**
- 根 拠 (1) 県予察圃場での6月下旬の発生量は平年並であった。(±)
(2) 一般圃場の6月中旬の発生量はやや少なかった。(－)
(3) 7月の気象は気温が高く(＋)、降水量が平年並か少ない(＋)予報である。
- 対 策 (1) 100葉調査で、1葉当たりの寄生雌成虫数が0.5～1頭になれば防除する。
(2) 抵抗性の発達回避のため、同一系統薬剤の使用は年1回とする。

4. ミカンサビダニ

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： **やや多**
- 根 拠 (1) 一般圃場での前年11月下旬の発生量は多かった。(＋)
(2) 7月の気象は気温が高く(＋)、降水量が平年並か少ない(＋)予報である。
- 対 策 7月に入ると果実での増殖が盛んになるので、ミカンハダニとかねて7月中旬に防除する。

5. ゴマダラカミキリ

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： やや少
- 根 拠 一般圃場での6月中旬の発生は認められなかった。(－)
- 対 策 (1) 圃場内を見回り、成虫を捕殺する。
(2) ふ化した幼虫の食入期(7月中下旬)に、圃場内を見回り、木屑が出ている箇所にいる幼虫を刺殺する。
(3) 産卵防止およびふ化幼虫の食入防止のため、7月上旬～下旬に主幹から株

元に薬剤散布を実施する。

6. ミカンハモグリガ

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並
- 根 拠 (1) 県予察圃場での6月下旬の発生量はやや少なかった。(－)
(2) 一般圃場での6月中旬の発生量は平年並であった。(±)
- 対 策 夏芽の発生が多い圃場では、新梢伸長期に防除する。

7. アザミウマ類

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並
- 根 拠 (1) 一般圃場での6月中旬の発生は平年と同様に認められなかった。(±)
(2) 7月の気象は気温が高く(+)、降水量が平年並か少ない(+)予報である。
- 対 策 (1) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
(2) 光反射シートを地表面に設置する。
(3) 発生が認められる場合は早めに薬剤防除を実施する。
(4) 抵抗性の発達回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。

8. アブラムシ類

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： やや少
- 根 拠 (1) 県予察圃場での6月下旬の発生量はやや少なかった。(－)
(2) 一般圃場での6月中旬の発生は認められなかった。(－)
(3) 7月の気象は気温が高く(+)、降水量が平年並か少ない(+)の予報である。
- 対 策 (1) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
(2) 発生が認められる場合は早めに薬剤防除を実施する。
(3) 抵抗性の発達回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。

ーモ モー

1. せん孔細菌病

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： **やや多**
- 根 拠 (1) 県予察圃場での6月下旬の発生量は平年並であった。(±)
(2) 一般圃場での6月中旬の発生量は平年並であったが、一部地域でやや多かった。(＋)
(3) 6月下旬の降水量が多く推移した。(＋)
(4) 7月の気象は降水量が平年並か少ない予報である。(－)
- 対 策 (1) 発病枝は伝染源となるので、見つけしだい除去し処分する。
(2) 病原菌は葉や果実の気孔、水孔等や傷口から侵入するので、風当たりの強い圃場では防風ネット等の防風対策を施す。
(3) 発生の多い園地では、追加防除する。

2. 褐さび病

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： やや少
- 根 拠 (1) 県予察圃場での6月下旬の発生量は平年並であった。(±)

- (2) 一般圃場での6月中旬の発生は認められなかった。(－)
 - (3) 7月の気象は降水量が平年並か少ない予報である。(－)
- 対 策 枝の病斑が最大の伝染源であるので、見つけしだい発病葉とともに切り取り適正に処分する。

3. ハダニ類

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並

- 根 拠 (1) 県予察圃場での6月下旬の発生は認められなかった。(－)
(2) 一般圃場での6月中旬の発生量はやや少なかった。(－)
(3) 7月の気象は気温が高く(+)、降水量が平年並か少ない(+)の予報である。

- 対 策 (1) 発生の多い圃場では防除する。
(2) 抵抗性の発達回避のため、同一系統薬剤の使用は年1回とする。

4. ナシヒメシンクイ

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： やや少

- 根 拠 (1) 県予察圃場での6月下旬の芯折れ被害の発生量は少なかった。(－)
(2) 県予察圃場フェロモントラップでの6月の誘殺数はやや少なかった(－)。
(3) 一般圃場での6月中旬の芯折れ被害の発生量はやや少なかった。(－)

- 対 策 (1) 定期的な薬剤防除を実施する。
(2) 発生が多い場合は、2、3日おきに園内を見回り、萎凋初期の被害新梢を切除する。
(3) 樹上及び地面に落果した被害果は適正に処分する。

5. モモノゴマダラノメイガ

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並

- 根 拠 (1) 県予察圃場予察灯での6月の誘殺数は平年並であった。(±)
(2) 一般圃場での6月中旬の発生は平年と同様に認められなかった。(±)

- 対 策 (1) 定期的な薬剤防除を実施する。
(2) 発生が多い場合は、2、3日おきに園内を見回り、萎凋初期の被害新梢を切除する。
(3) 樹上及び地面に落果した被害果は適正に処分する。

－カ キー

1. 炭疽病

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： **やや多**

- 根 拠 (1) 一般圃場での6月中旬の発生は平年と同様に認められなかった。(±)
(2) 6月下旬の降水量が多く推移した。(＋)
(3) 7月の気象は降水量が平年並か少ない予報である。(－)

- 対 策 (1) 圃場内をよく観察して、発病枝は見つけしだい除去し、圃場外に持ち出し適正に処分する。特に前年多発生した圃場では、発病枝の発生に注意する。
(2) 授粉樹など、樹高が高く、剪定や粗皮削り等の管理作業を実施していない樹の周辺、採光や通風の悪い場所、降雨が多い場合では、発生が増加することがあるので注意する。

- (3) 薬剤はかけむらのないよう丁寧に散布する。降雨が続く場合は、降雨の合間に散布する。
- (4) 耐性菌の発生回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。

2. 落葉病(角斑落葉病、円星落葉病)

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： **やや多**

- 根 拠 (1) 一般圃場での前年11月下旬の発生量は多かった。(+)
(2) 6月下旬の降水量が多く推移した。(+)
(3) 7月の気象は気温が高く(+)、降水量が平年並か少ない(-) 予報である。

対 策 昨年発生が多かった圃場では、7月上～中旬に葉裏に薬剤が十分付着するように散布する。

3. うどんこ病

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並

- 根 拠 (1) 県予察圃場での6月の発生量はやや多かった。(+)
(2) 一般圃場での6月中旬の発生は認められなかった。(-)
(3) 7月の気象は気温が高い予報である。(-)

対 策 (1) 発病が進むと防除効果が劣るので早めに薬剤防除を実施する。
(2) 落葉した葉はできるだけ早く処分する。

4. カキノヘタムシガ

予 想 発生地域： 県内全域
発生時期： -
発生量： 並

- 根 拠 (1) 県予察圃場での越冬世代成虫の発生量はやや少なかった。(-)
(2) 県予察圃場での6月下旬の発生量は平年並であった。(±)
(3) 一般圃場での6月中旬の発生量は平年並であった。(±)

対 策 (1) 第1世代成虫最盛期の7～10日後(7月下旬～8月上旬頃)に防除する。
(2) 防除を実施したにも関わらず、被害が続く場合には追加防除を行う。

5. フジコナカイガラムシ

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並

- 根 拠 (1) 一般圃場での6月中旬の発生は認められなかった。(-)
(2) 7月の気象は気温が高く(+)、降水量が平年並か少ない(+)の予報である。

対 策 (1) 6月に本虫を対象に防除を行っていない圃場では、早急に防除する。
(2) 薬剤が幼果のがく部に充分付着するように散布する。

ーブドゥー

1. ベと病

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： やや少

- 根 拠 (1) 一般圃場での6月中旬の発生量はやや少なかった。(-)
(2) 7月の気象は降水量が平年並か少ない予報である。(-)

対 策 (1) 圃場の排水に努める。

- (2) 被害葉は見つけしだい除去し処分する。
- (3) 降雨により増えやすいので、薬剤防除は降雨の前後に行う。

－果樹の共通害虫－

1. カメムシ類

- 予 想 発生地域： 県内全域、特に山林隣接園
発生量： **やや多**
(令和8年5月18日付け注意報第2号発表)
- 根 拠 (1) 6月の県予察圃場予察灯の誘殺数は平年並であった。(±)
(2) 6月の綾歌郡綾川町の予察灯の誘殺数は平年並であった。(±)
(3) 防除員報告では発生量が多い地域があった。(＋)
- 対 策 (1) 有袋栽培では、できるだけ早く袋かけを行う。
(2) 施設栽培の場合は、開放口をネット（4mm目合い）で覆うとカメムシ類の侵入防止対策となる。
(3) 圃場内をよく観察し、被害果実やカメムシ類の発生が見られる場合は、早急に防除を実施する。特にスギ、ヒノキ等が周辺に多い圃場や、過去に被害が認められた圃場では注意する。
(4) 多発してからの防除は効果が劣る場合があるので、発生初期の防除を徹底する。
(5) 成虫は夕方に飛来し夜間加害するので、薬剤散布は夕方に広域かつ一斉に行うと効果的である。
(6) 黄色蛍光灯は、チャバネアオカメムシには忌避効果があるが、ほかのカメムシ類には効果がないので注意する。
(7) 防除薬剤は、主要農作物病虫害雑草防除指針、香川県監修の果樹病虫害防除暦を参考にする。

2. 吸蛾類（アカエグリバ、ヒメエグリバ）

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： **やや多**
- 根 拠 県予察圃場予察灯における6月の誘殺数はやや多かった。(＋)
- 対 策 (1) 熟果及び裂果などを早めに取り除き、適正に処分する。
(2) 被害の多い場合は、夜間の捕殺、網掛け、黄色蛍光灯などで対応する。

C. 野菜、花きの病虫害

－露地キュウリー

1. ベと病

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並
- 根 拠 (1) 6月下旬の発生量は平年並であった。(±)
(2) 7月の気象は降水量が平年並か少ない予報である。(－)
- 対 策 (1) 圃場の排水を良くするとともに、肥料切れに注意し、樹勢が衰えないように栽培管理する。
(2) 耐病性品種を用いる。
(3) 整枝、誘引等を適切に行うとともに、初発時期の葉を除去し、通風を図る。除去した葉は圃場外に持ち出すなど適正に処分する。
(4) 薬剤防除は予防的に実施し、初期感染を防ぐ。
(5) 耐性菌の発生回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。

2. 炭疽病

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並
- 根 拠 (1) 6月下旬の発生量は平年並であった。(±)
(2) 7月の気象は降水量が平年並か少ない予報である。(－)
- 対 策 (1) 圃場の排水を良くするとともに、窒素過多にならないよう肥培管理する。
(2) 整枝、誘引等を適切に行うとともに、初発時期の葉を除去し、通風を図る。除去した葉は圃場外に持ち出すなど適正に処分する。
(3) 薬剤防除は予防的に実施し、初期感染を防ぐ。
(4) 耐性菌の発生回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。

3. 褐斑病

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： やや少
- 根 拠 (1) 6月下旬の発生は認められなかった。(－)
(2) 7月の気象は降水量が平年並か少ない予報である。(－)
(3) 近年、耐病性品種を用いる地域が増加していることから、発生が少ない。(－)
- 対 策 (1) 圃場の排水を良くするとともに、窒素過多にならないよう肥培管理する。
(2) 耐病性品種を用いる。
(3) 整枝、誘引等を適切に行うとともに、初発時期の葉を除去し、通風を図る。除去した葉は圃場外に持ち出すなど適正に処分する。
(4) 薬剤散布は予防的に行い、初期感染を防ぐ。
(5) 耐性菌の発生回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。

4. うどんこ病

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： やや少
- 根 拠 (1) 6月下旬の発生量はやや少なかった。(－)
(2) 近年、耐病性品種を用いる地域が増加していることから、発生が少ない。(－)
- 対 策 (1) 窒素過多にならないよう肥培管理する。
(2) 耐病性品種を用いる。
(3) 整枝、誘引等を適切に行うとともに、初発時期の葉を除去し、通風を図る。除去した葉は圃場外に持ち出すなど適正に処分する。
(4) 薬剤防除は予防的に行い、初期感染を防ぐ。
(5) 耐性菌の発生回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。

5. 斑点細菌病

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並
- 根 拠 (1) 6月下旬の発生は平年と同様に認められなかった。(±)
(2) 7月の気象は降水量が平年並か少ない予報である。(－)
- 対 策 (1) 圃場の排水を良くするとともに過繁茂にならないよう栽培管理する。
(2) 整枝、誘引等を適切に行うとともに、初発時期の葉を除去し、通風を図る。除去した葉は圃場外に持ち出すなど適正に処分する。
(3) 薬剤防除は予防的に行う。特に曇雨天が続くような場合は注意する。

6. モザイク病

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並

- 根 拠 (1) 6月下旬の発生は認められなかった。(－)
(2) 6月下旬のアブラムシ類の発生量は平年並であった。(±)
(3) 黄色水盤での6月のアブラムシ類の誘殺数は平年並であった。(±)

- 対 策 (1) アブラムシ類の防除を行う。
(2) 発病株は、早期に抜き取り圃場外に持ち出すなど適正に処分する。
(3) 収穫用具の消毒をする。

7. アブラムシ類

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並

- 根 拠 (1) 6月下旬の発生量は平年並であった。(±)
(2) 黄色水盤での6月のアブラムシ類の誘殺数は平年並であった。(±)
(3) 7月の気象は降水量が平年並か少ない予報である。(＋)

- 対 策 (1) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
(2) 抵抗性の発達回避のため、同一系統薬剤を連用しない。
(3) 今後も有翅虫の飛来が続く場合もあるので、病害虫防除所ホームページに掲載している黄色水盤トラップによる誘殺数を参考にして適期防除に努める。

8. ハダニ類

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： **やや多**

- 根 拠 (1) 6月下旬の発生量は平年並であった。(±)
(2) 7月の気象は気温が高く(＋)、降水量が平年並か少ない(＋)予報である。

- 対 策 (1) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
(2) 刈り取った茎葉は圃場から持ち出し、処分する。
(3) 抵抗性の発達回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。

9. ミナミキイロアザミウマ

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： **やや多**

- 根 拠 (1) 6月下旬の発生量は多かった。(＋)
(2) 7月の気象は気温が高く(＋)、降水量が平年並か少ない(＋)予報である。

- 対 策 (1) 青色粘着トラップ等を利用して発生状況を確認し、発生が多い圃場では防除を行う。
(2) シルバーマルチを敷設する。
(3) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
(4) 本虫が媒介する黄化えそ病の発生地域では、本虫を対象に定植時に必ず粒剤または灌注処理し、定期的に薬剤防除を実施する。発病株を認めたら早急に地上部を除去し、圃場外に持ち出すなど適正に処分する。
(5) 施設栽培からの飛び出しを防ぐため、発生を確認した施設では、栽培終了後、施設を密閉して死滅させる。
(6) 防除後も表土中の蛹や葉肉内の卵が新たに羽化、孵化する場合もあるので、多発圃場では7～10日間隔で防除を行う。

(7) 抵抗性の発達回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。

10. アザミウマ類（ネギアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ）

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並

根 拠 (1) 6月下旬の発生量はやや少なかった。(－)
(2) 7月の気象は気温が高く(+)、降水量が平年並か少ない(+) 予報である。

対 策 (1) 青色粘着トラップ等を利用して発生状況を確認し、発生が多い圃場では防除を行う。
(2) シルバーマルチを敷設する。
(3) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
(4) 防除後も表土中の蛹や葉肉内の卵が新たに羽化、孵化する場合もあるので、多発圃場では7～10日間隔で防除を行う。
(5) 抵抗性の発達回避のため、同一系統薬剤を連用しない。

－青ネギー

1. 疫病

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並

根 拠 (1) 6月下旬の発生量はやや少なかった。(－)
(2) 6月第4, 5半旬の降水量が多かった。(＋)
(2) 7月の気象は降水量が平年並か少ない(－) 予報である。

対 策 (1) 圃場の排水を良くし、水を長期間停滞させないようにする。
(2) 発生の多い圃場では、菌密度が高くなっているので、圃場をかえるか土壤消毒を実施する。
(3) 薬剤防除は予防的に7～10日間隔で行う。

2. 黒斑病

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並

根 拠 (1) 6月下旬の発生量は多かった。(＋)
(2) 7月の気象は降水量が平年並か少ない予報である。(－)

対 策 (1) 肥料不足になると発病しやすいので、適正施肥を行う。
(2) 排水不良になると発病を助長するので、圃場の排水をよくする。
(3) 発生を確認した場合は直ちに薬剤防除を行う。
(4) 耐性菌の発生回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。

3. 軟腐病

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並

根 拠 (1) 6月下旬の発生は認められなかった。(－)
(2) 7月の気象は気温が高く(+)、降水量が平年並か少ない(－) 予報である。

対 策 (1) 肥料は適切に施用し、窒素過多にならないように注意する。
(2) 圃場の排水を良くし、水を長期間停滞させないようにする。
(3) 発生の多い圃場では、菌密度が高くなっているので、圃場をかえるか土壤消毒を実施する。
(4) 薬剤防除は予防的に7～10日間隔で行う。

4. ネギアザミウマ

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： **やや多**

根 拠 (1) 6月下旬の発生量は平年並であった。(±)
(2) 防除員報告では、発生量のやや多い地区があった。(＋)
(3) 7月の気象は気温が高く(＋)、降水量が平年並か少ない(＋) 予報である。

対 策 (1) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
(2) ネギアザミウマの食害痕から病原菌が侵入する場合がありますので、葉に食害が認められる場合は早期に防除を行う。
(3) 令和3年度に実施した薬剤感受性検定では、シペルメトリン乳剤(IRACコード：3A)、スピノサド水和剤(IRACコード：5)および一部のネオニコチノイド系薬剤(IRACコード：4A)等で感受性が低い個体群が存在したことから、防除で効果が見られない場合は同系統薬剤の使用を控える。
(4) 抵抗性の発達回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。

5. ネギハモグリバエ

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並

根 拠 (1) 6月下旬の発生量は平年並であった。(±)
(2) 7月の気象は気温が高く(＋)、降水量が平年並か少ない(＋) 予報である。

対 策 (1) 摘葉した残さや、収穫終了後の茎葉は次作の発生源になるので、土中に埋めるか、古ビニール等で被覆するなど、適切に処分する。
(2) 多発してからの防除は困難であるので、産卵痕や食害痕が見え始めたら早めに防除する。
(3) 定植時には育苗トレイ灌注または粒剤施用をする。

6. ネギコガ

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： **やや多**

根 拠 (1) 6月下旬の発生量は多かった。(＋)
(2) 7月の気象は気温が高く(＋)、降水量が平年並か少ない(＋) 予報である。

対 策 (1) 摘葉した残さや、収穫終了後の茎葉は次作の発生源になるので、土中に埋めるか、古ビニール等で被覆するなど、適切に処分する。
(2) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
(3) 抵抗性の発達回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。

ーアスパラガスー

1. 褐斑病

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： やや少

根 拠 (1) 6月下旬の発生量はやや少なかった。(－)
(2) 7月の気象は降水量が平年並か少ない予報である。(－)

対 策 (1) 過繁茂にならないよう、茎葉の刈込みや適切な肥培管理を行う。
(2) 刈り取った被害茎葉は圃場外に持ち出すなど適正に処分する。

- (3) 令和7年度に実施した薬剤感受性検定では、アゾキストロピン水和剤（FRACコード：11）に対して感受性が低い菌株が確認されているので注意する。耐性菌の発生が確認された圃場においては、同系統薬剤の使用を控える。
- (4) 耐性菌の発生を回避するため、同一系統の薬剤を連用しない。
- (5) 発生前から予防的に薬剤散布を行う。

2. ネギアザミウマ

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： **やや多**
- 根 拠 (1) 6月下旬の発生量はやや少なかった（－）が、一部地域ではやや多かった（＋）。
- (2) 防除員報告では、やや多かった。（＋）
- (3) 7月の気象は気温が高い予報である。（＋）
- 対 策 (1) 施設の開口部を防虫ネットで被覆したり、光反射資材を施設周縁部に敷設したりするなどして、侵入防止対策を講じる。
- (2) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
- (3) 圃場内の数か所で成茎の擬葉が繁茂しているところを手で払って、10×20cm程の板上に1か所当たり1～5頭の成虫を認めたら防除する。
- (4) 令和3年度に実施した薬剤感受性検定では、シペルメトリン乳剤（IRACコード：3A）、スピノサド水和剤（IRACコード：5）および一部のネオニコチノイド系薬剤（IRACコード：4A）等で感受性が低い個体群が存在したことから、防除で効果が見られない場合は同系統薬剤の使用を控える。
- (5) 抵抗性の発達回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。

3. ハダニ類

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並
- 根 拠 (1) 6月下旬の発生量はやや少なかった（－）が、一部地域でやや多かった（＋）。
- (2) 7月の気象は気温が高い予報である。（＋）
- 対 策 (1) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
- (2) 刈り取った茎葉は圃場から持ち出し、処分する。
- (3) 抵抗性の発達回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。

4. アブラムシ類

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： **やや多**
- 根 拠 (1) 6月下旬の発生量はやや少なかった（－）が、一部地域でやや多かった（＋）。
- (2) 綾歌郡綾川町の黄色水盤での6月のアブラムシ類の誘殺数は、平年並であった。（±）
- (3) 7月の気象は気温が高い予報である。（＋）
- 対 策 (1) 施設の開口部を防虫ネットで被覆したり、光反射資材を施設周縁部に敷設したりするなどして、侵入防止対策を講じる。
- (2) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
- (3) 抵抗性の発達回避のため、同一系統薬剤を連用しない。

－イチゴ（育苗床）－

1. 炭疽病

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並
- 根 拠 (1) 6月下旬の育苗床での発生は認められなかった。(±)
(2) 7月の気象は気温が高い予報である。(＋)
- 対 策 (1) 発病葉やランナーは可能な限り除去するとともに除去した発病葉、ランナーは伝染源となるので適正に処分する。
(2) 水滴の飛散等で伝染するので、発病が見られる圃場では、灌水の跳ね返りがないように注意する。
(3) ランナーの切り離し前までの防除を徹底し、育苗中に伝染環を断つ。
(4) 薬剤防除は予防的に行い、初期感染を防ぐ。
(5) MBC殺菌剤（FRACコード：1）、N-フェニルカーバメート類（FRACコード：10）、QoI殺菌剤（FRACコード：11）、PP殺菌剤（FRACコード：12）に対して感受性の低い菌株が確認されているので注意する。

2. うどんこ病

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並
- 根 拠 6月下旬の育苗床での発生量は平年並であった。(±)
- 対 策 (1) ランナーの切り離し前までの防除を徹底し、育苗床で発病を減らすよう努める。
(2) 発生圃場では、7日より短い間隔で薬剤防除を行う。
(3) 収穫を終了した圃場（本圃）の株は直ちに処分するとともに、子苗（ランナー）を切り離した後、親株は早期に除去し処分する。
(4) 窒素肥料の過多や葉が混み合ったりすると多発しやすくなるので、適切な栽培管理を行う。
(5) 耐性菌の発生を回避するため、同一系統の薬剤を連用しない。散布回数が多くなることから、各薬剤の使用回数及び収穫前日数を遵守する。

3. アブラムシ類

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： **やや多**
- 根 拠 (1) 6月下旬の育苗床での発生量は平年並だった。(±)
(2) 防除員報告では、発生量のやや多い地区があった。(＋)
(3) 綾歌郡綾川町の黄色水盤での6月のアブラムシ類の誘殺数は、平年並であった。(±)
(4) 7月の気象は気温が高い予報である。(＋)
- 対 策 (1) 育苗床は防虫ネットで被覆し、アブラムシ類の飛び込みを防止する。
(2) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
(3) 抵抗性の発達回避のため、同一系統薬剤を連用しない。

4. ハダニ類

- 予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並
- 根 拠 (1) 6月下旬の育苗床での発生量はやや少なかった。(－)
(2) 7月の気象は気温が高い予報である。(＋)
- 対 策 (1) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。

- (2) 親株床での防除を徹底し、育苗床での防除回数を減らすよう努める。
- (3) 育苗床（苗の親株からの切除後）では発生をこまめに観察し、早めに防除を実施する。散布にあたっては、使用回数に留意する。

－露地キク－

1. 白さび病

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並

根 拠 (1) 6月下旬の発生は、小ギクでは平年並（±）、輪ギクでは認められなかった（－）。

(2) 7月の気象は降水量が平年並か少ない予報である。（－）

- 対 策 (1) 薬剤散布は発生初期から5～7日間隔で行う。
(2) 耐性菌の発生回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。
(3) 採穂前の防除を徹底し、本圃に病気を持ち込まないようにする。
(4) 肥料は適切に施用し、窒素過多にならないように注意する。

2. アブラムシ類

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並

根 拠 (1) 6月下旬の発生は、小ギク、輪ギクともに認められなかった。（－）

(2) 綾歌郡綾川町の黄色水盤での6月のアブラムシ類の誘殺数は平年並であった。（±）

(3) 7月の気象は気温が高く（＋）、降水量が平年並か少ない（＋）予報である。

- 対 策 (1) 今後作付けを行う場合は、光反射資材や防虫ネットを張るなどして、侵入防止対策を講じる。
(2) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
(3) 育苗期から生育初期に粒剤等を施用する。
(4) 抵抗性の発達回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。
(5) 今後も有翅虫の飛来が続く場合もあるので、病害虫防除所ホームページに掲載している黄色水盤トラップによる誘殺数を参考にして適期防除に努める。

3. ハダニ類

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並

根 拠 (1) 6月下旬の発生は、小ギク、輪ギクともに認められなかった。（－）

(2) 7月の気象は気温が高く（＋）、降水量が平年並か少ない（＋）予報である。

- 対 策 (1) 人による持ち込みを回避するため、発生圃場に入った着衣のまま未発生圃場に立ち入らない。
(2) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
(3) 発生が局所的な場合には、スポット散布を行う。
(4) 抵抗性の発達回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。

4. アザミウマ類

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： 並

根 拠 (1) 6月下旬の発生量は、小ギク、輪ギクともにやや少なかった。（－）

- (2) 7月の気象は気温が高く(+)、降水量が平年並か少ない(+)予報である。
- 対 策 (1) アザミウマの吸汁により、ウイルス病が媒介される場合や食害痕から病原菌が侵入する場合がありますので、食害が認められる場合は早期に防除を行う。
- (2) 防除後も表土中の蛹や葉肉内の卵が新たに羽化、孵化する場合がありますので、多発圃場では7～10日間隔で防除を行う。
- (3) シルバーマルチ等を被覆することで飛び込み量を減らすことができる。
- (4) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
- (5) 抵抗性発達回避のため、同一系統薬剤を連用しない。

－野菜、花きの共通害虫－

1. シロイチモジヨトウ

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： **多**

- 根 拠 (1) 6月下旬の青ネギでの発生量は多かった。(+)
(2) 綾歌郡綾川町のフェロモントラップでの誘殺数は、多かった。(+)
(3) 7月の気象は気温が高く(+)、降水量が平年並か少ない(+)予報である。

- 対 策 (1) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
(2) 中老齢幼虫には薬剤の効果が劣るので、初期の食害発生に注意し、体長1cm以下の若齢幼虫期に薬剤防除を行う。
(3) 令和6年度に実施した薬剤感受性検定では、ジアミド系薬剤(IRACコード：28)に対する感受性が低くなった個体群が存在したことから、防除で効果が見られない場合は同系統薬剤の使用を控える。
(4) 抵抗性の発達回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。


2. タバコガ類(タバコガ、オオタバコガ)

予 想 発生地域： 県内全域
発生量： **やや多**

(令和8年6月5日付け病害虫発生予察注意報第3号発表)

- 根 拠 (1) 6月下旬の発生量はキュウリの新芽ではやや少なく(-)、小ギク、輪ギクともに認められなかった(-)。
(2) 綾歌郡綾川町のフェロモントラップでの誘殺数は、タバコガ、オオタバコガともに多かった。(+)
(3) 防除員報告では、オオタバコガのフェロモントラップでの誘殺数は多かった。(+)
(4) 7月の気象は気温が高く(+)、降水量が平年並か少ない(+)予報である。

- 対 策 (1) 施設の出入口やサイド換気口等の開口部に防虫ネットを張り、侵入を防止する。
(2) 圃場内及び圃場周辺の除草に努める。
(3) 花蕾や生長点を食害するので、被害が見られたら直ちに薬剤防除を行う。
(4) 老齢幼虫に対しては薬剤の効果が低いので、早期発見に努め、防除効果の高い若齢幼虫期に薬剤散布を行う。
(5) 抵抗性の発達回避のため、同一系統の薬剤を連用しない。



6月～8月は、農薬危害防止運動月間です。
農薬の使用が増える時期ですので、今一度、農薬を
適正に使用できているか、チェックしましょう。

農薬はラベルをよく読んで使用しましょう

病虫害防除所 インターネットホームページ

URL: <https://www.pref.kagawa.lg.jp/byogaichuboj/index.html>

