

# 麦類赤かび病に関する情報(第4報)

令和8年4月10日

香川県農業試験場病害虫防除所

麦類赤かび病は、その病原菌が毒素を生成することから、麦類の重要病害虫に位置付けられています。麦の開花期～乳熟期が赤かび病菌に感染しやすくなる時期で、これからの時期の天候が発生の多少に大きく影響します。すなわち、開花期頃の気温が高く、高湿度の日が連続すると多発生しやすくなります。

最も重要な防除時期は開花始めの頃とその7～10日後です。4月9日現在、本年の麦類の生育は、はだか麦、小麦ともに平年より早くなっていますので、開花状況を見て適期に防除しましょう。なお、本情報の開花期予想は綾川町（本県内陸部）における予測であり、平野部～海岸部ではこれより早くなるので注意してください。

## 1. 麦類の生育状況

農業試験場におけるはだか麦‘イチバンボン’の12月上旬播種の開花期は4月9日で、平年より2日程度早くなりました。また、小麦‘さぬきの夢2009’の11月中旬播種の予想開花期は4月14日で、平年より1日程度早くなると予想されます（表1：農業試験場作物・特作研究課調べ）。

表1 麦類の出穂及び開花の状況（農業試験場作況試験圃場：綾川町）

（4月9日時点）

麦種	品種	播種期	出穂期		開花期 <sup>注1)</sup>	
			平年値 <sup>注2)</sup>	本年 <sup>注3)</sup>	平年値 <sup>注2)</sup>	本年 <sup>注3)</sup>
はだか麦	イチバンボン	11月上旬	3月23日	3月20日	3月31日	3月28日
		11月中旬	3月28日	3月26日	4月4日	4月2日
		12月上旬	4月4日	4月5日	4月11日	4月9日
小麦	さぬきの夢2009	11月上旬	3月27日	3月24日	4月10日	4月5日
		11月中旬	4月3日	4月2日	4月15日	4月14日(予)
		12月上旬	4月12日	4月9日	4月22日	4月18日(予)

注1) 開花期は40～50%の穂が開花する時期を示す。

注2) 平年値は平成27年播き～令和6年播きの10か年の平均値である。

注3) (予)を付して赤字で示した日付は、綾川町における予想値である。

## 2. 気象経過と赤かび病発生条件の出現状況（別表参照）

- 4月9日現在、高松市アメダスのデータをもとにすると、子のう胞子の飛散好適日が、3月30日、3月31日、4月2日、4月4日、4月5日に出ています。
- 高松地方气象台4月9日発表の四国地方の向こう1か月の天候によると、気温は高く、降水量は平年並みか多い見込みであり、また週間天気予報によると、小麦‘さぬきの夢2009’の11月中旬播種の予想開花期ごろに一時雨となっています。平均気温18℃以上、湿度80%以上の日が続くと、赤かび病の発生に好適な条件となるので、注意が必要です。

## 3. 防除情報

- 現在、赤かび病に適用のある薬剤は、発病前に散布しないと防除効果がないため、開花始期には必ず防除を実施しましょう。
- 気象経過に注意しつつ、追加防除の時期を決めましょう。

表2 赤かび病の防除時期、防除薬剤等

	防除時期	防除薬剤	希釈倍数	使用時期／回数
1回目	開花始め頃	トップジンM水和剤	1,000～1,500 倍	小麦：収穫 14 日前まで／ 出穂期以降は2回以内 はだか麦：収穫 30 日前まで／ 出穂期以降は1回
2回目	1回目の7～10日後	ワークアップフロアブル	2,000～3,000 倍	小麦：収穫 7 日前まで／ 3回以内 はだか麦：収穫 7 日前まで／ 3回以内

(資料：小麦、はだか麦の栽培しおり)