

令和 7 年度

業 務 年 報

(農作物有害動植物発生予察事業年報)

2025

香川県農業試験場病虫害防除所

目 次

I	業務推進体制	
1	職員の配置	1
2	活動体制	
3	業務分担	
II	【発生予察関係】	
1	病虫害発生予察事業	4
1)	対象農作物及び有害動植物	
2)	普通作物病虫害発生予察	
3)	果樹病虫害発生予察	
4)	野菜病虫害発生予察	
5)	花き病虫害発生予察	
6)	ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウのフェロモントラップ調査	
7)	主要害虫半旬別誘殺数	
2	病虫害の診断及び生態調査	8 7
1)	耐性菌等調査事業	
2)	抵抗性害虫等調査事業	
3)	保害虫検定事業	
3	病虫害発生予察情報	8 7
1)	病虫害発生の現況報告	
2)	病虫害発生予察情報の提供	
3)	予察灯の調査及びウンカ類飛来状況報告	
4)	ホームページサービス	
4	病虫害防除員の設置・活動	1 1 0
1)	病虫害防除員の設置	
2)	病虫害防除員の研修と防除指導	
III	【防除指導関係】	
1	病虫害防除方針策定	1 1 3
1)	病虫害・雑草防除指針に関すること	
2)	主要農作物防除体系策定（防除暦等）	
3)	新農薬効果確認実証試験	
4)	環境に配慮した農業	
2	殺虫・殺菌剤受託試験	
3	特殊病虫害侵入防止対策	
1)	重要病虫害等の侵入調査	
2)	キウイフルーツ苗木等調査	
4	特殊病虫害緊急防除対策事業	
1)	カンキツにおけるアザミウマ対策の検討	

- 2) キウイフルーツのカイガラムシ類防除対策の検討
- 5 輸出用マツ盆栽の病害虫対策
- 6 農薬適正使用総合啓発
- 7 マイナー作物農薬登録促進
- 8 鳥獣害防止対策事業
- 9 その他防除指導に関する課題

IV 【農薬指導取締】

- | | | |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 農薬指導取締に関する事 | 1 1 6 |
| 1) | 農薬販売届の受理 | |
| 2) | 農薬販売者の立入検査 | |
| 2 | 農薬の安全使用に関する事 | 1 1 7 |
| 1) | 農薬の安全使用及び危害防止指導 | |

V 气象概况	1 1 8
--------------	-------

VI 参考資料（試験成績の概要）	126
------------------	-----

I 業務推進体制

1 職員の配置

所 長 森 充隆

【所の総括】

【発生予察担当】

主任研究員 井之川 育篤

【普通作物発生予察】

主席研究員 三浦 靖

【担当の総括、園芸作物発生予察】

主任技師 長尾 洋輝

【園芸作物発生予察】

(会計年度任用職員) 井上 和代

【病虫害防除】

(会計年度任用職員) 河崎 亜希代

【病虫害防除】

【防除指導担当】

主席研究員 鐘江 保忠

【担当の総括、普通作物防除指導】

主任研究員 小野 壮一朗

【園芸作物防除指導】

技 師 北尾 美咲

【園芸作物防除指導】

技 師 西川 辰洋

【園芸作物防除指導】

(会計年度任用職員) 前田 京子

【病虫害防除】

(兼) 東讃農業改良普及センター 主 任 山下 陽子

(兼) 東讃農業改良普及センター 主 任 佐野 有季子

(兼) 小豆総合事務所 副 主 幹 瀬尾 龍右

(兼) 中讃農業改良普及センター 主 任 香西 俊哉

(兼) 中讃農業改良普及センター 主 任 藤澤 遥

(兼) 西讃農業改良普及センター 副 主 幹 藤村 俊夫

【農薬指導取締担当】

(兼) 主席研究員 三浦 靖

【担当総括、小豆・中讃地区担当】

(兼) 主席研究員 鐘江 保忠

【中讃・西讃地区担当】

(兼) 主任研究員 小野 壮一朗

【東讃地区担当】

(兼) 主任研究員 井之川 育篤

【西讃地区担当】

(兼) 主任技師 長尾 洋輝


【東讃地区担当】

(兼) 技 師 北尾 美咲

【中讃地区担当】

2 職員の配置

(令和7年6月2日)



3. 業務分担

令和7年度 業務一覧

区分	所掌業務	予算 費目	総括 担当者	担当者	
				正	副
業務全般	所の統轄		所長		
庶務関係	1. 庶務全般		三浦	三浦	西川、河崎
発生予察関係	1. 病害虫発生予察事業に関すること 1) 対象農作物及び有害動植物 2) 普通作物の発生予察 3) 園芸作物の発生予察(果樹) 4) " (野菜・花き) 5) ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウのフェロモントラップ調査	防除所 防除所 防除所 防除所 防除所	三浦	三浦 井之川 長尾 三浦 西川	鐘江、(西川)、河崎 小野、西川、前田 北尾、(西川)、井上 三浦、北尾、井上
	2. 病害虫の診断及び生態調査 1) 耐性菌等調査事業(キク白さび病) 2) 抵抗性害虫等調査事業(カンキツミカンハダニ) 3) 保毒虫検定事業	防除所 防除所 防除所		北尾 長尾 井之川	長尾、前田、井上 北尾、西川、河崎、井上 鐘江、河崎、前田
	3. 病害虫発生予察情報に関すること 1) 病害虫発生の実況報告 2) 発生予察情報の提供 3) 予察灯の調査及びウンカ類飛来状況報告 4) HPサービス	防除所 防除所 防除所 防除所		井之川 井之川 井之川 西川	各作物分担 各作物分担 鐘江、井上、河崎 長尾、河崎
	4. 病害虫防除員等の設置・活動に関すること 1) 設置、調査報告、活動(研修会)、防除指導	防除所		西川	北尾、小野、各地区担当 河崎、前田、井上
防除指導関係	1. 病害虫防除方針策定に関すること 1) 病害虫・雑草防除方針に関すること 2) 主要農作物防除体系策定(防除暦等) 3) 新農薬効果確認実証試験に関すること 4) 環境に配慮した農業に関すること	植物防疫 植物防疫 植物防疫 植物防疫	鐘江	鐘江 鐘江 鐘江 鐘江	各作物分担、河崎 各作物分担 各作物分担 各作物分担
	2. 殺虫・殺菌剤受託試験に関すること 1) 殺虫剤 2) 殺菌剤	試験場 試験場		北尾 長尾	鐘江、西川、井上、河崎 三浦、西川、前田
	3. 特殊病害虫侵入防止対策 1) 重要病害虫等の侵入調査 2) キウイフルーツ苗木等検査	植物防疫 植物防疫		長尾 長尾	西川、北尾、河崎、井上 小野、西川、前田
	4. 特殊病害虫緊急防除対策事業 1) カンキツにおけるアザミウマ対策の検討 2) キウイフルーツのカイガラムシ類防除対策の検討	植物防疫 植物防疫		小野 長尾	鐘江、長尾、河崎、井上 小野、河崎、井上
	5. 輸出用マツ盆栽の病害虫対策に関すること	園芸振興		三浦	鐘江、前田、井上、河崎
	6. 農薬適正使用総合啓発 1) ロメインレタス	園芸振興		北尾	三浦
	7. マイナ作物農薬登録促進 1) パセリ、ラナンキュラス等農薬登録促進 2) ビワのドローン防除技術の確立	園芸振興 園芸振興		三浦 鐘江	井之川、長尾、北尾、井上 長尾、小野
	8. 鳥獣害防止対策事業	植物防疫		長尾	北尾
	9. その他防除指導に関する課題(トライアングル等) 1) イチゴ炭疽病の防除対策 2) イネカメムシの防除対策の検討 3) マーガレット、ラナンキュラスの病害防除対策 4) アボカドにおけるカメムシ類対策の検討 5) その他			北尾 井之川 北尾 長尾	長尾、前田、井上 鐘江、西川、河崎 三浦、前田、井上 小野、河崎、井上
農薬指導取締関係	1. 農薬取締指導に関すること 1) 農薬販売届の受理と台帳整理 2) 立入検査	園芸振興 園芸振興	三浦	西川 井之川	井之川、前田 西川、各地区担当、前田
	2. 農薬の安全使用に関すること 1) 農薬危害防止講習会 2) 農薬管理指導者養成研修	園芸振興 園芸振興		西川 小野	小野、各地区担当、前田 鐘江、北尾
協力業務及び連携活動	1. 協力業務に関すること 1) 植物防疫協会、施肥合理化協会		鐘江	鐘江	
	2. 関係機関(各県防除所等)との連携 1) 中国四国防除所職員協議会等			三浦	

Ⅱ 病虫害発生予察事業

1 事業実施概要

1) 対象農作物及び有害動植物

区分	対象農作物名	指定有害動植物	指定外有害動植物
普通作物	イ ネ	イネミズヅウムシ、コブノメイガ、スクミリンゴガイ※、セジロウンカ、ツマグロヨコバイ、トビイロウンカ、ニカメイガ、斑点米カメムシ類、ヒメトビウンカ、フタオビコヤガ、稲こうじ病、いもち病、ごま葉枯病、縞葉枯病、白葉枯病、苗立枯病、ばか苗病、もみ枯細菌病、紋枯病	萎縮病、穂枯れ、イチモンジセセリ、イネゾウムシ、イネシンガレセンチュウ、イナズマヨコバイ、イネキモグリバエ（イネカラバエ）、イネクロカメムシ、イネミギワバエ
	ム ギ 類	赤かび病、うどんこ病、さび病類	アブラムシ類、黒節病、縞萎縮病、株腐病、黒穂病、斑葉病、裸黒穂病、ムギダニ、ハモグリバエ類
果 樹	カ キ	アザミウマ類、カイガラムシ類、カキノヘタムシガ、ハマキムシ類、炭疽病	うどんこ病、角斑落葉病、円星落葉病、灰色かび病、マイマイガ
	カンキツ	アザミウマ類、アブラムシ類、ハダニ類、ミカンサビダニ※、ミカンバエ※、かいよう病、黒点病、そうか病	青・緑かび病、灰色かび病、炭疽病、クワゴマダラヒトリ、ミカンハモグリガ、ゴマダラカミキリ、カイガラムシ類、果実吸蛾類
	キウイフルーツ	かいよう病	花腐細菌病、クワシロカイガラムシ、ケムシ類
	ブ ド ウ	アザミウマ類、晩腐病、灰色かび病、べと病	カイガラムシ類、ハダニ類、フタテンヒメヨコバイ、ブドウスカシバ、ブドウトラカミキリ、さび病、うどんこ病、褐斑病、黒とう病、苦腐病、モウセン病、ハマキムシ類
	モ モ	クビアカツヤカミキリ※、シンクイムシ類、ハダニ類、せん孔細菌病	アブラムシ類、カイガラムシ類、モモハモグリガ、モモサビダニ、コスカシバ、うどんこ病、褐さび病、黒星病、縮葉病、炭疽病、灰星病
野 菜	アスパラガス	アザミウマ類	褐斑病、茎枯病、斑点病、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類
	イ チ ゴ	アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、うどんこ病、炭疽病、灰色かび病	輪斑病、疫病、萎黄病
	キャベツ	アブラムシ類、モンシロチョウ、菌核病、黒腐病	べと病、黒斑病、黒斑細菌病、ウワバ類、コナジラミ類、ハイマダラノメイガ
	キュウリ	アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、うどんこ病、褐斑病、炭疽病、灰色かび病、斑点細菌病、べと病	ワタヘリクロノメイガ、ハモグリバエ類、モザイク病、つる枯病、つる割病、疫病
	タマネギ	アザミウマ類、白色疫病、べと病	腐敗病、黒斑病、さび病

野 菜	ニンジン	黒葉枯病	萎黄病、黒斑病、菌核病、うどんこ病、キアゲハ、ハモグリバエ類、ヒメフタテンヨコバイ
	ニンニク		アザミウマ類、さび病、春腐病
	ネギ	アザミウマ類、アブラムシ類、ネギコガ、ネギハモグリバエ、黒斑病、さび病、べと病	疫病、軟腐病、えそ条斑病
	ブロッコリー		アブラムシ類、モンシロチョウ、ウワバ類、コナジラミ類、ハイマダラノメイガ、黒斑細菌病、黒斑病、花蕾腐敗病、菌核病、黒腐病、べと病
	レタス	アブラムシ類、菌核病、灰色かび病	萎黄病、モザイク病、斑点細菌病、腐敗病、べと病、すそ枯病、斑点病、ナメクジ類、ハモグリバエ類
花 き	キク	アザミウマ類、アブラムシ類、ハダニ類、白さび病	黒さび病、ハモグリバエ類
作物共通		オオタバコガ、コナガ、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ、ヨトウガ、果樹カメムシ類	

※発生予察対象外

2) 普通作物病虫害発生予察

(1) 定点調査

① 県予察ほ場（農業試験場内）

作物名	品 種	栽 培 様 式	調 査 期 間
水稻	コシヒカリ、ヒノヒカリ、おいでまい (3 品種)	播種：5 月下旬 移植：6 月中旬 稚苗移植栽培	6 月下旬～9 月下旬
麦類	イチバンボシ、さぬきの夢 2009 (2 品種)	播種：11 月中旬 ドリル播栽培	3 月上旬～5 月下旬

② 予察灯調査 100W 高圧水銀灯：1 カ所（農試構内 野菜病虫害発生予察と兼用）
4 月 1 日～11 月 30 日、主要害虫の日別誘殺数調査

(2) 巡回調査

① 普通作物巡回調査地点（数値は調査ほ場数）

地区	調 査 地 点	水 稻		麦 類		ウンカ類 越冬
		早短期	普通期	裸麦	小麦	
東 讃	東かがわ市与田山	○2	○2			
	さぬき市大川町富田西	○2	○2			
	三木町井上	○2	○2			
	三木町田中				○3	○3
	高松市香川町浅野		○2			
	高松市香川町川東				○3	○3
	高松市香南町由佐			○3		
	高松市元山町			○3		
	高松市下田井町				○3	○3
	高松市東植田町			○3		
	計	3 (6)	4 (8)	3 (9)	3 (9)	3 (9)
中 讃	綾川町西分	○2				
	綾川町陶		○2	○3	○3	○3
	綾川町畑田	○2				
	綾川町北				○3	○3
	坂出市府中町		○2	○3		
	まんのう町炭所西	○2				
	まんのう町東高篠			○3	○3	○3
	まんのう町川東	○2				
	丸亀市金倉町		○2		○3	○3
	多度津町葛原			○3		
	善通寺市吉原町		○2			
	計	4 (8)	4 (8)	4 (12)	4 (12)	4 (12)
西 讃	三豊市三野町大見甲	○2				
	三豊市財田町財田上	○1	○2			
	三豊市財田町財田中	○1				
	三豊市豊中町比地大		○1			
	三豊市高瀬町下勝間		○1			
	三豊市高瀬町比地				○3	○3
	観音寺市古川町		○2			
	計	3 (4)	4 (6)	0	1 (3)	1 (3)
合 計		10 (18)	12 (22)	7 (21)	8 (24)	8 (24)

②普通作物巡回調査時期

実施時期	水 稲		麦 類	
	早短期	普通期	裸麦	小麦
4月中旬			○	○
4月下旬			○	
(5月中旬)			○	
5月下旬	○			○▲
6月上旬		☆		
6月中旬	△○			
7月上旬	△○	△○		
7月下旬	△▲○	○		
8月中旬	△▲○	△○		
9月中旬		▲○		
10月中旬				
3月中旬			○	○
合 計	△4 ▲2 ○5	☆1 △2 ▲1 ○4	○4	○3 ▲1

注：△畦畔すくい取り（20回振り）、▲本田すくい取り（20回振り）、☆育苗期
 水稻の○は見取りと25株払い落とし調査。小麦の5月は生育状況により選択。

（3）水稻

①主要病害虫の発生状況

ア早短期水稻 5,754ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
葉いもち	平年：並	平年：並	2,238ha	7月上旬の発生ほ場率は38.9%と平年よりやや高く、発病株率は1.2%と平年よりやや低く、発生量は平年並であった。	梅雨期の高温。
穂いもち	平年：並	平年：やや少	320ha	8月上旬の発生ほ場率は5.6%と平年並、発病穂率は0.2%でやや低く、発生量はやや少なかった。	出穂期頃の高温、少雨。
紋枯病	平年：並	平年：少	320ha	7月下旬の発生量は平年よりやや少なかった、8月上旬の発生は認められなかった。	栽培期間を通じて気温が高く推移し、出穂期前の防除により感染の拡大が抑えられた。
ばか苗病	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	近年は少発生が続いている。
もみ枯細菌病	平年：－	平年：やや少	0ha	発生は認められなかった。	近年は少発生が続いている。
ごま葉枯病	平年：並	平年：多	959ha	7月下旬の発生ほ場率は11.1%と高く、発病株率は14.0%と高く、発生量は多かった。	7～8月の高温による肥効の低下。
縞葉枯病	平年：やや遅い	平年：やや少	2,557ha	7月下旬の発生ほ場率は44.4%と平年並、発病株率は0.9%で平年よりやや低く、発生量は平年よりやや少なかった。	ヒメトビウンカ幼虫の保毒虫率の変動によるもの。
稲こうじ	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	近年は少発生が続いている。

病					いる。
白葉枯病	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	これまで本県で発生は認められていない。
ニカメイガ	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	近年は少発生が続いている。
セジロウンカ	平年：並	平年：並	320ha	予察灯では7月の第1半旬に誘殺が認められた。誘殺数は6月～8月を通してやや少なかった。水稻ほ場では7月上旬の発生ほ場率は5.6%と平年並、株当たり虫数は1.0頭とやや少なく、発生量は平年並であった。	6～7月の飛来量。
トビイロウンカ	平年：やや遅い	平年：並	0ha	予察灯では9月第2半旬から誘殺が認められ、誘殺時期はやや遅かった。水稻ほ場では、発生は認められなかった。	6～7月の飛来量。
ヒメトビウンカ	平年：並	平年：やや少	5,435ha	5月の小麦の穂でのすくい取り調査における発生量は平年よりやや多かった。予察灯では、6月第2半旬に誘殺が認められた。誘殺数は5～8月を通してやや少なかった。水稻ほ場の8月上旬の発生ほ場率は94.4%と平年並、株当たり虫数は15.8頭とやや少なく、発生量は平年よりやや少なかった。	6～7月の高温。
ツマグロヨコバイ	平年：並	平年：少	2,238ha	予察灯では5月第3半旬に誘殺が認められ、誘殺数は5～8月を通してやや少なかった。水稻ほ場の7月上旬の発生ほ場率は38.9%と低く、株当たり虫数は2.3頭と少なく、発生量は平年より少なかった。	育苗箱施用剤により発生が抑えられている。
斑点米カメムシ類	平年：並	平年：並	5,435ha	6月～7月の予察灯では、大型カメムシはやや多かったが、8月以降は平年並であった。水稻ほ場の8月上旬の発生量は平年よりやや少なかった。	出穂期前の防除により発生が抑えられた。
フタオビコヤガ	平年：－	平年：やや少	0ha	発生は認められなかった。	近年は少発生が続いている。
コブノメイガ	平年：－	平年：やや少	0ha	発生は認められなかった。	6～7月の飛来量。
イネミズゾウムシ	平年：やや早い	平年：並	3,517ha	越冬成虫 50%飛翔開始時期は4月第5半旬と推定され、やや早かった。水稻ほ場の5月下旬の発生ほ場率は61.1%と平年よりやや低く、発生株率は21.9%と平年並、発生量は平年並であった。	育苗箱施用剤により発生が抑えられている。

イ 普通期水稻 4,434ha

葉いもち	平年：並	平年：やや多	2,217ha	8月上旬の発生ほ場率は50.0%と平年よりやや低く、発病株率は52.5%とやや高く、発生量は平年よりやや多かった。	8月第2～3半旬時の多雨、日照不足。
穂いもち	平年：並	平年：やや少	1,209ha	9月中旬の発生ほ場率は27.3%と平年並、発病穂率は0.6%とやや低く、発生量はやや少なかった。	6月後半以降栽培期間を通して気温が高く推移した。
紋枯病	平年：やや遅い	平年：並	2,620ha	9月中旬の発生ほ場率は59.1%と平年よりやや高く、発病株率は31.1%と平年並、発生量は平年並であった。	育苗期施用剤と出穂期前の防除により感染が抑えられた。
ばか苗病	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	近年は少発生が続いている。
もみ枯細菌病	平年：－	平年：並	202ha	9月中旬の発生ほ場率は4.5%と平年並、発病穂率は0.1%で低く、発生量は平年並であった。	7～8月の高温。
ごま葉枯病	平年：やや遅い	平年：並	202ha	9月中旬の発生ほ場率は4.5%と平年並、発病面積率は0.1%とやや低く、発生量は平年並であった。	7～8月の高温による肥効の低下。
縞葉枯病	平年：並	平年：やや少	806ha	9月中旬の発生ほ場率は18.2%と平年より低く、発病株率も2.0%とやや低く、発生量は平年よりやや少なかった。	ヒメトビウンカの保毒虫率の変動によるもの。
稲こうじ病	平年：－	平年：やや少	0ha	発生は認められなかった。	7～8月の高温、少雨。
白葉枯病	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	これまで本県で発生は認められていない。
苗立枯病	平年：－	平年：やや少	0ha	発生は認められなかった。	健全種子の利用。 種子消毒の徹底。
ニカメイガ	平年：－	平年：やや少	0ha	発生は認められなかった。	近年は少発生が続いている。
セジロウンカ	平年：並	平年：やや少	605ha	予察灯では7月第1半旬に誘殺が認められ、誘殺時期は平年並であり、6月～8月の誘殺数はやや少なかった。水稻ほ場での8月上旬の発生ほ場率が13.6%と平年より低く、株当たりの虫数は2.0頭とやや低く、発生量は平年よりもやや少なかった。	6～8月の飛来量。

トビイロウンカ	平年：やや遅い	平年：やや少	0ha	予察灯では9月第2半旬から誘殺が認められ、誘殺時期はやや遅かった。誘殺数は9月は平年よりやや少なかったが、10月は平年よりやや多かった。水稲ほ場では発生は認められなかった。	6～8月の飛来量。
ヒメトビウンカ	平年：並	平年：少	3,426ha	5月の小麦の穂でのすくい取り調査における発生量は平年よりやや多かった。予察灯では、6月第2半旬に誘殺が認められた。誘殺数は5～9月を通してやや少なかった。水稲ほ場の9月中旬の発生ほ場率は77.3%と平年より低く、株当たり虫数は7.4頭と低く、発生量は平年より少なかった。	育苗箱施用剤により発生が抑えられている。
ツマグロヨコバイ	平年：並	平年：少	2,217ha	予察灯では5月第3半旬に誘殺が認められ、誘殺数は5～9月を通して平年並からやや少なかった。水稲ほ場の8月上旬の発生ほ場率は50.0%と平年より低く、株当たり虫数は11.1頭と平年よりやや少なく、発生量は平年より少なかった。	7～8月の高温乾燥。
斑点米カメムシ類	平年：並	平年：やや少	2,016ha	8～9月の予察灯では、シラホシカメムシは平年より多かったが、ミナミアオカメムシ、クモヘリカメムシおよびホソハリカメムシが平年並からやや少なく、アカヒゲホソミドリカスミカメ、アカスジカスミカメはやや少から少であった。水稲ほ場の9月上旬の発生量は平年よりやや少なかった。	7～9月の高温乾燥。
フタオビコヤガ	平年：－	平年：やや少	0ha	予察灯での発生は認められなかった。水稲ほ場での発生も認められなかった。	近年は少発生が続いている。
コブノメイガ	平年：並	平年：並	1,612ha	9～10月の予察灯での誘殺数は多かった。9月中旬の発生ほ場率は36.4%と平年並、株当たり虫数は2.0頭と平年並で、発生量は平年並であった。	8～9月の飛来量。
イネミズゾウムシ	平年：やや早い	平年：少	403ha	越冬成虫の50%飛翔開始時期は4月第5半旬と推定され、やや早かった。7月上旬の発生ほ場率は9.1%とやや低く、発生株率は0.8%とやや低く、発生量は少なかった。	育苗箱施用剤により発生が抑えられている。

②程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実 防除	延 防除
早短期水稻	5,754	葉いもち	0	0	0	2,238	2,238	5,754	10,138
		穂いもち	0	0	0	320	320	1,581	4,172
		紋枯病	0	0	0	320	320	5,301	6,882
		ばか苗病	0	0	0	0	0	5,665	5,665
		もみ枯細菌病	0	0	0	0	0	301	301
		ごま葉枯病	0	0	639	320	959	0	0
		縞葉枯病	0	0	0	2,557	2,557	0	0
		稲こうじ病	0	0	0	0	0	301	301
		ニカメイガⅠ	0	0	0	0	0	0	0
		ニカメイガⅡ	0	0	0	0	0	3,286	3,286
		セジロウンカ	0	0	0	320	320	3,975	6,567
		トビイロウンカ	0	0	0	0	0	3,975	6,701
		ヒメトビウンカ	0	0	320	5,115	5,435	5,754	6,028
		ツマグロヨコバイ	0	0	0	2,238	2,238	3,975	6,400
		斑点米カメムシ類	320	0	2,877	2,238	5,435	5,419	5,419
		フタオビコヤガ	0	0	0	0	0	3,524	3,705
		コブノメイガ	0	0	0	0	0	3,312	3,252
		イネミズゾウムシ	0	0	320	3,197	3,517	3,674	3,674
普通期水稻	4,434	葉いもち	0	806	403	1,008	2,217	4,405	7,651
		穂いもち	0	0	0	1,209	1,209	1,365	3,700
		紋枯病	403	403	403	1,411	2,620	4,434	5,903
		ばか苗病	0	0	0	0	0	4,140	4,140
		もみ枯細菌病	0	0	0	202	202	220	220
		ごま葉枯病	0	0	0	202	202	0	0
		縞葉枯病	0	0	0	806	806	0	0
		稲こうじ病	0	0	0	0	0	232	232
		ニカメイガⅠ	0	0	0	0	0	0	0
		ニカメイガⅡ	0	0	0	0	0	2,559	2,559
		セジロウンカ	0	0	0	605	605	3,127	5,462
		トビイロウンカ	0	0	0	0	0	3,127	5,374
		ヒメトビウンカ	0	0	0	3,426	3,426	4,405	4,405
		ツマグロヨコバイ	0	0	0	2,217	2,217	3,127	5,154
		斑点米カメムシ類	0	605	403	1,008	2,016	2,290	4,845
		フタオビコヤガ	0	0	0	0	0	2,775	3,392
		コブノメイガ	0	0	0	1,612	1,612	2,643	3,083
		イネミズゾウムシ	0	0	0	403	403	2,907	2,907

③ 調査成績

ア 巡回調査

いもち病（早短期栽培）

年度	5 月下旬		6 月上旬		7 月上旬		8 月上旬(穂)	
	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	穂率
2015	0.0		0.0		22.2	50.1	22.2	3.8
2016	0.0		0.0		72.2	3.5	33.3	3.1
2017	0.0		0.0		11.1	1.3	11.1	0.3
2018	0.0		5.6	1.0	11.1	4.5	5.6	0.2
2019	0.0		0.0		0.0		0.0	
2020	0.0		0.0		5.6	0.5	0.0	
2021	0.0		0.0		11.1	0.2	0.0	
2022	0.0		0.0		22.2	27.0	16.7	1.0
2023	0.0		0.0		27.8	5.7	33.3	0.2
2024	0.0		0.0		11.1	1.0	0.0	
2025	0.0		0.0		38.9	1.2	5.6	0.2
平年値	0.0	-	0.6	1.0	19.4	10.4	12.2	1.4

いもち病（普通期栽培）

年度	7 月上旬		7 月下旬		8 月上旬		9 月上旬(穂)	
	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	穂率
2015	0.0		31.8	17.1	59.1	38.6	22.7	4.5
2016	0.0		63.6	52.3	50.0	70.6	68.2	1.0
2017	0.0		54.5	26.5	68.2	25.3	22.7	2.8
2018	0.0		0.0		50.0	8.0	4.5	0.2
2019	0.0		50.0	9.8	63.6	35.4	45.5	1.1
2020	9.1	0.8	40.9	7.1	45.5	3.4	22.7	0.5
2021	0.0		90.9	18.7	90.9	29.7	72.7	0.7
2022	4.5	1.0	27.3	51.0	50.0	38.1	18.2	6.0
2023	0.0		36.4	10.0	54.5	24.2	31.8	0.7
2024	0.0		59.1	12.6	40.9	35.4	27.3	0.5
2025	4.5	0.5	40.9	12.2	50.0	52.5	27.3	0.6
平年値	1.4	0.9	45.5	22.8	57.3	30.9	33.6	1.8

紋枯病（早短期栽培）

年度	7 月上旬		7 月下旬		8 月上旬		
	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率	発病度
2015	0.0		38.9	9.7	66.7	18.3	9.3
2016	5.6	4.0	11.1	4.0	11.1	34.0	8.5
2017	16.7	1.0	11.1	4.0	44.4	7.0	2.3
2018	0.0		11.1	4.0	16.7	6.7	2.0
2019	0.0		16.7	10.7	33.3	8.0	2.2
2020	0.0		5.6	12.0	0.0		
2021	0.0		0.0		38.9	6.9	2.1
2022	16.7	9.7	38.9	20.6	33.3	26.7	13.7
2023	0.0		33.3	12.0	38.9	10.3	4.6
2024	11.1	9.0	33.3	34.0	16.7	34.7	10.3
2025	5.6	2.0	5.6	4.0	0.0		
平年値	5.0	5.9	20.0	12.3	30.0	17.0	6.1

紋枯病（普通期栽培）

年度	7 月上旬		7 月下旬		8 月上旬		9 月上旬		
	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率	発病度
2015	4.5	1.0	27.3	9.3	45.5	21.6	59.1	32.3	11.8
2016	0.0		4.5	1.0	13.6	2.7	22.7	28.0	9.2
2017	0.0		13.6	26.0	54.5	12.3	54.5	54.7	7.3
2018	0.0		0.0		13.6	7.0	45.5	29.6	5.2
2019	0.0		18.2	9.3	27.3	21.8	63.6	47.7	9.6
2020	0.0		4.5	1.0	4.5	70.0	40.9	27.1	4.3
2021	0.0		4.5	2.0	9.1	0.7	59.1	25.8	6.7
2022	0.0		9.1	1.0	36.4	3.6	68.2	35.2	9.9
2023	0.0		0.0		9.1	3.5	50.0	11.3	3.0
2024	0.0		0.0		13.6	15.7	54.5	37.0	8.7
2025	0.0		0.0		13.6	4.2	59.1	31.1	8.9
平年値	0.5	1.0	8.2	7.1	22.7	15.9	51.8	32.9	7.6

ばか苗病（早短期栽培）

年度	5月下旬		6月上中旬		7月上中旬	
	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率
2015	0.0		0.0		0.0	
2016	0.0		0.0		0.0	
2017	0.0		0.0		0.0	
2018	0.0		0.0		0.0	
2019	0.0		0.0		0.0	
2020	0.0		0.0		0.0	
2021	0.0		0.0		0.0	
2022	0.0		0.0		0.0	
2023	0.0		0.0		0.0	
2024	0.0		0.0		0.0	
2025	0.0		0.0		0.0	
平年値	0.0	-	0.0	-	0.0	-

ばか苗病（普通期栽培）

年度	育苗期			7月上中旬		7月下旬		8月上中旬	
	農家率	箱率	本数/箱	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率
2015	0.0			0.0		0.0		0.0	
2016	3.4	3.3	1.0	0.0		0.0		0.0	
2017	0.0			0.0		0.0		0.0	
2018	3.4	21.3	0.7	0.0		0.0		0.0	
2019	0.0			0.0		0.0		0.0	
2020	8.0	0.3	0.0	0.0		0.0		0.0	
2021	15.4	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0	
2022	15.4	2.3	0.4	0.0		0.0		0.0	
2023	8.3	1.0	0.1	0.0		0.0		0.0	
2024	11.1	1.2	0.1	0.0		0.0		0.0	
2025	27.0	3.2	4.0	0.0		0.0		0.0	
平年値	6.5	4.2	0.3	0.0	-	0.0	-	0.0	-

もみ枯細菌病（早短期栽培）

年度	8月上中旬	
	圃場率	穂率
2015	16.7	0.2
2016	5.6	0.2
2017	11.1	0.2
2018	0.0	
2019	0.0	
2020	5.6	0.4
2021	0.0	
2022	0.0	
2023	0.0	
2024	0.0	
2025	0.0	
平年値	3.9	0.2

もみ枯細菌病（普通期栽培）

年度	育苗期		9月上中旬	
	農家率	箱率	圃場率	穂率
2015	0.0		18.2	0.2
2016	0.0		0.0	
2017	0.0		4.5	0.7
2018	6.9	0.8	0.0	
2019	4.5	35.0	9.1	0.5
2020	8.0	0.2	0.0	
2021	0.0		0.0	
2022	0.0		0.0	
2023	0.0		4.5	0.2
2024	0.0	0.0	0.0	
2025	0.0		4.5	0.1
平年値	1.9	9.0	3.6	0.4

ごま葉枯れ病（早短期栽培）

年度	6月上中旬		7月上中旬		7月下旬		8月上中旬(穂)	
	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	穂率
2015	0.0		0.0		0.0		0.0	
2016	0.0		0.0		0.0		0.0	
2017	0.0		0.0		0.0		0.0	
2018	0.0		0.0		0.0		0.0	
2019	0.0		0.0		5.6	12.0	0.0	
2020	0.0		0.0		0.0		0.0	
2021	0.0		0.0		0.0		0.0	
2022	0.0		0.0		0.0		11.1	0.7
2023	0.0		11.1	0.4	0.0		5.6	0.2
2024	0.0		0.0		5.6	4.0	0.0	
2025	0.0		5.6	1.0	11.1	14.0	0.0	
平年値	0.0	-	1.1	0.4	1.1	8.0	1.7	0.4

ごま葉枯れ病（普通期栽培）

年度	育苗期			7月上中旬		7月下旬		8月上中旬		9月上中旬(穂)	
	農家率	箱率	程度	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	面積率
2015	0.0			0.0		0.0		0.0		0.0	
2016	0.0			0.0		0.0		0.0		0.0	
2017	0.0			0.0		0.0		0.0		4.5	3.0
2018	0.0			0.0		0.0		13.6	1.7	13.6	0.5
2019	0.0			0.0		4.5	2.0	22.7	34.2	27.3	1.1
2020	0.0			0.0		0.0		0.0		4.5	0.1
2021	0.0			0.0		0.0		0.0		0.0	
2022	0.0			0.0		0.0		0.0		0.0	
2023	0.0			0.0		0.0		4.5	1.0	18.2	20.2
2024	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		13.6	0.2
2025	0.0			0.0		0.0		0.0		4.5	0.1
平年	0.0	0.0	-	0.0	-	0.5	2.0	4.1	12.3	8.2	4.2

縞葉枯病（早短期栽培）

年度	6月上中旬		7月上中旬		7月下旬		8月上中旬	
	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率
2015	5.6	1.0	22.2	1.5	5.6	9.0	11.1	14.5
2016	0.0		38.9	2.0	44.4	3.0	38.9	5.7
2017	77.8	2.9	77.8	2.9	66.7	4.3	66.7	7.9
2018	0.0		77.8	2.9	72.2	3.2	33.3	8.8
2019	0.0		66.7	2.2	72.2	1.8	61.1	7.2
2020	5.6	0.5	27.8	1.4	44.4	1.0	16.7	1.5
2021	0.0		44.0	0.3	50.0	1.3	22.2	0.2
2022	5.6	1.0	50.0	0.9	44.4	0.9	5.6	1.0
2023	27.8	1.0	66.7	1.4	50.0	1.4	16.7	2.3
2024	0.0		27.8	2.0	27.8	3.9	16.7	2.0
2025	11.1	0.8	38.9	0.5	44.4	0.9	27.8	1.3
平年値	12.2	1.3	50.0	1.8	47.8	3.0	28.9	5.1

縞葉枯病（普通期栽培）

年度	7月上中旬		7月下旬		8月上中旬		9月上中旬	
	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率
2015	0.0		0.0		0.0		0.0	
2016	4.5	1.0	9.1	1.0	22.7	1.2	45.5	1.4
2017	4.5	1.0	9.1	1.0	13.6	1.0	68.2	2.5
2018	4.5	1.0	50.0	2.1	72.7	4.8	90.9	15.8
2019	0.0		9.1	1.0	31.8	1.9	54.5	8.4
2020	0.0		31.8	1.7	50.0	3.6	77.3	11.3
2021	18.2	1.3	54.5	2.0	63.6	2.4	45.5	2.1
2022	0.0		68.0	2.4	36.0	0.9	45.5	2.2
2023	4.5	0.3	31.8	1.1	27.3	1.1	9.1	3.0
2024	0.0		9.1	0.6	31.8	0.7	59.1	4.1
2025	4.5	1.0	18.2	0.8	4.5	1.0	18.2	2.0
平年	3.6	0.9	27.3	1.4	35.0	2.0	49.6	5.6

稲こうじ病（早短期栽培）			
8月中下旬			
年度	圃場率	穂率	株率
2015	0.0		
2016	5.6	0.2	4.0
2017	0.0		
2018	0.0		
2019	0.0		
2020	0.0		
2021	0.0		
2022	0.0		
2023	0.0		
2024	0.0		
2025	0.0		
平年値	0.6	0.2	4.0

稲こうじ病（普通期栽培）			
9月上中旬			
年度	圃場率	穂率	株率
2015	0.0		
2016	4.5	0.2	4.0
2017	0.0		
2018	0.0		
2019	22.7	0.3	7.2
2020	9.1	0.5	4.0
2021	9.1	0.3	6.0
2022	0.0		
2023	13.6	0.5	6.7
2024	0.0		
2025	0.0		
平年値	5.9	0.3	4.8

白葉枯病（早短期栽培）					
5月下旬		6月上中旬		7月上中旬	
年度	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023	0		0		0
2024	0		0		0
2025	0		0		0
平年値	0	-	0	-	0

白葉枯病（普通期栽培）									
育苗期				7月上中旬		7月下旬		8月上中旬	
年度	農家率	箱率	本数/箱	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率
2015									
2016									
2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023	0.0			0.0		0.0		0.0	
2024	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	
2025	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	
平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-

苗立枯病（普通期栽培）		
育苗期		
年度	圃場率	穂率
2015	0.0	
2016	0.0	
2017	0.0	
2018	3.4	0.6
2019	0.0	
2020	8.0	0.6
2021	7.7	0.6
2022	3.8	4.0
2023	0.0	
2024	8.3	2.6
2025	0.0	
平年値	3.1	1.7

ニカメイガ（早短期栽培）

年度	5月下旬		6月上中旬		7月上中旬		7月下旬		8月上中旬	
	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率
2015			0.0		11.1	1.3	0.0		0.0	
2016			0.0		5.6	1.0	0.0		0.0	
2017	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
2018	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
2019	0.0		5.6	1.0	0.0		0.0		0.0	
2020	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
2021	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
2022	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
2023	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
2024	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
2025	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
平年値	0.0	-	0.6	1.0	1.7	1.2	0.0	-	0.0	-

ニカメイガ（普通期栽培）

年度	7月上中旬		7月下旬		8月上中旬		9月上中旬	
	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率
2015	0.0		0.0		4.5	1.0	9.1	4.0
2016	0.0		0.0		0.0		4.5	1.0
2017	0.0		0.0		0.0		0.0	
2018	0.0		0.0		0.0		0.0	
2019	0.0		0.0		0.0		0.0	
2020	0.0		0.0		0.0		0.0	
2021	0.0		0.0		0.0		0.0	
2022	0.0		0.0		0.0		0.0	
2023	0.0		0.0		0.0		4.5	0.1
2024	0.0		0.0		0.0		4.5	1.0
2025	0.0		0.0		0.0		0.0	
平年値	0.0	-	0.0	-	0.5	1.0	2.3	1.5

セジロウンカ（早短期栽培）

年度	6月上中旬		7月上中旬				7月下旬				8月上中旬			
	圃場率	虫数	圃場率	虫数	成虫率	短翅♀率	圃場率	虫数	成虫率	短翅♀率	圃場率	虫数	成虫率	短翅♀率
2015	5.6	1.0	33.3	5.3	3.1	0.0	55.6	9.4	1.1	0.0	22.2	1.5	50.0	
2016	0.0		33.3	1.2	100.0	0.0	66.7	11.2	9.7	0.0	50.0	5.1	10.9	0.0
2017	0.0		0.0				0.0				5.6	1.0	0.0	
2018	0.0		0.0				0.0				0.0			
2019	0.0		0.0				11.1	3.0	0.0		16.7	2.0	100.0	0.0
2020	11.1	1.0	16.7	3.3	50.0	0.0	33.3	3.5	47.9		72.2	4.4	77.8	66.7
2021	5.6	3.0	16.7	1.7	100.0	0.0	22.2	1.8	50.0	0.0	38.9	6.3	59.2	0.0
2022	0.0		0.0				0.0				5.6	1.0		
2023	0.0		5.6	1.0	100.0		16.7	3.7	16.7	0.0	27.8	1.8		
2024	0.0		22.2	1.5	88.9		33.3	16.3	43.8	23.8	22.2	1.3	83.3	100.0
2025	0.0		5.6	1.0			0.0			0.0	0.0			
平年値	2.2	1.7	12.8	2.3	73.7	0.0	23.9	7.0	24.2	4.8	26.1	2.7	54.5	33.3

セジロウンカ（普通期栽培）

年度	7月上中旬				7月下旬				8月上中旬				9月上中旬			
	圃場率	虫数	成虫率	短翅♀率	圃場率	虫数	成虫率	短翅♀率	圃場率	虫数	成虫率	短翅♀率	圃場率	虫数	成虫率	短翅♀率
2015	22.7	4.4	22.7	0.0	72.7	11.9	10.5	13.6	86.4	10.6	12.9	0.0	59.1	8.6		
2016	9.1	1.0	100.0	0.0	68.2	6.5	37.1	0.0	90.9	28.9	26.9	0.0	22.7	5.4		
2017	0.0				18.2	1.0	0.0	0.0	22.7	4.8	52.3	100.0	40.9	8.6		
2018	0.0				0.0				31.8	2.1	40.0	0.0	9.1	6.1		
2019	0.0				50.0	8.4	76.6	60.8	50.0	2.9	93.8	75.6	45.5	4.0		
2020	36.4	2.4	88.9	0.0	90.9	17.7	26.2	0.0	72.7	19.4	56.0	0.0	27.3	6.8		
2021	22.7	1.4	100.0	100.0	72.7	22.8	22.8	25.0	68.2	19.9	37.8	27.1	31.8	6.0		
2022	0.0				45.5	8.2	72.5	93.8	45.5	25.7	48.9	54.2	54.5	2.4		
2023	13.6	1.7	77.8		45.5	6.1	29.3	75.0	31.8	11.4	42.2	16.7	31.8	8.2		
2024	22.7	1.6	93.3		45.5	7.3	58.5	31.1	68.2	38.7	32.3	41.6	9.1	2.5	0.2	0.0
2025	0.0				13.6	1.0	100.0	100.0	13.6	2.0	100.0	50.0	9.1	2.5	0.2	0.0
平年値	12.7	2.1	80.5	25.0	50.9	10.0	37.1	33.3	56.8	16.4	44.3	31.5	33.2	5.9		

トビイロウンカ（早短期栽培）

年度	6月上中旬		7月上中旬				7月下旬				8月上中旬			
	圃場率	虫数	圃場率	虫数	成虫率	短翅♀率	圃場率	虫数	成虫率	短翅♀率	圃場率	虫数	成虫率	短翅♀率
2015	0.0		0.0				0.0				0.0			
2016	0.0		0.0				0.0				0.0			
2017	0.0		0.0				0.0				5.6	1.0	100.0	
2018	0.0		0.0				0.0				0.0			
2019	0.0		0.0				0.0				0.0			
2020	0.0		0.0				0.0				0.0			
2021	0.0		0.0				0.0				0.0			
2022	0.0		0.0				0.0				5.6	1.0	100.0	0.0
2023	0.0		0.0				0.0				0.0			
2024	0.0		0.0				0.0				0.0			
2025	0.0		0.0				0.0				0.0			
平年値	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	1.1	1.0	100.0	0.0

トビイロウンカ（普通期栽培）

年度	7月上中旬		7月下旬				8月上中旬				9月上中旬			
	圃場率	虫数	圃場率	虫数	成虫率	短翅♀率	圃場率	虫数	成虫率	短翅♀率	圃場率	虫数	成虫率	短翅♀率
2015	0.0		0.0				0.0				0.0			79.2
2016	0.0		0.0				0.0				0.0			100.0
2017	0.0		0.0				0.0				40.9	1.7	89.3	
2018	0.0		0.0				0.0				0.0			
2019	0.0		0.0				9.1	1.0	100.0	100.0	95.5	9.0	47.4	100.0
2020	0.0		4.5	1.0	100.0		22.7	1.0	100.0	100.0	86.4	119.4	64.1	
2021	0.0		0.0				0.0				0.0			67.2
2022	0.0		0.0				4.5	1.0	0.0		31.8	3.3	69.8	46.1
2023	0.0		0.0				0.0				4.5	1.0	100.0	100.0
2024	0.0		0.0				0.0				4.5	8.0		
2025	0.0		0.0				0.0				0.0			
平年値	0.0	-	0.5	1.0	100.0	-	3.6	1.0	66.7	100.0	26.4	23.7	74.1	82.1

ヒメトビウンカ（早短期栽培）

年度	6月上中旬		7月上中旬		7月下旬		8月上中旬	
	圃場率	虫数	圃場率	虫数	圃場率	虫数	圃場率	虫数
2015	94.4	4.1	100.0	16.9	100.0	17.1	100.0	22.1
2016	83.3	6.7	100.0	26.1	100.0	25.4	100.0	46.1
2017	88.9	6.1	88.9	19.5	100.0	39.4	100.0	33.8
2018	66.7	2.6	100.0	15.3	94.4	8.2	100.0	33.6
2019	83.3	5.5	94.4	14.1	94.4	28.2	88.9	14.8
2020	55.6	2.0	100.0	17.7	88.9	20.9	100.0	11.2
2021	83.3	8.7	100.0	22.9	100.0	12.1	94.4	20.6
2022	72.2	4.0	94.4	24.7	100.0	60.0	88.9	19.4
2023	61.1	1.8	94.4	40.0	94.4	11.8	83.3	7.9
2024	94.4	53.4	100.0	38.6	100.0	23.2	61.1	23.4
2025	94.4	16.6	88.9	22.1	94.4	14.1	94.4	15.8
平年値	78.3	9.5	97.2	23.6	97.2	24.6	91.7	23.3

ヒメトビウンカ（普通期栽培）

年度	7月上中旬		7月下旬		8月上中旬		9月上中旬	
	圃場率	虫数	圃場率	虫数	圃場率	虫数	圃場率	虫数
2015	18.2	7.8	90.9	10.3	95.5	31.2	100.0	23.9
2016	45.5	1.1	95.5	9.6	100.0	22.9	100.0	17.2
2017	54.5	4.6	95.5	47.5	100.0	54.9	100.0	29.4
2018	22.7	4.0	86.4	5.8	95.5	29.2	100.0	21.3
2019	31.8	2.0	95.5	22.1	95.5	22.7	100.0	32.9
2020	54.5	11.1	100.0	44.1	86.4	41.6	95.5	32.1
2021	72.7	2.0	95.5	40.7	100.0	44.4	95.5	7.8
2022	86.4	7.5	90.9	42.4	90.9	49.2	95.5	10.5
2023	50.0	1.7	95.5	14.7	95.5	12.9	100.0	10.5
2024	22.7	1.0	77.3	14.1	95.5	26.2	86.4	14.3
2025	22.7	1.2	63.6	6.0	77.3	3.6	77.3	7.4
平年値	45.9	4.3	92.3	25.1	95.5	33.5	97.3	20.0

ツマグロヨコバイ（早短期栽培）

年度	6月上中旬		7月上中旬		7月下旬		8月上中旬	
	圃場率	虫数	圃場率	虫数	圃場率	虫数	圃場率	虫数
2015	33.3	2.3	61.1	16.1	77.8	8.5	72.2	82.5
2016	55.6	1.5	83.3	12.1	83.3	11.1	77.8	69.7
2017	44.4	2.0	66.7	10.5	61.1	5.4	55.6	43.7
2018	16.7	2.3	66.7	8.4	55.6	2.7	77.8	38.5
2019	33.3	1.0	77.8	5.4	83.3	6.9	88.9	38.6
2020	0.0		44.4	5.0	38.9	3.4	50.0	2.6
2021	22.2	3.0	55.6	3.8	61.1	3.2	55.6	4.9
2022	16.7	1.3	38.9	5.1	22.2	2.3	44.4	3.0
2023	16.7	2.0	55.6	7.3	50.0	1.7	38.9	13.0
2024	27.8	3.4	44.4	4.5	38.9	2.6	27.8	2.0
2025	11.1	3.5	38.9	2.3	11.1	1.0	16.7	2.0
平年値	26.7	2.1	59.5	7.8	57.2	4.8	58.9	29.9

ツマグロヨコバイ（普通期栽培）

年度	7月上中旬		7月下旬		8月上中旬		9月上中旬	
	圃場率	虫数	圃場率	虫数	圃場率	虫数	圃場率	虫数
2015	40.9	3.0	86.4	36.0	81.8	55.4	81.8	20.4
2016	36.4	1.0	81.8	14.6	95.5	41.8	63.6	48.6
2017	22.7	3.8	77.3	25.5	86.4	72.6	95.5	18.2
2018	27.3	2.0	59.1	3.4	90.9	50.8	95.5	13.7
2019	4.5	1.0	81.8	10.1	77.3	24.4	100.0	25.6
2020	31.8	9.0	54.5	17.8	68.2	22.7	86.4	31.7
2021	18.2	5.5	63.6	17.0	54.5	50.3	90.9	5.1
2022	36.4	5.4	54.5	30.1	77.3	11.8	72.7	6.8
2023	40.9	8.1	68.2	23.6	72.7	5.9	95.5	8.0
2024	18.2	2.5	54.5	49.3	90.9	11.8	86.4	13.3
2025	4.5	1.0	50.0	7.9	50.0	11.1	77.3	6.1
平年値	27.7	4.1	68.2	22.7	79.6	34.8	86.8	19.1

斑点米カメムシ類

主要5種カメムシ類（ホソハリ、クモハリ、シラホシ、トゲシラホシ、ミナミアオ）

（早短期栽培）本田

年度	7月下旬		8月上中旬	
	圃場率	虫数	圃場率	虫数
2015	38.9	2.4	72.2	7.6
2016	44.4	6.0	77.8	4.8
2017	66.7	4.5	77.8	9.7
2018	50.0	5.4	94.4	3.7
2019	66.7	4.2	77.8	6.0
2020	72.2	5.3	72.2	4.9
2021	50.0	1.7	44.4	3.3
2022	83.3	5.2	55.6	1.8
2023	50.0	2.1	44.4	3.8
2024	61.1	3.6	30.8	3.5
2025	88.9	2.9	38.9	2.4
平年値	58.3	4.0	64.7	4.9

（普通期栽培）本田

年度	9月上中旬	
	圃場率	虫数
2015	36.4	31.4
2016	27.3	3.8
2017	54.5	1.6
2018	27.3	6.3
2019	63.6	34.2
2020	36.4	2.1
2021	72.7	6.1
2022	22.7	10.2
2023	50.0	12.2
2024	68.2	12.7
2025	45.5	6.8
平年値	45.9	12.1

（早短期栽培）畦畔

年度	6月中旬		7月上中旬		7月下旬		8月上中旬	
	圃場率	虫数	圃場率	虫数	圃場率	虫数	圃場率	虫数
2015	22.2	3.3	50.0	2.1	44.4	4.4	61.1	6.3
2016	44.4	1.6	22.2	1.8	55.6	4.2	50.0	4.4
2017	11.1	6.0	38.9	5.7	50.0	3.6	55.6	16.2
2018	27.8	1.4	44.4	3.0	33.3	5.7	55.6	4.7
2019	33.3	4.7	44.4	1.9	50.0	4.9	72.2	11.9
2020	38.9	2.3	22.2	5.3	44.4	1.9	61.1	6.9
2021	22.2	2.0	44.4	2.9	33.3	2.2	33.3	2.7
2022	27.8	3.4	27.8	4.0	33.3	1.2	55.6	6.1
2023	33.3	1.2	50.0	4.3	44.4	3.3	44.4	6.0
2024	50.0	4.9	61.1	5.1	83.3	3.1	84.6	9.1
2025	77.8	3.3	66.7	9.3	77.8	8.7	61.1	6.5
平年値	31.1	3.1	40.5	3.6	47.2	3.5	57.4	7.4

(普通期栽培) 畦畔

年度	7月上中旬		8月上中旬	
	圃場率	虫数	圃場率	虫数
2015	18.2	4.0	31.8	6.4
2016	36.4	1.8	40.9	4.6
2017	45.5	1.9	72.7	4.6
2018	31.8	1.1	54.5	9.2
2019	18.2	1.0	50.0	16.1
2020	18.2	1.3	27.3	4.3
2021	13.6	1.0	36.4	4.8
2022	36.4	4.8	54.5	9.7
2023	36.4	1.9	50.0	2.1
2024	50.0	2.3	72.7	10.7
2025	54.5	9.3	63.6	4.0
平年値	30.5	2.1	49.1	7.3

斑点米カメムシ類

カスミカメ2種（アカヒゲホソミドリ、アカシジ）

(早短期栽培) 本田

年度	7月下旬		8月上中旬	
	圃場率	虫数	圃場率	虫数
2015	50.0	5.4	50.0	7.6
2016	72.2	12.0	61.1	35.5
2017	77.8	13.7	50.0	6.1
2018	50.0	18.8	50.0	12.1
2019	72.2	8.9	33.3	2.8
2020	55.6	2.7	22.2	1.3
2021	44.4	6.0	22.2	2.8
2022	72.2	4.0	22.2	1.8
2023	61.1	6.5	11.1	1.5
2024	33.3	3.3	0.0	
2025	50.0	7.0	38.9	2.0
平年値	58.9	8.1	32.2	7.9

(普通期栽培) 本田

年度	9月上中旬	
	圃場率	虫数
2015	54.5	6.3
2016	36.4	4.4
2017	50.0	3.6
2018	22.7	5.8
2019	40.9	6.8
2020	18.2	2.5
2021	13.6	3.0
2022	9.1	1.5
2023	31.8	2.1
2024	18.2	1.3
2025	4.5	3.0
平年値	29.5	3.7

(早短期栽培) 畦畔

年度	6月中旬		7月上中旬		7月下旬		8月上中旬	
	圃場率	虫数	圃場率	虫数	圃場率	虫数	圃場率	虫数
2015	66.7	42.3	61.0	20.7	55.6	15.2	38.9	35.0
2016	66.7	96.8	61.1	22.2	55.6	10.5	50.0	7.8
2017	66.7	58.4	61.1	42.3	22.2	9.8	55.6	11.6
2018	72.2	29.5	61.1	52.5	44.4	9.1	33.3	2.2
2019	83.3	20.0	50.0	5.0	38.9	4.4	38.9	4.4
2020	72.2	22.1	27.8	7.4	22.2	16.8	33.3	3.2
2021	61.1	11.8	44.4	10.1	27.8	8.8	22.2	7.5
2022	50.0	12.3	38.9	3.0	22.2	6.3	22.2	2.0
2023	50.0	47.4	33.3	15.5	38.9	9.3	16.7	1.0
2024	61.1	10.2	33.3	13.0	27.8	7.2	46.2	5.7
2025	83.3	12.3	77.8	18.4	38.9	31.3	11.1	1.0
平年値	65.0	35.1	47.2	19.2	35.6	9.7	35.7	8.0

(普通期栽培) 畦畔

年度	7月上中旬		8月上中旬	
	圃場率	虫数	圃場率	虫数
2015	63.6	11.6	68.2	29.5
2016	63.6	23.5	50.0	17.5
2017	86.4	40.6	54.5	24.9
2018	72.7	28.3	36.4	34.4
2019	50.0	28.2	77.3	20.4
2020	54.5	11.3	27.3	9.0
2021	63.6	15.2	54.5	14.5
2022	81.8	56.1	40.9	30.8
2023	31.8	59.3	13.6	3.0
2024	22.7	18.2	36.4	7.5
2025	50.0	55.8	18.2	8.0
平年値	59.1	29.2	45.9	19.2

フタオビコヤガ（早短期栽培）

年度	6月上中旬		7月上中旬	
	圃場率	株率	圃場率	株率
2015	44.4	9.3	16.7	3.0
2016	61.1	15.3	16.7	8.7
2017	5.6	1.0	5.6	1.0
2018	33.3	2.9	11.1	1.5
2019	72.2	4.5	27.8	26.8
2020	5.6	0.1	11.1	0.8
2021	22.2	4.5	0.0	
2022	0.0		0.0	
2023	16.7	2.7	0.0	
2024	0.0		0.0	
2025	0.0		0.0	
平年値	26.1	5.0	8.9	7.0

フタオビコヤガ（普通期栽培）

年度	7月上中旬		7月下旬		8月上中旬	
	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率
2015	9.1	1.0	4.5	2.0	9.1	5.5
2016	13.6	6.0	50.0	5.9	63.6	10.8
2017	4.5	1.0	50.0	8.6	27.3	3.8
2018	9.1	1.5	9.1	4.5	4.5	6.0
2019	18.2	1.5	27.3	3.2	45.5	10.0
2020	9.1	3.0	4.5	1.0	4.5	15.0
2021	4.5	0.1	4.5	5.0	0.0	
2022	0.0		0.0		0.0	
2023	0.0		0.0		0.0	
2024	0.0		0.0		0.0	
2025	0.0		0.0		0.0	
平年値	6.8	2.0	15.0	4.3	15.5	8.5

コブノメイガ（早短期栽培）

年度	6月上中旬		7月上中旬		7月下旬		8月上中旬	
	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率
2015	0.0		16.7	1.3	0.0		11.1	1.0
2016	0.0		0.0		5.6	2.0	0.0	
2017	0.0		0.0		0.0		0.0	
2018	0.0		0.0		0.0		5.6	1.0
2019	16.7	1.3	16.7	2.0	5.6	1.0	0.0	
2020	0.0		16.7	1.5	83.3	1.4	27.8	0.6
2021	0.0		5.6	0.1	0.0		5.6	0.1
2022	0.0		0.0		16.7	0.4	0.0	
2023	0.0		0.0		0.0		0.0	
2024	0.0		0.0		0.0		0.0	
2025	0.0		0.0		0.0		0.0	
平年値	1.9	1.3	5.6	1.2	11.1	1.2	5.6	0.7

コブノメイガ（普通期栽培）

年度	7月上中旬		7月下旬		8月上中旬		9月上中旬	
	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率	圃場率	株率
2015	0.0		45.5	2.2	68.2	5.0	45.5	1.3
2016	0.0		13.6	1.0	54.5	2.8	45.5	1.7
2017	0.0		13.6	1.3	4.5	1.0	22.7	4.2
2018	0.0		0.0		4.5	2.0	4.5	1.0
2019	0.0		13.6	2.3	90.9	11.6	63.6	18.1
2020	27.3	4.8	68.2	3.6	81.8	3.7	18.2	1.8
2021	0.0		0.0		45.5	0.1	18.2	0.4
2022	0.0		9.1	0.6	27.3	1.1	9.1	1.0
2023	0.0		4.5	0.1	45.5	2.1	40.9	1.8
2024	0.0		9.1	0.3	77.3	11.0	63.6	25.2
2025	0.0		0.0		36.4	1.3	36.4	2.0
平年値	2.7	4.8	17.3	1.5	43.6	3.2	27.7	3.2

イネミズゾウムシ（早短期栽培）

年度	5 月下旬			6 月上中旬			7 月上中旬		
	圃場率	株率	成虫数	圃場率	株率	成虫数	圃場率	株率	成虫数
2015	77.8	50.9	1.8	61.1	8.3	3.0	5.6	1.0	0.0
2016	77.8	59.9	10.3	72.2	27.8	3.3	5.6	1.0	0.0
2017	83.3	41.7	4.0	83.3	24.9	1.0	0.0		
2018	66.7	28.6	2.7	55.6	18.9	5.0	5.6	1.0	
2019	83.3	20.3	2.0	83.3	17.5	2.0	22.2	2.5	
2020	72.2	10.9	1.5	44.4	5.4		5.6	2.0	
2021	66.7	10.6	1.3	55.6	10.2	4.0	5.6	0.2	
2022	61.1	16.1	0.4	38.9	1.9	0.0	0.0		
2023	55.6	11.1	0.0	22.2	3.0	1.0	0.0		
2024	55.6	19.7	0.2	38.9	1.3		0.0		
2025	61.1	21.9	0.1	22.2	24.8		0.0		
平年値	70.0	27.0	2.4	55.6	11.9	2.4	5.0	1.3	0.0

イネミズゾウムシ（普通期栽培）

年度	7 月上中旬			7 月下旬		
	圃場率	株率	成虫数	圃場率	株率	成虫数
2015	63.6	4.5		4.5	7.0	0.0
2016	22.7	7.8		27.3	2.2	0.0
2017	9.1	6.5		36.4	5.6	
2018	18.2	3.8		22.7	3.6	
2019	18.2	3.3		9.1	1.0	
2020	22.7	3.4		13.6	1.3	
2021	27.3	0.3		31.8	0.4	
2022	18.2	7.8	0.0	0.0		
2023	4.5	1.0		0.0		
2024	13.6	2.0		9.1	5.0	
2025	9.1	0.8		4.5	0.0	
平年値	21.8	4.0	0.0	15.5	3.3	0.0

(4) 麦類

① 主要病害虫の発生状況

麦類 3,090ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
うどんこ病	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	近年は少発生が続いている。
赤かび病	平年：並	平年：やや少	0ha	発生は認められなかった。	開花期頃は高温ではあるが寡雨で発生に好適な気象条件ではなかった。
さび病	平年：並	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	近年は少発生が続いている。

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実防除	延防除
麦類	3,090	うどんこ病	0	0	0	0	0	1,460	1,639
		赤かび病	0	0	0	0	0	1,983	2,168
		さび病	0	0	0	0	0	0	0

③ 調査成績

ア 巡回調査

うどんこ病 (はだか麦)

年度	3月中旬			4月上中旬			5月上中旬		
	圃場率	茎率	面積率	圃場率	茎率	面積率	圃場率	茎率	面積率
2015	0.0			0.0					
2016	0.0			0.0					
2017	0.0			0.0					
2018	0.0			0.0			0.0		
2019	0.0			0.0			0.0		
2020	0.0			0.0			0.0		
2021	0.0			0.0			0.0		
2022	0.0			0.0			0.0		
2023	0.0			0.0			0.0		
2024	0.0			0.0			0.0		
2025	0.0			0.0			0.0		
平年値	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－

うどんこ病 (小麦)

年度	3月中旬			4月上中旬			5月中下旬		
	圃場率	茎率	面積率	圃場率	茎率	面積率	圃場率	茎率	面積率
2015	0.0			0.0			0.0		
2016	0.0			0.0			0.0		
2017	0.0			0.0			0.0		
2018	0.0			0.0			0.0		
2019	0.0			0.0			0.0		
2020	0.0			0.0			0.0		
2021	0.0			0.0			0.0		
2022	0.0			0.0			0.0		
2023	0.0			0.0			0.0		
2024	0.0			0.0			0.0		
2025	0.0			0.0			0.0		
平年値	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－

赤かび病（はだか麦）

年度	4月上中旬		4月下旬		5月上中旬	
	圃場率	穂率	圃場率	穂率	圃場率	穂率
2015	0.0		0.0			
2016	0.0		0.0			
2017	0.0		0.0		0.0	
2018	0.0		0.0		0.0	
2019	0.0		0.0		0.0	
2020	0.0		0.0		0.0	
2021	0.0		0.0		0.0	
2022	0.0		0.0		0.0	
2023	0.0		0.0		0.0	
2024	0.0		0.0		0.0	
2025	0.0		0.0		0.0	
平年値	0.0	-	0.0	-	0.0	-

赤かび病（小麦）

年度	4月上中旬		4月下旬		5月上中旬		5月下旬	
	圃場率	穂率	圃場率	穂率	圃場率	穂率	圃場率	穂率
2015	0.0				0.0		14.3	0.8
2016	0.0		0.0		9.5	1.0	9.5	1.0
2017	0.0				14.3	0.3	14.3	0.3
2018	0.0				0.0		8.3	0.9
2019	0.0				0.0		0.0	
2020	0.0				0.0		0.0	
2021	0.0				0.0		0.0	
2022	0.0				0.0		0.0	
2023	0.0				0.0		4.2	0.1
2024	0.0						38.1	0.2
2025	0.0						0.0	
平年値	0.0	-	0.0	-	2.6	0.7	8.9	0.6

さび病（はだか麦）

年度	3月中旬			4月上中旬			5月上中旬		
	圃場率	茎率	面積率	圃場率	茎率	面積率	圃場率	茎率	面積率
2015									
2016									
2017									
2018	0.0			0.0			0.0		
2019	0.0			0.0			0.0		
2020	0.0			0.0			0.0		
2021	0.0			0.0			0.0		
2022	0.0			0.0			0.0		
2023	0.0			0.0			0.0		
2024	0.0			0.0			0.0		
2025	0.0			0.0			0.0		
平年値	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-

さび病（小麦）

年度	3月中旬			4月上中旬			5月中下旬		
	圃場率	茎率	面積率	圃場率	茎率	面積率	圃場率	茎率	面積率
2015									
2016									
2017									
2018	0.0			0.0			0.0		
2019	0.0			0.0			0.0		
2020	0.0			0.0			12.5	0.9	0.1
2021	0.0			0.0			0.0		
2022	0.0			0.0			0.0		
2023	0.0			0.0			0.0		
2024	0.0			0.0			0.0		
2025	0.0			0.0			0.0		
平年値	0.0	-	-	0.0	-	-	1.8	0.9	0.1

3) 果樹病害虫発生予察

(1) 定点調査（農試府中果樹研究所内）

① 県予察ほ場

ア. 作物名：カンキツ、カキ、モモ

イ. 生育状況調査：発芽期、緑化期、開花期、生理落果期、収穫期、その他

ウ. 害虫発生状況調査：主要病害虫の旬別発生消長及び被害発生状況

② 予察灯調査：100W高圧水銀灯 4月1日～11月30日、毎日、主要害虫誘殺数

③ フェロモントラップ：5種（ナシヒメシンクイ、コスカシバ、チャノコカクモンハマキ、モモシンクイガ、モモハモグリガ）、毎日の誘殺数

④ 気象観測：自記観測装置、最高・最低気温、湿度、降水量、日射量、風速他

(2) 巡回調査

作物名	調査地点	調査時期	ほ場数
カンキツ（うんしゅうミカン）	高松市鬼無町、坂出市青海町、三豊市仁尾町	3下、4下、5下、6下、7下、8下、9下、10下、11下	18
カキ	高松市香南町、綾川町千疋		12
モモ	丸亀市飯山町、三豊市高瀬町		12
ブドウ（シャインマスカット、ピオーネ）	高松市前田西町、綾川町（山田下、昭和、陶）、三豊市（高瀬町、三野町、豊中町）		18
キウイフルーツ	高松市（香南町、中山町）、善通寺市（吉原町、生野町、善通寺町）		12

3 果樹等作物病害虫発生予察事業

1) カンキツ

(1) 主要病害虫の発生状況

カンキツ 1,284ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
そうか病	平年：並	平年：少	20ha	葉、果実ともに生育期間中の発生量は少なかった。 発生時期は平年並であった。	5月上～中旬の低温、降雨。 適期防除の実施。
黒点病	平年：遅い	平年：少	214ha	葉、果実ともに生育期間中の発生量は少なかった。 発生時期は平年より遅かった。	9月上～中旬、10月下旬の降雨。 適期防除の実施。
かいよう病	平年：並	平年：並	30ha	葉、果実ともに生育期間中の発生量は少なかった。 発生時期は平年より遅かった。	6月の新梢へのハモグリガの発生。9月上～中旬の降雨。 適期防除の実施。
チャノキイロアザミウマ	平年：並	平年：並	15ha	生育期間中の発生量は平年並であった。 発生時期は平年並であった。	適期防除の実施。
ミカンハダニ	平年：早い	平年：やや多	428ha	発生量は、4、6月が多く、5月がやや多かった以外は平年並であった。 発生時期は平年より早かった。	4月、5月中旬、6月中～下旬の高温。

アブラムシ類	平年：やや遅い	平年：やや少	357ha	発生量は、平年よりやや少なかった。 発生時期は平年よりやや遅かった。	9月上～10月中旬の高温。
--------	---------	--------	-------	---------------------------------------	---------------

(2) 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実防除	延防除
カンキツ	1,284	そうか病	0	0	0	20	20	1,156	1,194
		黒点病	0	0	0	214	214	1,156	4,372
		かいよう病	0	0	0	30	30	155	539
		チャノキイロアザミウマ	0	0	0	15	15	1,156	1,284
		ミカンハダニ	71	143	71	143	428	1,156	5,008
		アブラムシ類	0	0	0	357	357	1,156	1,284

(3) カンキツ

① 主要病害虫の発生状況

カンキツ 1,284ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
そうか病	平年：並	平年：少	20ha	葉、果実ともに生育期間中の発生量は少なかった。 発生時期は平年並であった。	5月上～中旬の低温、降雨。 適期防除の実施。
黒点病	平年：遅い	平年：少	214ha	葉、果実ともに生育期間中の発生量は少なかった。 発生時期は平年より遅かった。	9月上～中旬、10月下旬の降雨。 適期防除の実施。
かいよう病	平年：並	平年：並	30ha	葉、果実ともに生育期間中の発生量は少なかった。 発生時期は平年より遅かった。	6月の新梢へのハモグリガの発生。9月上～中旬の降雨。 適期防除の実施。
チャノキイロアザミウマ	平年：並	平年：並	15ha	生育期間中の発生量は平年並であった。 発生時期は平年並であった。	適期防除の実施。
ミカンハダニ	平年：早い	平年：やや多	428ha	発生量は、4、6月が多く、5月がやや多かった以外は平年並であった。 発生時期は平年より早かった。	4月、5月中旬、6月中～下旬の高温。
アブラムシ類	平年：やや遅い	平年：やや少	357ha	発生量は、平年よりやや少なかった。 発生時期は平年よりやや遅かった。	9月上～10月中旬の高温。

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付 面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実 防除	延 防除
カンキツ	1,284	そうか病	0	0	0	20	20	1,156	1,194
		黒点病	0	0	0	214	214	1,156	4,372
		かいよう病	0	0	0	30	30	155	539
		チャノキイロアザミウマ	0	0	0	15	15	1,156	1,284
		ミカンハダニ	71	143	71	143	428	1,156	5,008
		アブラムシ類	0	0	0	357	357	1,156	1,284

③ 調査結果

ア 巡回調査

カンキツそうか病

発生圃場率（葉）

	4月	5月	6月	7月	8月
年度/月旬	下旬	下旬	中旬	中旬	下旬
2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	6.7	10.3	6.9	3.4
2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	0.0	0.7	1.0	1.0	0.7

発病葉率

4月	4月	5月	6月	7月	8月
年度/月旬	下旬	下旬	中旬	中旬	下旬
2015					
2016					
2017					
2018					
2019				1.0	
2020					1.0
2021					
2022		20.3	6.2	2.0	2.0
2023					
2024					
2025					
平年値	0.0	20.3	6.2	1.5	1.5

カンキツ黒点病

発生圃場率（新葉または当年葉）

	5月	6月	7月	8月	9月
年度/月旬	下旬	中旬	中旬	下旬	下旬
2015	0.0	3.7	10.0	10.0	23.3
2016	0.0	3.3	30.0	30.0	23.3
2017	0.0	0.0	3.3	0.0	3.3
2018	0.0	6.7	23.3	36.7	46.7
2019	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0
2020	0.0	0.0	10.0	6.7	3.3
2021	0.0	0.0	10.0	6.7	10.0
2022	0.0	0.0	0.0	3.4	6.9
2023	0.0	0.0	0.0	11.1	5.6
2024	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	0.0	1.4	8.7	12.3	12.8

被害葉率

	5月	6月	7月	8月	9月
年度/月旬	下旬	中旬	中旬	下旬	下旬
2015		2.0	4.0	2.0	5.9
2016		2.0	5.0	6.9	9.9
2017			1.0		2.0
2018		3.5	1.4	9.5	6.3
2019				4.3	
2020			0.7	1.0	1.0
2021			34.3	28.5	11.0
2022				1.0	2.5
2023				1.0	7.0
2024				0.5	1.0
2025					
平年値	0.0	2.5	7.7	6.1	5.2

カンキツそうか病

発生圃場率（果実）

	6月	7月	8月	9月	10月	11月
年度/月旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015	0.0	17.9	3.6	0.0	0.0	0.0
2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0
2018	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
2020	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0
2021	0.0	16.7	17.2	0.0	4.2	0.0
2022	10.3	7.1	10.7	7.1	3.8	11.1
2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	1.0	5.2	3.5	1.4	0.8	1.1

発病果率

	6月	7月	8月	9月	10月	11月
年度/月旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015		1.8	2.0			
2016						
2017		1.0		1.0		
2018		1.0				
2019			1.0			
2020		0.1		1.0		
2021		1.5	2.0		0.1	
2022	2.4	10.0	6.7	6.0	3.0	1.0
2023						
2024						
2025						
平年値	2.4	2.6	2.9	2.7	1.6	1.0

カンキツ黒点病

発生圃場率（果実）

	6月	7月	8月	9月	10月	11月
年度/月旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015	0.0	3.6	46.4	96.4	81.5	69.2
2016	0.0	13.3	60.0	70.0	88.5	75.0
2017	0.0	0.0	10.0	10.0	27.3	87.5
2018	0.0	10.0	73.3	80.0	79.2	83.3
2019	0.0	0.0	36.7	75.9	83.3	73.3
2020	0.0	23.3	36.7	53.3	57.7	71.4
2021	3.3	10.0	6.9	42.9	50.0	60.0
2022	0.0	0.0	7.1	14.3	38.5	22.2
2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
平年値	0.3	6.0	27.7	44.3	50.6	55.0

発病果率

	6月	7月	8月	9月	10月	11月
年度/月旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015		5.0	19.5	21.3	41.8	42.7
2016		2.8	14.2	29.1	37.6	53.2
2017			6.0	6.3	13.2	24.9
2018		2.0	15.5	17.9	22.3	38.0
2019			30.2	15.2	10.8	22.9
2020		1.9	16.2	18.7	9.8	7.2
2021	0.1	34.0	20.0	23.0	14.9	25.5
2022			8.5	10.0	18.3	38.5
2023						
2024						0.1
2025						1.0
平年値	0.1	9.1	16.2	17.7	21.1	28.1

カンキツかいよう病

発生圃場率 (薬)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
年度/月旬		下旬	下旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
2016		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0
2022		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3
発病葉率		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
年度/月旬		下旬	下旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015								1.0	1.0
2016									
2017									
2018									
2019									
2020									
2021							0.1		
2022									
2023									
2024									
2025									
平年値		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0

カンキツ・チャノキイロアザミウマ

発生圃場率 (被害果率)		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
年度/月旬		下旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021		0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値		0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
少-やや少		0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
やや少-並		0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
並-やや多		0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
やや多-多		0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

被害果率

年度/月旬	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
	下旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015							
2016							
2017							
2018							
2019							
2020							
2021		1.5					
2022							
2023							
2024							
2025							
平年値	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
少-やや少	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
やや少-並	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
並-やや多	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
やや多-多	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

カンキツかいよう病

発生圃場率 (果実)		6月	7月	8月	9月	10月	11月
年度/月旬		中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016		3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値		0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発病果率		6月	7月	8月	9月	10月	11月
年度/月旬		中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015							
2016		1.0					
2017							
2018							
2019							
2020							
2021							
2022							
2023							
2024							
2025							
平年値		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

カンキツ・チャノキイロアザミウマ

発生圃場率 (果実寄生)		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
年度/月旬		下旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
少-やや少		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
やや少-並		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
並-やや多		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
やや多-多		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

寄生果率

年度/月旬	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
	下旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015							
2016							
2017							
2018							
2019							
2020							
2021							
2022							
2023							
2024							
2025							
平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
少-やや少	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
やや少-並	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
並-やや多	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
やや多-多	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

カンキツ・ミカンハダニ
発生圃場率 (葉)

年度/月旬	4月 下旬	5月 下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	6.7	6.7	39.3	26.7	33.3	6.7	10.0	26.7
2016	10.0	10.0	40.0	20.0	20.0	3.3	0.0	6.7
2017	0.0	3.3	10.0	10.0	3.3	0.0	20.0	0.0
2018	6.7	10.0	6.7	13.3	3.3	3.3	3.3	6.7
2019	13.3	26.7	33.3	30.0	16.7	6.7	10.7	6.7
2020	10.0	0.0	20.0	13.3	3.3	3.3	3.3	6.7
2021	10.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	6.7	0.0
2022	0.0	0.0	24.1	20.7	3.4	10.3	13.8	20.7
2023	22.2	27.8	22.2	0.0	0.0	5.6	5.6	11.1
2024	16.7	5.6	16.7	11.1	0.0	16.7	11.1	44.4
2025	33.3	16.7	33.3	22.2	22.2	0.0	5.6	11.1
平年値	9.6	9.0	21.2	15.2	8.3	5.6	8.5	13.0

寄生葉率

年度/月旬	4月 下旬	5月 下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	8.5	20.5	3.0	2.6	32.4	5.0	3.3	2.5
2016	3.7	14.0	7.0	2.7	9.5	2.0		9.0
2017		22.0	27.0	7.7	2.0		10.0	
2018	27.0	5.3	1.0	16.0	1.0	1.0	1.0	17.0
2019	40.5	45.3	19.6	5.2	3.1	2.0	2.3	2.0
2020	7.0		2.5	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
2021	2.0			1.5			0.1	
2022			23.6	16.0	25.0	34.3	4.0	1.7
2023	12.0	3.3	4.0			7.0	2.0	10.0
2024	7.3	1.0	27.0	25.0		2.0	75.0	13.5
2025	53.3	26.3	24.5	1.8	2.3		0.1	2.0
平年値	13.5	15.9	12.7	8.6	10.6	6.8	11.1	7.1

カンキツ・ミカンハダニ
発生圃場率 (果実)

年度/月旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	3.7	0.0	14.3	3.6	0.0	0.0
2016	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
2017	3.3	0.0	3.3	0.0	13.6	0.0
2018	0.0	0.0	3.3	6.7	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	13.3	3.4	0.0	0.0
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	3.4	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2023	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	1.0	0.4	3.8	1.9	1.9	0.0

寄生果率

年度/月旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	95.0		17.8	1.0		
2016			40.0			
2017	100.0		1.0		3.7	
2018			3.0	1.0		
2019			2.0	1.0		
2020						
2021						
2022	30	10.0				
2023				1.0		
2024					50.0	
2025						
平年値	75.0	10.0	12.8	1.0	26.8	0.0

カンキツ・アブラムシ類
発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	5月 下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	3.3	23.3	12.0	4.8	42.3	36.4	0.0	0.0
2016	0.0	6.7	3.3	0.0	3.8	69.0	0.0	
2017	23.3	36.7	10.0	0.0	26.3	13.6	0.0	
2018	3.3	20.0	20.0	4.2	23.3	25.0	0.0	0.0
2019	40.0	20.0	3.3	0.0	21.4	36.4		0.0
2020	13.3	23.3	26.7	10.3	23.8	47.6	46.2	0.0
2021	20.0	16.7	3.6	20.0	50.0	56.7	0.0	0.0
2022	23.3	0.0	3.4	6.9	14.3	33.3	0.0	0.0
2023	11.1	44.4	5.6	5.6	11.1	27.8	0.0	0.0
2024	16.7	0.0	5.6	0.0	0.0	33.3	16.7	0.0
2025		5.6	0.0	0.0	16.7	27.8	5.6	
平年値	15.4	19.1	9.3	5.2	21.6	37.9	7.0	0.0

寄生新梢率

年度/月旬	4月 下旬	5月 下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	6.0	10.7	2.0	0.5	7.9	3.3		
2016		0.8	1.0		2.0	32.1		
2017	8.9	39.0	6.3		33.6	4.7		
2018	1.0	2.2	3.2	2.0	3.6	15.2		
2019	8.4	6.2	2.0		2.3	23.4		
2020	1.8	18.7	1.6	1.4	3.6	33.2	14.2	
2021	1.0	1.7	0.1	7.0	18.5	16.7		
2022	0.1		1.0	3.0	6.3	26.5		
2023	5.5	6.9	1.0	70.0	3.0	4.4		
2024	0.5		3.0			3.2	4.0	
2025		0.5			3.3	1.8	0.1	
平年値	3.7	10.8	2.1	14.0	9.0	16.3	9.1	0.0

イ 定点調査 (県予察圃場：府中果樹研究所)

月・旬		黒点病		そうか病		ミカンハダニ				アブラムシ類	
		発病果率		発病果率		寄生葉率 (雌成虫)		雌成虫数 (個体数/10葉)		寄生葉率	
		2025	平年値	2025	平年値	2025	平年値	2025	平年値	2025	平年値
4月	中旬					0.7	0.5	0.1	0.1		
	下旬					4.7	1.0	0.5	0.1	0.0	2.2
5月	上旬					3.3	0.9	0.3	0.1	0.3	6.3
	中旬					7.3	3.9	0.7	1.7	7.3	10.9
	下旬					5.3	3.4	0.6	1.5	2.7	13.5
6月	上旬					8.0	4.0	1.2	2.0	0.8	13.2
	中旬					40.0	4.8	3.5	2.9	5.6	11.1
	下旬	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	6.2	1.7	1.8	1.8	8.8
7月	上旬	0.0	0.3	0.0	0.7	15.3	8.3	1.9	4.0	0.0	8.8
	中旬	0.0	0.7	0.0	1.6	22.7	7.9	2.9	2.0	0.0	4.6
	下旬	0.5	2.2	1.0	2.7	54.7	10.1	5.6	2.2	5.0	3.5
8月	上旬	1.5	6.9	1.0	2.8	48.0	12.4	6.4	2.6	29.0	4.8
	中旬	1.5	9.6	0.5	3.1	27.3	11.4	3.0	2.5	21.1	3.2
	下旬	1.5	11.3	0.5	3.3	23.7	10.5	2.4	3.9	5.3	5.3
9月	上旬	1.5	13.5	0.0	3.2	3.7	12.7	0.4	1.9	16.1	14.1
	中旬	1.5	18.0	0.0	4.3	2.0	7.8	0.2	2.0	21.0	20.0
	下旬	6.0	21.5	0.0	2.3	3.0	3.3	0.3	1.1	55.3	18.4
10月	上旬	6.5	23.9	0.0	2.3	0.3	2.9	0.1	0.9	59.3	11.0
	中旬	6.0	29.3	0.0	1.7	6.0	1.7	0.6	0.9	14.5	6.0
	下旬	6.0	41.9	0.0	1.3	0.0	2.0	0.0	0.6	17.2	4.9

(4) カ キ

① 主要病害虫の発生状況

カ キ 132ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
炭疽病	平年：早い	平年：並	55ha	新梢では平年より早い6月、果実では平年並の9月下旬に発生を認めた。 発生量は平年並であった。	6月上～中旬の降雨。 9月上～中旬の降雨。 適期防除の実施。
カキノヘタムシガ	平年：並	平年：やや少	0ha	発生時期は平年同様5月に発生したが、被害は認められなかった。	適期防除の実施。
フジコナカイガラムシ	平年：並	平年：並	77ha	発生時期は平年並であり、生育期間中の発生量は平年並であった。	粗皮削りと適期防除の実施。
チャノキイロアザミウマ	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	近年、主産地では発生自体が少ない。
カキクダアザミウマ	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	近年、主産地では発生自体が少ない。
ハマキムシ類	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	適期防除の実施。

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実防除	延防除
カ キ	132	炭疽病	0	0	0	22	22	119	921
		カキノヘタムシガ (カキミガ)	0	0	0	0	0	119	607
		フジコナカイガラムシ	0	0	0	77	88	92	528
		チャノキイロアザミウマ	0	0	0	0	0	119	238
		カキクダアザミウマ	0	0	0	0	0	119	238
		ハマキムシ類	0	0	0	0	0	119	356

③ 調査結果

ア 巡回調査

カキ炭疽病

発生圃場率（新梢）

年度/月旬	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
	下旬	中下旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2016	0.0	0.0	0.0	33.3	22.2	0.0	0.0	
2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0
2021	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	16.7	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
2023	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	0.0	0.0	0.0	5.3	3.3	2.2	1.1	0.7

発病新梢率

年度/月旬	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
	下旬	中下旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015								
2016				7.0	1.4			
2017								
2018								
2019								
2020							1.0	
2021				0.5	1.0	3.7		
2022				2.0	2.0	6.0	1.0	1.0
2023				0.1				
2024								
2025			1.0					
平年値	0.0	0.0	0.0	2.4	1.5	4.8	1.0	1.0

カキ・カキノヘタムシガ

発生圃場率（芽）

年度/月旬	5月	6月	7月	8月	9月
	中下旬	中旬	中旬	下旬	下旬
2015		0.0	0.0	0.0	0.0
2016	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0
2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1

被害芽率

年度/月旬	5月	6月	7月	8月	9月
	中下旬	中旬	中旬	下旬	下旬
2015					
2016			1.0		
2017					
2018					
2019					1.0
2020					
2021					
2022					0.5
2023					
2024					
2025					
平年値	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8

カキ炭疽病

発生圃場率（果実）

年度/月旬	6月	7月	8月	9月	10月	11月
	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015	0.0	0.0	22.2	72.2	88.9	
2016	0.0	16.7	11.1	61.1	94.4	
2017	0.0	0.0	0.0	33.3	16.7	0.0
2018	0.0	0.0	0.0	16.7	5.6	0.0
2019	0.0	0.0	0.0	27.8	5.6	6.7
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
2021	0.0	0.0	22.2	83.3	83.3	44.4
2022	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	10.0
2023	0.0	0.0	0.0	33.3	75.0	33.3
2024	0.0	16.7	0.0	8.3	58.3	42.9
2025	0.0	0.0	0.0	8.3	41.7	8.3
平年値	0.0	3.3	5.6	33.6	45.9	17.2

発病果率

年度/月旬	6月	7月	8月	9月	10月	11月
	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015			1.0	5.9	7.0	
2016		2.7	1.0	1.7	7.1	
2017				1.2	1.3	
2018				1.0	13.0	
2019				1.0	1.0	1.0
2020					0.8	
2021			1.3	5.0	2.1	2.0
2022					5.0	1.0
2023				2.3	1.4	1.8
2024		0.8		1.0	3.6	1.8
2025				1.0	2.1	2.0
平年値	0.0	1.7	1.1	2.4	4.2	1.5

カキ・カキノヘタムシガ

発生圃場率（果実）

年度/月旬	6月	7月	8月	9月	10月	11月
	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015	16.7	11.1	16.7	38.9	22.2	
2016	5.6	5.6	16.7	66.7	22.2	
2017	0.0	0.0	22.2	33.3	11.1	0.0
2018	5.6	0.0	27.8	38.9	16.7	0.0
2019	0.0	11.1	33.3	44.4	27.8	0.0
2020	22.2	5.6	12.5	11.8	0.0	0.0
2021	16.7	0.0	11.1	11.8	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	11.8	6.3	0.0	0.0
2023	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	7.5	3.3	15.2	25.2	10.0	0.0

被害果率

年度/月旬	6月	7月	8月	9月	10月	11月
	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬	下旬
2015	1.0	1.0	1.7	3.4	3.0	
2016	1.0	1.0	2.0	1.7	1.3	
2017			1.5	1.3	1.5	
2018	1.0		2.6	2.6	1.0	
2019		2.0	1.3	2.5	1.4	
2020	1.3	1.0	1.0	1.5		
2021	1.0		1.5	4.0		
2022			6.5	1.0		
2023	1.0					
2024						
2025						
平年値	1.0	1.3	2.3	2.3	1.6	0.0

カキ・フジコナカイガラムシ
発生圃場率（枝）

年度/月旬	4月 下旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	0.0	11.1	5.6	11.1	0.0	5.6	5.6	
2016	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	
2017	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0
2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0
2020	0.0	0.0	0.0	11.1	11.8	5.9	5.9	20.0
2021	23.5	38.9	5.6	27.8	5.6	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	5.6	11.1	11.1	22.2	22.2	0.0
2023	58.3	0.0	0.0	25.0	8.3	0.0	16.7	0.0
2024	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	8.7	5.8	1.7	9.2	4.2	3.9	6.7	2.5

寄生枝率

年度/月旬	4月 下旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015		1.0	0.5	1.5		1.0	1.0	
2016				1.0	1.0			
2017	3.0						1.0	
2018								
2019						1.0		
2020				1.5	1.0	3.0	2.0	1.5
2021	2.0	3.2	0.5	1.0	1.0			
2022			0.1	0.3	10.5	1.8	2.3	
2023	3.3			1.3	1.0		3.0	
2024		1.0						
2025				2.0				
平年値	2.8	1.7	0.4	1.1	2.9	1.7	1.9	1.5

カキ・フジコナカイガラムシ
発生圃場率（果実）

年度/月旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	5.6	33.3	38.9	38.9	33.3	33.3	
2016	0.0	22.2	5.6	16.7	33.3	33.3	
2017	0.0	0.0	0.0	16.7	27.8	33.3	33.3
2018		5.6	33.3	38.9	16.7	16.7	0.0
2019	0.0	5.6	0.0	16.7	16.7	11.1	6.7
2020	0.0	5.6	16.7	43.8	52.9	57.1	66.7
2021	33.3	38.9	44.4	61.1	58.8	61.1	33.3
2022	16.7	22.2	52.9	76.5	62.5	75.0	100.0
2023	41.7	25.0	91.7	66.7	83.3	58.3	66.7
2024		0.0	25.0	41.7	66.7	41.7	28.6
2025		16.7	58.3	41.7	50.0	25.0	33.3
平年値	12.2	15.8	30.8	41.7	45.2	42.1	41.9

寄生果率

年度/月旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	0.5	0.9	2.1	1.9	2.8	4.2	
2016		1.2	4.0	3.0	1.3	1.5	
2017				1.7	1.4	1.5	1.0
2018		1.0	2.3	4.3	4.0	1.7	
2019		0.5		1.7	1.0	1.5	1.0
2020		2.0	3.3	19.7	31.8	20.1	52.8
2021	26.8	14.4	22.5	19.5	7.5	1.4	7.3
2022	2.3	2.1	12.1	24.8	37.3	26.4	43.1
2023	1.8	4.3	7.1	7.1	5.5	7.3	6.6
2024			1.2	1.8	2.4	0.9	2.5
2025		2.5	3.0	3.2	5.3	1.3	2.5
平年値	7.8	3.3	6.8	8.6	9.5	6.6	16.3

カキ・チャノキイロアザミウマ
発生圃場率

年度/月旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0
2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0

被害果率

年度/月旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015						
2016						
2017						
2018						
2019						
2020						
2021						
2022				1.0		
2023						
2024						
2025						
平年値	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0

カキ・カキクダアザミウマ
発生圃場率 (葉)

年度/月旬	4月 下旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2017	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
少-やや少	-1.6	0.0	0.0	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0
やや少-並	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0
並-やや多	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
やや多-多	2.7	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0

被害葉率

年度/月旬	4月 下旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	1.0							
2016								
2017					1.0			
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								
2023								
2024								
2025								
平年値	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
少-やや少	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
やや少-並	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
並-やや多	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
やや多-多	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0

カキ・ハマキムシ類
発生圃場率 (葉)

年度/月旬	4月 下旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0		0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0

葉巻率

年度/月旬	4月 下旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020				1.0				
2021								
2022								
2023								
2024								
2025	1.0							
平年値	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

カキ・カキクダアザミウマ
発生圃場率 (果実)

年度/月旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	
2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0
2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	0.0	0.0	1.1	0.0	0.6	0.0
少-やや少	0.0	0.0	-3.2	0.0	-1.8	0.0
やや少-並	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.4	0.0
並-やや多	0.0	0.0	2.9	0.0	1.6	0.0
やや多-多	0.0	0.0	5.4	0.0	3.0	0.0

被害果率

年度/月旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015			2.5			
2016						
2017						
2018						
2019						
2020						
2021						
2022					1.0	
2023						
2024						
2025						
平年値	0.0	0.0	2.5	0.0	1.0	0.0
少-やや少	0.0	0.0	1.5	0.0	0.6	0.0
やや少-並	0.0	0.0	2.1	0.0	0.8	0.0
並-やや多	0.0	0.0	2.9	0.0	1.2	0.0
やや多-多	0.0	0.0	3.5	0.0	1.4	0.0

カキ・ハマキムシ類
発生圃場率 (果実)

年度/月旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015						
2016						
2017						
2018	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020	5.6	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	0.8	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0

発病果率

年度/月旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015						
2016						
2017						
2018				2.0		
2019						
2020	1.0		1.0			
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
平年値	1.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0

イ 定点調査（県予察圃場：府中果樹研究所）

月・旬		炭疽病		カキノヘタムシガ			
		発病果率		被害芽率		被害果率	
		2025	平年値	2025	平年値	2025	平年値
5月	下旬			0.0	0.0	0.0	0.0
	上旬			0.0	0.1	0.0	0.1
6月	中旬			0.0	0.7	1.3	1.0
	下旬			0.3	0.9	12.5	5.3
	上旬	0.0	0.1	0.0	0.9	5.3	8.7
7月	中旬	0.0	0.6	0.0	0.5	4.3	9.7
	下旬	0.0	0.7	0.0	0.3	2.4	8.6
	上旬	0.0	0.6	0.0	0.4	2.9	6.1
8月	中旬	0.0	0.6	0.0	0.7	2.9	6.6
	下旬	0.0	1.6	0.0	0.1	3.2	10.3
	上旬	0.0	3.2	0.0	1.2	6.4	15.8
9月	中旬	0.0	5.9	0.0	1.1	5.1	15.3
	下旬	0.0	9.4	0.0	0.8	4.1	16.6
	上旬	0.0	11.8	0.0	0.7	1.5	15.4
10月	中旬	－	8.6	0.0	0.7	1.0	7.5
	下旬	－	9.0	－	－	0.8	4.5

(5) モ モ

① 主要病害虫の発生状況

モ モ 173ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
せん孔細菌病	平年：並	平年：並	173ha	発生時期は葉において、平年並の4月下旬であった。発生量は4月～10月までやや少～平年並で推移した。果実では発生が見られなかった。	6月～7月の少雨。
ナシヒメシンクイ	平年：並	平年：多い	173ha	発生時期は、新梢において、平年並の6月であった。発生量は7月～10月までやや多～多で推移した。	6～10月の高温。
モモシンクイガ	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	近年、主要産地では発生自体が少ない。
モモノゴマダラノメイガ	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	適期防除の実施。
ハダニ類	平年：並	平年：並	71ha	発生時期は平年並の5月であった。発生量は6月に多発生し、7月～10月はやや少～並で推移した。	6月の高温。 適期防除の実施。

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実防除	延防除
モモ	173	せん孔細菌病	0	29	86	58	173	171	645
		ナシヒメシンクイ	159	0	14	0	173	171	677
		モモシンクイガ	0	0	0	0	0	171	677
		モモノゴマダラノメイガ	0	0	0	0	0	171	677
		ハダニ類	0	14	14	43	71	52	78

③ 調査結果

ア 巡回調査

モモせん孔細菌病

発生圃場率

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
年度/月旬	下旬	中下旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬
2015	50.0	88.9	94.4	94.4	100.0	100.0	100.0
2016	55.6	94.4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2017	16.7	88.9	83.3	72.2	100.0	72.2	77.8
2018	77.8	94.4	100.0	94.4	94.4	94.4	
2019	72.2	94.4	77.8	94.4	94.4	94.4	100.0
2020	55.6	100.0	100.0	100.0	100.0	94.4	50.0
2021	83.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2022	55.6	94.4	100.0	100.0	100.0	94.4	100.0
2023	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2024	50.0	91.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2025	91.7	83.3	91.7	100.0	100.0	100.0	100.0
平年値	61.7	94.7	95.6	95.6	98.9	95.0	92.0

発病葉率

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
年度/月旬	下旬	中下旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬
2015	2.9	6.0	7.1	11.8	64.8	86.5	98.2
2016	1.3	4.2	15.1	30.3	36.4	52.1	72.2
2017	0.5	2.7	5.3	7.1	16.0	18.8	34.1
2018	5.1	6.6	9.3	6.1	11.0	21.9	
2019	1.1	2.9	2.9	4.2	11.5	13.7	14.8
2020	1.2	9.4	8.1	7.1	8.2	13.1	7.3
2021	5.6	13.7	11.5	8.8	20.6	21.1	22.7
2022	7.5	11.8	7.5	9.0	13.0	10.8	16.4
2023	5.4	6.6	6.5	10.3	13.8	16.8	9.5
2024	2.4	8.5	7.8	8.8	8.5	11.3	17.4
2025	3.0	4.7	8.9	12.6	13.3	18.5	9.3
平年値	3.3	7.2	8.1	10.3	20.4	26.6	32.5

モモ・ナシヒメシンクイ

発生圃場率（芯折れ被害）9月以降は食害痕を見分けにくい

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
年度/月旬	下旬	中下旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬
2015	0.0	0.0	55.6	50.0	66.7	55.6	55.6
2016	0.0	0.0	23.5	70.6	100.0	94.1	25.0
2017	0.0	0.0	22.2	61.1	100.0	61.1	0.0
2018	0.0	11.1	44.4	83.3	100.0	61.1	0.0
2019	0.0	5.6	16.7	38.9	77.8	100.0	94.4
2020	0.0	0.0	38.9	55.6	88.9	80.0	91.7
2021	0.0	0.0	22.2	66.7	77.8	100.0	83.3
2022	0.0	5.6	11.1	83.3	100.0	83.3	77.8
2023	8.3	8.3	33.3	75.0	90.9	100.0	100.0
2024	0.0	33.3	16.7	91.7	100.0	100.0	100.0
2025	0.0	0.0	50.0	100.0	100.0	100.0	100.0
平年値	0.8	6.4	28.5	67.6	90.2	83.5	62.8

芯折れ率

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
年度/月旬	下旬	中下旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬
2015			10.0	11.9	21.0	13.4	9.5
2016			10.3	13.0	32.8	15.4	16.8
2017			3.8	10.4	33.3	13.3	
2018		2.5	3.0	3.2	18.7	12.8	
2019		1.0	1.7	1.9	12.0	27.4	11.2
2020			1.4	1.6	20.5	15.9	7.3
2021			1.8	3.8	16.9	14.2	11.3
2022		0.5	4.0	5.8	21.9	11.8	13.1
2023	3.0	0.1	3.0	9.0	15.8	19.5	19.9
2024		1.0	1.6	14.0	22.5	18.5	20.4
2025			1.1	19.7	30.4	27.7	16.5
平年値	3.0	1.0	4.0	7.5	21.5	16.2	13.7

モモせん孔細菌病

発生圃場率（果実）

	5月	6月	7月
年度/月旬	中下旬	中旬	中旬
2015	0.0	33.3	16.7
2016	0.0	16.7	25.0
2017	0.0	0.0	16.7
2018	5.6	5.6	6.3
2019	0.0	0.0	8.3
2020	0.0	0.0	13.3
2021	0.0	0.0	25.0
2022	0.0	0.0	0.0
2023	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	
2025	0.0	0.0	
平年値	0.6	5.6	12.4

発病果率

	5月	6月	7月
年度/月旬	中下旬	中旬	中旬
2015		1.0	1.0
2016		0.5	1.0
2017			1.0
2018	1.0	1.0	1.0
2019			1.0
2020			1.0
2021			1.0
2022			
2023			
2024			
2025			
平年値	1.0	0.8	1.0

モモ・モモシンクイガ

発生圃場率			
	5月	6月	7月
年度/月旬	中下旬	中旬	中旬
2015	0.0	0.0	0.0
2016	0.0	0.0	0.0
2017	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	0.0
2020	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0
2023	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	
2025	0.0	0.0	
平年値	0.0	0.0	0.0

被害果率			
	5月	6月	7月
年度/月旬	中下旬	中旬	中旬
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
平年値	0.0	0.0	0.0

モモ・モモノゴマダラノメイガ

発生圃場率			
	5月	6月	7月
年度/月旬	中下旬	中旬	中旬
2015	0	0.0	16.7
2016	0.0	16.7	12.5
2017	0.0	0.0	0.0
2018		0.0	0.0
2019	0.0	0.0	8.3
2020	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0
2023	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	
2025	0.0	0.0	
平年値	0.0	1.7	4.2

被害果率			
	5月	6月	7月
年度/月旬	中下旬	中旬	中旬
2015			1.0
2016		1.0	1.0
2017			
2018			
2019			1.0
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
平年値	0.0	1.0	1.0

モモ・ハダニ類

発生圃場率							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
年度/月旬	下旬	中下旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬
2015	0.0	0.0	50.0	100.0	44.4	5.6	0.0
2016	0.0	0.0	35.3	88.2	52.9	0.0	0.0
2017	0.0	0.0	22.2	66.7	11.1	5.6	11.1
2018	0.0	0.0	11.1	38.9	5.6	0.0	
2019	0.0	0.0	11.1	50.0	27.8	5.6	5.6
2020	0.0	0.0	38.9	33.3	33.3	22.2	0.0
2021	5.6	0.0	0.0	27.8	16.7	11.1	0.0
2022	0.0	0.0	38.9	94.4	55.6	22.2	16.7
2023	8.3	8.3	33.3	83.3	27.3	54.5	27.3
2024	0.0	0.0	25.0	66.7	25.0	8.3	8.3
2025	0.0	8.3	41.7	66.7	41.7	0.0	0.0
平年値	1.4	0.8	26.6	64.9	30.0	13.5	7.7

寄生葉率							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
年度/月旬	下旬	中下旬	中旬	中旬	下旬	下旬	下旬
2015			17.6	37.1	16.1	2.0	
2016			5.3	44.7	16.9		
2017			11.0	45.8	26.5	12.0	6.0
2018			1.0	33.1	3.0		
2019			6.0	6.0	5.2	1.0	2.0
2020			9.4	14.2	16.3	12.1	
2021	1.0			20.2	8.7	1.5	
2022			4.1	52.9	18.1	8.0	12.3
2023	0.1	6.0	21.3	29.9	3.0	4.7	18.3
2024			7.7	17.9	2.5	1.0	1.0
2025		0.5	16.8	21.6	2.8		
平年値	0.6	6.0	9.3	30.2	11.6	5.3	7.9

イ 定点調査（県予察圃場：府中果樹研究所）

月・旬		せん孔細菌病		ナシヒメシンクイ		ハダニ類			
		発病葉率		芯折れ率		寄生葉率		雌成虫数 (個体数/100葉)	
		2025	平年値	2025	平年値	2025	平年値	2025	平年値
4月	中旬	1.0	2.0	0.0	0.0				
	下旬	6.0	6.5	0.0	0.1				
5月	上旬	9.3	12.3	3.7	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	中旬	13.0	19.0	7.7	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	下旬	14.3	24.7	5.7	7.3	0.3	0.1	0.3	0.1
6月	上旬	11.0	25.0	4.3	8.4	0.0	0.1	0.0	0.2
	中旬	22.0	22.4	20.0	24.2	0.0	0.3	0.0	0.5
	下旬	24.7	28.4	39.3	29.7	0.0	0.3	0.0	0.5
7月	上旬	24.3	32.8	34.3	31.0	0.0	0.8	0.0	1.3
	中旬	16.0	36.3	45.7	33.8	18.0	0.8	97.7	1.6
	下旬	13.3	41.9	36.0	36.1	61.3	1.8	38.3	3.4
8月	上旬	18.3	47.5	59.3	35.1	72.0	2.2	330.0	4.9
	中旬	14.7	44.7	48.7	34.2	29.3	4.2	117.0	38.4
	下旬	10.3	47.7	54.7	37.9	11.0	3.3	153.3	97.3
9月	上旬	16.3	51.7	58.0	39.0	4.3	1.7	1.0	2.5
	中旬	10.7	56.6	59.0	34.6	4.0	1.0	5.0	1.4
	下旬	20.0	58.2	63.7	31.3	2.0	0.6	3.0	0.9
10月	上旬	29.0	63.1	16.0	28.2	51.7	0.0	45.3	0.1
	中旬	29.7	62.9	19.7	11.6	71.3	0.6	26.3	1.0
	下旬	20.7	55.7	3.3	7.5	79.0	0.3	42.0	0.4

(6) ブドウ

① 主要病害虫の発生状況

ブドウ 131ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
晩腐病	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	適期防除の実施。
べと病	平年：並	平年：やや少	30ha	発生時期は平年同様に6月に葉で発生を認めた。発生量は6月～9月にかけてやや少～平年並で推移した。	6月～7月の少雨。
灰色かび病	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	適期防除の実施。
アザミウマ類	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	適期防除の実施。

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実防除	延防除
ブドウ	131	晩腐病	0	0	0	0	0	130	358
		べと病	0	0	15	15	30	130	726
		灰色かび病	0	0	0	0	0	130	182
		アザミウマ類	0	0	0	0	0	118	472

③ 調査結果

ア 巡回調査

ピオーネ(トンネル)晩腐病

発生圃場率

年度/月旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬
	2003	2004	2004
2003	0.0	0.0	0.0
2004	0.0	0.0	0.0
2017	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	16.7	
2019	0.0	0.0	
2020	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0
2023	0.0	0.0	0.0
2024	0.0		
2025	0.0		
平年値	0.0	1.9	0.0

発病房率

年度/月旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬
	2003	2004	2004
2003			
2004			
2017			
2018		25.0	
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
平年値	0.0	25.0	0.0

ピオーネ(トンネル)べと病
発生圃場率(葉)

年度/月旬	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	下旬	中下旬	中旬	中旬	下旬	下旬
2003	0.0	0.0	90.0	100.0	100.0	100.0
2004	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2017	0.0	0.0	16.7	16.7	0.0	83.3
2018	0.0	0.0	16.7	50.0	33.3	66.7
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
2020	0.0	0.0	0.0	16.7	33.3	83.3
2021	0.0	0.0	33.3	66.7	50.0	83.3
2022	0.0	0.0	66.7	66.7	16.7	83.3
2023	0.0	0.0	88.9	77.8	88.9	77.8
2024	0.0	0.0	55.6	77.8	66.7	66.7
2025	0.0	0.0	22.2	33.3	11.1	22.2
平年値	0.0	0.0	46.8	57.2	48.9	77.8

発病葉率

年度/月旬	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	下旬	中下旬	中旬	中旬	下旬	下旬
2003			5.8	25.0	66.8	69.5
2004			3.0	41.9	74.0	36.9
2017			0.1	5.0		14.2
2018			0.1	26.3	3.5	16.0
2019						7.5
2020				7.0	10.5	5.0
2021			2.5	21.8	19.0	3.1
2022			0.7	0.9	4.0	8.4
2023			6.8	17.6	11.8	3.9
2024			5.4	8.7	11.7	2.3
2025			8.0	0.8	0.5	5.0
平年値	0.0	0.0	3.0	17.1	25.2	16.7

ピオーネ(トンネル)べと病
発生圃場率(房)

年度/月旬	6月	7月	8月
	中旬	中旬	下旬
2003	0.0	0.0	0.0
2004	0.0	0.0	0.0
2017	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	0.0	
2019	0.0	0.0	
2020	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0
2023	0.0	0.0	0.0
2024	0.0		
2025	0.0		
平年値	0.0	0.0	0.0

発病房率

年度/月旬	6月	7月	8月
	中旬	中旬	下旬
2003			
2004			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
平年値	0.0	0.0	0.0

ピオーネ(トンネル)灰色かび病
発生圃場率

年度/月旬	5月	6月	7月	8月
	下旬	中旬	中旬	下旬
2003		0.0	0.0	0.0
2004		0.0	0.0	0.0
2017		0.0	0.0	0.0
2018	50.0	50.0	33.3	
2019	0.0	16.7	0.0	
2020	0.0	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	33.3	16.7	0.0
2022	0.0	0.0	0.0	0.0
2023		0.0	0.0	0.0
2024		0.0		
2025		0.0		
平年値	10.0	10.0	5.6	0.0

発病房率

年度/月旬	5月	6月	7月	8月
	下旬	中旬	中旬	下旬
2003				
2004				
2017				
2018	13.3	2.0	1.0	
2019		3.0		
2020				
2021		1.5	17.0	
2022				
2023				
2024				
2025				
平年値	13.3	2.2	9.0	0.0

ピオーネ(トンネル)・チャノキイロアザミウマ
発生圃場率

年度/月旬	6月	7月	8月
	中旬	中旬	下旬
2003	0.0	0.0	0.0
2004	0.0	0.0	0.0
2017	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	0.0	
2019	0.0	0.0	
2020	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0
2023	0.0	0.0	0.0
2024	0.0		
2025	0.0		
平年値	0.0	0.0	0.0

寄生房率

年度/月旬	6月	7月	8月
	中旬	中旬	下旬
2003			
2004			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
平年値	0.0	0.0	0.0

(7) キウイフルーツ

① 主要病害虫の発生状況

キウイフルーツ 57ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
かいよう病	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	適期防除の実施。

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付 面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実 防除	延 防除
キウイフルーツ	57	かいよう病	0	0	0	0	0	51	154

③ 調査結果

ア 巡回調査

キウイフルーツかいよう病
発生圃場率（新梢）

年度/月旬	4月 下旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								
2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

キウイフルーツかいよう病
発生圃場率（果実）

年度/月旬	4月 下旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								
2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024		0.0	0.0				0.0	0.0
2025			0.0			0.0	0.0	
平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

キウイフルーツかいよう病
発生圃場率（葉）

年度/月旬	4月 下旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								
2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

発病新梢率

年度/月旬	4月 下旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								
2023								
2024								
2025								
平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

発病果率

年度/月旬	4月 下旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								
2023								
2024								
2025								
平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

発病葉率

年度/月旬	4月 下旬	5月 中下旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								
2023								
2024								
2025								
平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(8) 果樹共通

① 主要病害虫の発生状況

果樹共通 1,720ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
カメムシ類	平年：遅い	平年：やや少	293ha	予察灯での誘殺開始時期は平年より遅く、発生量は4月から8月中旬まで平年値よりやや低く推移した。8月下旬以降は平年並で推移した。	前年秋期の発生量および1～2月の低温による越冬量の減少。

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実防除	延防除
果樹共通	1,720	カメムシ類	0	0	0	65	290	290	1,319

③ 調査結果

ア 巡回調査

カンキツ・カメムシ類
発生圃場率

年度/月旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015				
2016				
2017				
2018	0.0	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	0.0	0.0
2020	0.0	3.3	0.0	0.0
2021	0.0	0.0	16.7	0.0
2022	0.0	3.6	3.8	0.0
2023	0.0	0.0	5.6	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	0.0	1.0	3.7	0.0

被害果率

年度/月旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
2020		1.0		
2021			0.9	
2022		0.1	1.0	
2023			2.0	
2024				
2025				
平年値	0.0	0.6	1.3	0.0

カキ・カメムシ類
発生圃場率

年度/月旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	5.6	11.1	11.1	27.8	22.2	
2016	0.0	0.0	5.6	16.7	27.8	
2017	0.0	0.0	33.3	88.9	94.4	100.0
2018	0.0	0.0	55.6	94.4	94.4	85.7
2019	0.0	0.0	50.0	33.3	55.6	60.0
2020	0.0	27.8	18.8	35.3	25.0	33.3
2021	0.0	0.0	22.2	41.2	38.9	33.3
2022	0.0	11.8	47.1	75.0	81.3	80.0
2023	0.0	0.0	0.0	8.3	33.3	25.0
2024	0.0	66.7	83.3	91.7	75.0	100.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	0.6	11.7	32.7	51.3	54.8	64.7

被害果率

年度/月旬	6月 中旬	7月 中旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	1.0	1.0	1.0	6.0	11.0	
2016			2.0	3.0	7.4	
2017			3.8	10.4	15.9	8.2
2018			5.0	25.6	28.4	23.3
2019			1.8	27.8	22.9	3.3
2020		0.4	1.3	2.0	4.5	2.7
2021			1.5	2.0	3.0	3.7
2022		1.0	7.3	4.1	9.6	3.1
2023				1.0	1.5	1.7
2024		2.0	2.6	3.1	4.2	6.7
2025						
平年値	1.0	1.1	2.9	8.5	10.8	6.6

モモ・カメムシ類
発生圃場率

年度/月旬	5月	6月	7月
	中下旬	中旬	中旬
2015	0.0	0.0	16.7
2016	0.0	16.7	12.5
2017	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	0.0
2020	15.4	0.0	6.7
2021	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0
2023	0.0	0.0	0.0
2024	71.4	66.7	
2025	0.0	0.0	
平年値	8.7	8.3	4.0

被害果率

年度/月旬	5月	6月	7月
	中下旬	中旬	中旬
2015			1.0
2016		1.0	1.0
2017			
2018			
2019			
2020	1		0.5
2021			
2022			
2023			
2024	2.0	3.0	
2025			
平年値	1.5	2.0	0.8

ピオーネ(トシ)・カメムシ類
発生圃場率

年度/月旬	6月	7月	8月
	中旬	中旬	下旬
2003	0.0	0.0	0.0
2004	0.0	0.0	0.0
2017	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	0.0	
2019	0.0	0.0	0.0
2020	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0
2023	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0
平年値	0.0	0.0	0.0

被害房率

年度/月旬	6月	7月	8月
	中旬	中旬	下旬
2003			
2004			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
平年値	0.0	0.0	0.0

イ 定点調査

Ⅱの6. 主要害虫半旬別誘殺数 1) 高圧水銀灯 (2) 農業試験場府中果樹研究所を参照。

4) 野菜病虫害発生予察

(1) 定点調査

①県予察ほ場（農業試験場内）

作物名（作型）	品 種	栽培様式	調査期間
タマネギ（普通）	七宝早生	播種：9月下旬 定植：11月中旬	2月下旬～5月下旬

②高圧水銀灯：農試構内一主要害虫（水稻等害虫を含む）、4月1日～11月30日、毎日調査

③黄色水盤：農試県予察ほ場内一アブラムシ類、4月1日～3月31日、半旬毎

④フェロモントラップ

設置場所	対象害虫	調査期間
県予察ほ場（綾川町）	コナガ	4/1～3/31 半旬毎
	シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、タバコガ、フタオビコヤガ	4/16～12/15 半旬毎
	ハスモンヨトウ	4/16～12/15 半旬毎

(2) 巡回調査

作物・作型	調査地点	調査時期	ほ場数
キャベツ 夏まき栽培	三豊市高瀬町下麻	9下、10下、11下	6
アスパラガス 施設栽培	高松市（香南町岡、東植田町、川島東町）、三木町（上高岡、田中） 丸亀市岡田、観音寺市（大野原町、豊浜町）	4下、5下、6下、7下、8下、9下、10下	18
ブロッコリー（11-12月どり）	高松市円座町、綾川町牛川、多度津町山階、まんのう町吉野、観音寺市（木之郷町、大野原町）	9下、10下、11下	18
ブロッコリー（1-2月どり）	高松市円座町、綾川町牛川、多度津町山階、まんのう町吉野、観音寺市（木之郷町、大野原町）	11下、12下、1下、2下	18
ブロッコリー（4-5月どり）	坂出市高屋町、まんのう町吉野、三豊市豊中町比地大	3下、4下	18
冬レタス（12月どり）	善通寺市弘田町、観音寺市（木之郷町、大野原町）	10下、11下	18
冬レタス（1-2月どり）	丸亀市岡田、善通寺市弘田町、観音寺市（木之郷町、大野原町）	12下、1下	24
冬レタス（3-4月どり）	善通寺市弘田町、観音寺市（木之郷町、大野原町）	2下、3下	18
春レタス（5月どり）	観音寺市（木之郷町、大野原町）	3下、4下	12
青ネギ 露地栽培（夏秋どり）	東かがわ市（小海、白鳥）、善通寺市大麻町、観音寺市大野原町	5下、6下、7下、8下、9下、10下	18（各6）

タマネギ 早生栽培	三豊市詫間町	1 下、2 下、3 下	10
タマネギ 中晩生栽培	善通寺市吉原町、三豊市高瀬町上勝間、観音寺市大野原町	1 下、2 下、3 下、4 下	18
ニンニク 普通栽培	善通寺市榑梨町及び琴平町上榑梨、観音寺市流岡町	2 下、3 下、4 下	12
キュウリ 夏栽培	三木町（井戸、上高岡、田中）、綾川町（陶、東分、粉所東）、観音寺市豊浜町（和田、箕浦）	6 下、7 下	18
キュウリ 秋栽培	高松市牟礼町（牟礼、原）、観音寺市豊浜町（和田、箕浦）	8 下、9 下	12
イチゴ 促成栽培（育苗床）	さぬき市長尾町名、三木町（井戸、上高岡、田中）、綾川町（羽床下、滝宮）及び丸亀市（飯山町、垂水町）	4 下、5 下、6 下、7 下、8 下	12
イチゴ 促成栽培（本ぼ）	さぬき市長尾町名、三木町（井戸、上高岡、田中）、綾川町（羽床下、滝宮）及び丸亀市（飯山町、垂水町）	9 下、10 下、11 下、12 下、1 下、2 下、3 下、4 下	12
金時ニンジン	坂出市大屋富町、坂出市江尻町	9 下、10 下、11 下	12

（３） レタス

① 主要病害虫の発生状況

ア 春レタス 84ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
灰色かび病	平年：－	平年：やや少	0ha	発生は認められなかった。	防除の徹底。
菌核病	平年：－	平年：やや少	0ha	発生は認められなかった。	防除の徹底。
アブラムシ類	平年：－	平年：やや少	0ha	発生は認められなかった。	防除の徹底。
ヨトウガ	平年：－	平年：やや少	0ha	発生は認められなかった。	セルトレイでの灌漑処理の普及により、被害が減少している。

イ 冬レタス 635ha

灰色かび病	平年：－	平年：やや少	0ha	12 月どり栽培では平年と同様に発生は認められなかった。1～2 月どり栽培、3～4 月どり栽培では、ともに発生は認められなかった。	冬期が少雨傾向で経過した。
菌核病	平年：やや遅い	平年：やや少	23ha	12 月どり栽培では発生は認められなかった。1～2 月どり栽培では、平年よりやや遅い 12 月から発生し、発生量はやや少なく推移した。3～4 月どり栽培では発生は認められなかった。	冬期が少雨傾向で経過した。
アブラムシ類	平年：やや遅い	平年：並	111ha	12 月どり栽培では平年同様 10 月から発生し、発生量は多く推移した。1～2 月どり栽培では、平年よりやや遅い 12 月から発生し、平年並の発生量であった。3～4	セルトレイでの灌漑処理の普及により、被害が減少している。

				月どり栽培では発生は認められなかった。	
ハスモンヨトウ	平年：並	平年：多	14ha	12月どり栽培では10月に発生を認め多い発生量であったがその後の寄生は認められなかった。1～2月どり栽培、3～4月どり栽培ともに平年同様発生は認められなかった。	冬期が高温少雨傾向で経過した。
シロイチモジヨトウ	平年：並	平年：多	29ha	12月どり栽培で10月に発生を認め、発生量は多かったが、その後平年並の発生量で推移した。1～2月どり栽培、3～4月どり栽培ともに平年同様発生は認められなかった。	冬期が高温少雨傾向で経過した。
オオタバコガ	平年：やや遅い	平年：多	7ha	12月どり栽培では10月に発生を認め多い発生量であったがその後の寄生は認められなかった。1～2月どり栽培、3～4月どり栽培ともに平年同様発生は認められなかった。	冬期が高温少雨傾向で経過した。

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実防除	延防除
春レタス	84	灰色かび病	0	0	0	0	0	84	210
		菌核病	0	0	0	0	0	84	168
		アブラムシ類	0	0	0	0	0	84	109
		ヨトウガ	0	0	0	0	0	84	84
冬レタス	635	灰色かび病	0	0	0	0	0	635	1,905
		菌核病	0	0	0	23	23	635	1,905
		アブラムシ類	0	0	0	111	111	635	1,397
		ハスモンヨトウ	0	0	0	14	14	635	1,270
		シロイチモジヨトウ	0	0	0	29	29	635	1,270
		オオタバコガ	0	0	0	7	7	635	1,270

③ 調査結果

ア 巡回調査

レタス春どり栽培(5月どり)・灰色かび病

発生圃場率			発病株率	
年度/月旬	3月 下旬	4月 下旬	3月 下旬	4月 下旬
2015	42.9	22.2	5.3	7.5
2016	36.4	18.2	2.8	0.7
2017	33.3	50.0	4.8	2.0
2018	62.5	22.2	2.2	1.4
2019	44.4	33.3	3.5	1.8
2020	30.8	16.7	3.3	3.0
2021	16.7	9.1	0.5	5.0
2022	22.2	0.0	1.0	0.0
2023	0.0	-		
2024	22.2	0.0	0.1	
2025	0.0	0.0		
平年値	23.2	16.6	2.3	2.0

レタス春どり栽培(5月どり)・菌核病

発生圃場率			発病株率	
年度/月旬	3月 下旬	4月 下旬	3月 下旬	4月 下旬
2015	0.0	44.4		4.4
2016	9.1	18.2	0.1	3.0
2017	8.3	50.0	10.0	2.9
2018	31.3	11.1	2.8	0.7
2019	0.0	16.7		1.1
2020	0.0	16.7		1.0
2021	0.0	45.5		0.5
2022	11.1	0.0	0.1	0.0
2023	0.0	-		
2024	11.1	0.0	0.1	
2025	0.0	0.0		
平年値	7.1	17.6	2.6	1.3

レタス春どり栽培(5月どり)・アブラムシ

発生圃場率			発生株率	
年度/月旬	3月 下旬	4月 下旬	3月 下旬	4月 下旬
2015	0.0	44.4		2.3
2016	0.0	0.0		
2017	0.0	75.0		33.3
2018	0.0	11.1		4.0
2019	0.0	66.7		55.5
2020	0.0	0.0		
2021	8.3	9.1	8.0	8.0
2022	0.0	33.3		1.0
2023	0.0	-		
2024	0.0	33.3		4.0
2025	0.0	0.0		
平年値	0.8	25.4	8.0	17.6

レタス春どり栽培(5月どり)・ヨトウガ

発生圃場率			発生株率	
年度/月旬	3月 下旬	4月 下旬	3月 下旬	4月 下旬
2015	0.0	0.0		
2016	0.0	0.0		
2017	0.0	0.0		
2018	0.0	0.0		
2019	0.0	0.0		
2020	0.0	0.0		
2021	0.0	0.0		
2022	0.0	0.0		
2023	0.0	-		
2024	0.0	0.0		
2025	0.0	0.0		
平年値	0.0	0.0	-	-

12月どりレタス・灰色かび病

発生圃場率			発病株率	
年度/月旬	10月 下旬	11月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	0.0	38.9		0.8
2016	0.0	6.7		1.0
2017	11.1	0.0	0.6	
2018	0.0	0.0		
2019	0.0	0.0		
2020	0.0	0.0		
2021	0.0	0.0		
2022	0.0	0.0		
2023	0.0	0.0		
2024	0.0	0.0		
2025	0.0	0.0		
平年値	1.1	4.6	0.6	0.9

12月どりレタス・菌核病

発生圃場率			発病株率	
年度/月旬	10月 下旬	11月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	0.0	66.7		2.2
2016	0.0	20.0		3.0
2017	0.0	5.6		0.1
2018	5.6	12.5	4.0	3.0
2019	0.0	5.6		0.1
2020	0.0	6.3		1.0
2021	0.0	0.0		
2022	0.0	16.7		0.5
2023	0.0	6.7		0.1
2024	0.0	21.4		0.1
2025	0.0	0.0		
平年値	0.6	16.1	4.0	1.1

12月どりレタス・アブラムシ類

発生圃場率			発生株率	
年度/月旬	10月 下旬	11月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	5.6	5.6	4.0	8.0
2016	31.3	6.7	4.8	4.0
2017	0.0	0.0		
2018	0.0	0.0		
2019	0.0	5.6		4.0
2020	5.6	6.3	0.1	2.0
2021	0.0	0.0		
2022	0.0	0.0		
2023	0.0	0.0		
2024	8.3	0.0	1.0	
2025	37.5	12.5	6.7	4.0
平年値	5.1	2.4	2.5	4.5

12月どりレタス・ハスモンヨトウ

発生圃場率			発生株率	
年度/月旬	10月 下旬	11月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	0.0	16.7		1.0
2016	6.3	0.0	1.0	
2017	0.0	0.0		
2018	0.0	0.0		
2019	0.0	0.0		
2020	0.0	0.0		
2021	0.0	0.0		
2022	0.0	0.0		
2023	0.0	0.0		
2024	8.3	0.0	0.5	
2025	12.5	0.0	1.0	
平年値	1.5	1.7	0.8	1.0

12月どりレタス・シロイチモジヨトウ

発生圃場率			発生株率	
年度/月旬	10月 下旬	11月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	0.0	5.6		1.0
2016	0.0	0.0		
2017	0.0	5.6		1.0
2018	0.0	12.5		1.1
2019	11.1	11.1	3.0	11.0
2020	0.0	6.3		45.0
2021	6.7	6.7	1.0	1.0
2022	0.0	0.0		
2023	0.0	13.3		0.6
2024	8.3	0.0	1.0	
2025	25.0	6.3	1.3	1.0
平年値	2.6	0.0	1.7	8.7

12月どりレタス・オオタバコガ

発生圃場率			発生株率	
年度/月旬	10月 下旬	11月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	0.0	0.0		
2016	0.0	0.0		
2017	0.0	0.0		
2018	5.6	0.0	0.1	
2019	0.0	0.0		
2020	0.0	0.0		
2021	0.0	0.0		
2022	0.0	0.0		
2023	0.0	0.0		
2024	0.0	7.1		1.0
2025	6.3	0.0	1.0	
平年値	0.6	0.7	0.1	1.0

1～2月どりレタス・灰色かび病

発生圃場率				発病株率		
年度/月旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬
2015	4.2	12.5	31.6	0.2	0.8	0.9
2016	4.3	20.8	39.1	1.0	1.2	2.9
2017	13.0	8.7	22.7	1.3	1.3	0.7
2018	0.0	8.3	36.4		1.0	2.5
2019	0.0	4.2	20.8		1.0	0.7
2020	0.0	8.3	28.6		0.3	0.9
2021	0.0	0.0	4.8			2.0
2022	0.0	12.5	9.5		0.2	0.8
2023	-	0.0	4.8	-		0.1
2024	-	0.0	13.3	-		0.2
2025	-	0.0	0.0	-		
平年値	2.7	7.5	21.2	0.8	0.8	1.2

1～2月どりレタス・菌核病

発生圃場率				発病株率		
年度/月旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬
2015	12.5	0.0	63.2	2.7		2.8
2016	8.7	33.3	47.8	1.6	0.9	2.2
2017	8.7	8.7	22.7	1.0	0.5	1.9
2018	4.5	16.7	13.6	1.0	0.9	0.4
2019	8.3	4.2	37.5	0.1	1.0	0.4
2020	12.5	33.3	42.9	1.7	1.6	0.5
2021	8.3	0.0	19.0	0.3		1.4
2022	0.0	8.3	19.0		0.2	0.3
2023	-	0.0	0.0	-		
2024	-	7.1	13.3	-	1.0	0.6
2025	-	10.5	9.5	-	0.2	0.1
平年値	7.9	11.2	27.9	1.2	0.9	1.2

1～2月どりレタス・アブラムシ類

発生圃場率				発生株率		
年度/月旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬
2015	29.2	12.5	0.0	6.9	12.0	
2016	8.7	4.2	0.0	4.0	4.0	
2017	0.0	0.0	0.0			
2018	0.0	0.0	0.0			
2019	8.3	0.0	0.0	6.0		
2020	0.0	0.0	0.0			
2021	4.2	0.0	0.0	4.0		
2022	0.0	0.0	0.0			
2023	-	0.0	4.8	-		4.0
2024	-	7.1	0.0	-	1.0	
2025	-	31.6	4.8	-	1.0	2.0
平年値	6.3	2.4	0.5	5.2	5.7	4.0

1～2月どりレタス・ハスモンヨトウ

発生圃場率				発生株率		
年度/月旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0			
2016	0.0	0.0	0.0			
2017	0.0	0.0	0.0			
2018	0.0	0.0	0.0			
2019	8.3	0.0	0.0	2.0		
2020	4.2	0.0	0.0	2.0		
2021	0.0	0.0	0.0			
2022	0.0	0.0	0.0			
2023	-	0.0	0.0	-		
2024	-	0.0	0.0	-		
2025	-	0.0	0.0	-		
平年値	1.6	0.0	0.0	2.0	-	-

1～2月どりレタス・シロイチモジヨトウ

発生圃場率				発生株率		
年度/月旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0			
2016	0.0	0.0	0.0			
2017	0.0	0.0	0.0			
2018	0.0	0.0	0.0			
2019	0.0	4.2	4.2		0.1	1.0
2020	4.2	0.0	0.0	1.0		
2021	0.0	0.0	0.0			
2022	12.5	0.0	0.0	3.0		
2023	-	0.0	0.0	-		
2024	-	0.0	0.0	-		
2025	-	0.0	0.0	-		
平年値	2.1	0.4	0.4	2.0	0.1	1.0

1～2月どりレタス・オオタバコガ

発生圃場率				発生株率		
年度/月旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0			
2016	0.0	0.0	0.0			
2017	0.0	0.0	0.0			
2018	0.0	4.2	0.0		1.0	
2019	0.0	0.0	4.2			0.1
2020	0.0	0.0	0.0			
2021	0.0	0.0	0.0			
2022	0.0	0.0	0.0			
2023	-	4.2	0.0	-	0.1	
2024	-	0.0	0.0	-		
2025	-	0.0	0.0	-		
平年値	0.0	0.8	0.4	-	0.6	0.1

※ 2023年度から11月の調査なし

3～4月どりレタス・灰色かび病

発生圃場率				発病株率		
年度/月旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2015	43.8	46.7	46.7	8.7	1.1	2.0
2016	33.3	20.0	45.5	1.9	2.5	1.1
2017	26.7	37.5	55.6	0.7	11.0	6.6
2018	33.3	33.1	50.0	1.4	1.2	3.7
2019	66.7	55.6	50.0	4.2	7.9	4.9
2020	12.5	33.3	42.9	1.5	3.7	3.6
2021	20.0	53.3	62.5	0.7	0.9	0.8
2022	8.3	15.4	28.6	2.0	8.0	1.1
2023	－	11.8	12.5	－	0.6	5.2
2024	－	16.7	0.0	－	1.1	
2025	－	0.0	0.0	－		
平年値	28.7	27.7	34.8	1.8	4.1	3.4

3～4月どりレタス・菌核病

発生圃場率				発病株率		
年度/月旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2015	6.3	20.0	20.0	1.0	2.5	1.7
2016	26.7	33.3	36.4	2.5	1.6	1.4
2017	26.7	18.8	11.1	1.8	27.3	40.0
2018	16.7	11.1	7.1	0.5	4.3	3.0
2019	5.6	11.1	7.1	2.0	2.6	1.0
2020	12.5	5.6	35.7	0.1	2.0	1.2
2021	13.3	13.3	25.0	0.3	1.1	1.1
2022	8.3	7.7	42.9	2.0	2.0	1.0
2023	－	11.8	0.0	－	0.8	
2024	－	0.0	0.0	－		
2025	－	0.0	0.0	－		
平年値	15.7	11.3	16.5	1.3	5.2	7.0

3～4月どりレタス・アブラムシ類

発生圃場率				発生株率		
年度/月旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2015	0.0	13.3	0.0		6.0	
2016	0.0	0.0	0.0			
2017	0.0	0.0	0.0			
2018	0.0	0.0	0.0			
2019	0.0	5.6	0.0		4.0	
2020	6.3	5.6	7.1	4.0	1.0	12.0
2021	0.0	0.0	0.0			
2022	0.0	0.0	0.0			
2023	－	0.0	6.3	－		4.0
2024	－	8.3	0.0	－	4.0	
2025	－	0.0	0.0	－		
平年値	0.9	2.0	1.3	4.0	3.0	8.0

※ 2023 年度から 1 月の調査なし

(4) キュウリ

① 主要病害虫の発生状況

ア 夏秋キュウリ 73ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
べと病	平年：並	平年：やや多	17ha	夏キュウリでは、平年同様6月から発生し、平年並の発生量で推移した。秋キュウリでは、平年同様8月から発生し、発生初期はやや少なかったが、9月にはやや多くなった。	9月上中旬の多雨。
炭疽病	平年：並	平年：並	43ha	夏キュウリでは、平年同様6月から発生し、平年並の発生量で推移した。秋キュウリでは平年並の8月から発生し、発生初期はやや少ない発生量であったが、9月には平年並の発生量となった。	8月の少雨。
褐斑病	平年：やや遅い	平年：並	12ha	夏キュウリでは、平年同様6月から発生し、その後発生量は減少しやや少ない発生量となった。秋キュウリでは平年よりやや遅い9月から発生し、やや多い発生量となった。	6月、7月、8月の少雨、9月上中旬の多雨。
うどんこ病	平年：やや遅い	平年：やや多	22ha	夏キュウリでは、平年よりやや遅い7月から発生し、多い発生量となった。秋キュウリでは平年よりやや遅い9月から発生し、やや少ない発生量となった。	7月の少雨による発生助長と8月、9月の高温による抑制。
灰色かび病	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	例年この作型での発生は少ない。
斑点細菌病	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	例年この作型での発生は少ない。
アブラムシ類	平年：並	平年：やや少	30ha	夏キュウリでは、平年同様6月から発生し、平年並の発生量となった。秋キュウリでは、平年同様8月から発生し、その後やや減少しやや少ない発生量となった。	9月上中旬の多雨。
コナジラミ類	平年：並	平年：多	61ha	夏キュウリでは、平年同様6月から発生し、7月にかけて増加し多い発生量となった。秋キュウリでは、平年同様8月から発生し、9月にかけて増加し多い発生量となった。	7月～9月の高温。
アザミウマ類	平年：やや遅い	平年：やや多	49ha	夏キュウリでは、平年同様6月から発生し、平年並の発生量となった。秋キュウリでは、平年よりやや遅い9月から発生となったが発生量はやや多かった。	夏季の少雨。
ハダニ類	平年：やや遅い	平年：やや少	2ha	夏キュウリでは、平年よりやや遅い7月から発生し、発生量は平年並であった。秋キュウリでは発生は認められなかった。	防除の徹底。
ハスモンヨトウ	平年：－	平年：やや少	0ha	発生は認められなかった。	防除の徹底。

オオタバコガ	平年：並	平年：やや多	33ha	夏キュウリでは、平年同様6月から発生し、6月はやや少ない発生量であったが、7月にはやや多い発生量となった。秋キュウリでは、平年同様8月から発生し、平年並の発生量となった。	7月の高温少雨。
--------	------	--------	------	---	----------

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付 面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実 防除	延 防除
夏秋キュウリ	73	べと病	0	2	0	5	17	73	256
		炭疽病	12	2	12	17	43	73	219
		褐斑病	10	0	0	2	12	73	219
		うどんこ病	0	0	0	22	22	73	219
		灰色かび病	0	0	0	0	0	73	73
		斑点細菌病	0	0	0	0	0	73	219
		アブラムシ類	0	0	0	30	30	73	168
		コナジラミ類	0	0	10	51	61	73	168
		ハダニ	0	0	0	2	2	73	292
		ハスモンヨトウ	0	0	0	0	0	73	219
		オオタバコガ	0	0	0	33	33	73	168

③ 調査結果

ア 巡回調査

夏キュウリ・べと病

発生圃場率			発病葉率	
年度/月旬	6月 下旬	7月 下旬	6月 下旬	7月 下旬
2015	53.3	46.7	1.9	12.9
2016	75.0	62.5	22.9	31.5
2017	17.6	57.1	2.7	21.4
2018	42.9	46.2	0.8	19.5
2019	6.3	42.9	0.1	32.8
2020	53.3	53.3	21.5	20.5
2021	58.3	33.3	17.5	23.8
2022	16.7	18.2	0.6	2.0
2023	78.6	31.3	14.2	35.2
2024	46.2	50.0	19.0	38.0
2025	8.3	33.3	65.0	36.0
平年値	44.8	44.1	10.1	23.8

夏キュウリ・炭疽病

発生圃場率			発病葉率	
年度/月旬	6月 下旬	7月 下旬	6月 下旬	7月 下旬
2015	20.0	100.0	1.7	40.1
2016	43.8	93.8	7.2	35.6
2017	5.9	42.9	10.0	15.0
2018	35.7	76.9	1.8	18.3
2019	6.3	66.7	2.0	20.3
2020	26.7	80.0	1.3	30.0
2021	50.0	91.7	8.0	32.9
2022	16.7	54.5	8.0	14.3
2023	7.1	62.5	5.0	32.1
2024	23.1	87.5	2.3	24.7
2025	16.7	66.7	6.5	30.7
平年値	23.5	75.6	4.7	26.3

夏キュウリ・褐斑病

発生圃場率			発病葉率	
年度/月旬	6月 下旬	7月 下旬	6月 下旬	7月 下旬
2015	13.3	40.0	1.0	5.2
2016	0.0	18.8		21.7
2017	11.8	0.0	3.0	
2018	0.0	7.7		5.5
2019	0.0	28.6		8.8
2020	0.0	26.7		4.3
2021	8.3	8.3	18.0	10.0
2022	0.0	9.1		2.0
2023	0.0	12.5		80.0
2024	0.0	0.0		
2025	8.3	0.0	3.0	
平年値	3.3	15.2	7.3	17.2

夏キュウリ・うどんこ病

発生圃場率			発病葉率	
年度/月旬	6月 下旬	7月 下旬	6月 下旬	7月 下旬
2015	6.7	6.7	0.2	20.0
2016	0.0	18.8		2.7
2017	11.8	21.4	16.0	21.7
2018	0.0	7.7		5.5
2019	12.5	28.6	3.5	8.8
2020	13.3	20.0	5.5	2.3
2021	8.3	0.0	5.0	
2022	25.0	9.1	2.3	1.0
2023	0.0	0.0		
2024	0.0	0.0		
2025	0.0	55.6		8.8
平年値	7.8	11.2	5.4	8.9

夏キュウリ・灰色かび病

発生圃場率			発病株率	
年度/月旬	6月 下旬	7月 下旬	6月 下旬	7月 下旬
2015	0.0	0.0		
2016	0.0	0.0		
2017	0.0	0.0		
2018	0.0	0.0		
2019	0.0	0.0		
2020	0.0	0.0		
2021	0.0	0.0		
2022	0.0	0.0		
2023	0.0	0.0		
2024	0.0	0.0		
2025	0.0	0.0		
平年値	0.0	0.0	-	-

夏キュウリ・斑点細菌病

発生圃場率			発病葉率	
年度/月旬	6月 下旬	7月 下旬	6月 下旬	7月 下旬
2015	6.7	0.0	1.0	
2016	0.0	0.0		
2017	0.0	0.0		
2018	0.0	0.0		
2019	0.0	0.0		
2020	0.0	0.0		
2021	0.0	0.0		
2022	0.0	0.0		
2023	0.0	0.0		
2024	0.0	0.0		
2025	0.0	0.0		
平年値	0.7	0.0	1.0	-

夏キュウリ・アブラムシ類
発生圃場率

年度/月旬	虫数/25葉	
	6月 下旬	7月 下旬
2015	40.0	40.0
2016	31.3	56.3
2017	52.9	28.6
2018	28.6	7.7
2019	50.0	40.0
2020	40.0	33.3
2021	33.3	41.7
2022	58.3	45.5
2023	35.7	12.5
2024	76.9	25.0
2025	25.0	44.4
平年値	44.7	33.1

夏キュウリ・コナジラミ類
発生圃場率

年度/月旬	虫数/25葉	
	6月 下旬	7月 下旬
2015	13.3	26.7
2016	12.5	12.5
2017	47.1	57.1
2018	0.0	0.0
2019	6.3	13.3
2020	6.7	40.0
2021	0.0	25.0
2022	41.7	54.5
2023	14.3	18.8
2024	23.1	0.0
2025	41.7	44.4
平年値	16.5	24.8

夏キュウリ・アザミウマ類
発生圃場率

年度/月旬	虫数/25葉	
	6月 下旬	7月 下旬
2015	26.7	21.4
2016	50.0	12.5
2017	76.5	14.3
2018	57.1	38.5
2019	62.5	6.7
2020	33.3	20.0
2021	33.3	0.0
2022	75.0	27.3
2023	85.7	12.5
2024	84.6	25.0
2025	83.3	22.2
平年値	58.5	17.8

夏キュウリ・ハダニ類
発生圃場率

年度/月旬	虫数/25葉	
	6月 下旬	7月 下旬
2015	20.0	20.0
2016	0.0	18.8
2017	5.9	7.1
2018	7.1	0.0
2019	0.0	33.3
2020	0.0	13.3
2021	0.0	8.3
2022	8.3	18.2
2023	35.7	37.5
2024	7.7	25.0
2025	0.0	11.1
平年値	8.5	18.1

夏キュウリ・ハスモンヨトウ
発生圃場率

年度/月旬	個体群数/50株	
	6月 下旬	7月 下旬
2015	0.0	0.0
2016	0.0	0.0
2017	0.0	0.0
2018	0.0	0.0
2019	0.0	0.0
2020	0.0	0.0
2021	0.0	0.0
2022	0.0	0.0
2023	0.0	0.0
2024	0.0	0.0
2025	0.0	0.0
平年値	0.0	0.0

夏キュウリ・オオタバコガ
発生圃場率

年度/月旬	虫数/25ユニット	
	6月 下旬	7月 下旬
2015	26.7	20.0
2016	12.5	12.5
2017	35.3	21.4
2018	28.6	15.4
2019	50.0	20.0
2020	40.0	20.0
2021	25.0	41.7
2022	50.0	36.4
2023	42.9	18.8
2024	53.8	25.0
2025	33.3	55.6
平年値	36.5	23.1

秋キュウリ・べと病
発生圃場率

年度/月旬	8月	9月	発病葉率	
	下旬	下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	22.2	25.0	10.5	
2016	10.0	37.5	7.5	40.0
2017	0.0	18.2	1.0	10.0
2018	0.0	0.0		2.8
2019	40.0	10.0		
2020	14.3	0.0	7.0	1.0
2021	0.0	50.0	1.0	
2022	0.0	0.0	0.0	25.0
2023	0.0	20.0		
2024	12.5	20.0	35.0	85.0
2025	16.7	20.0	0.5	72.0
平年値	9.9	18.1	8.6	27.7

秋キュウリ・炭疽病
発生圃場率

年度/月旬	8月	9月	発病葉率	
	下旬	下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	44.4	100.0	5.5	50.9
2016	20.0	75.0	3.0	24.3
2017	54.5	72.7	0.9	28.8
2018	54.5	100.0	1.8	69.8
2019	100.0	80.0	7.8	30.0
2020	42.9	66.7	36.3	61.8
2021	62.5	100.0	46.6	18.0
2022	27.3	66.7	2.3	49.2
2023	70.0	100.0	16.3	41.8
2024	0.0	80.0		26.8
2025	66.7	60.0	0.8	45.3
平年値	47.6	84.1	13.4	40.1

秋キュウリ・褐斑病
発生圃場率

年度/月旬	8月	9月	発病葉率	
	下旬	下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	0.0	0.0		
2016	0.0	12.5		40.0
2017	0.0	9.1		70.0
2018	9.1	20.0	10.0	35.0
2019	30.0	20.0	1.7	35.5
2020	0.0	11.0		20.0
2021	50.0	50.0	10.5	1.0
2022	9.1	11.1	2.0	8.0
2023	10.0	40.0	2.0	5.5
2024	0.0	0.0		
2025	0.0	20.0		80.0
平年値	10.8	17.4	5.2	26.9

秋キュウリ・うどんこ病
発生圃場率

年度/月旬	8月	9月	発病葉率	
	下旬	下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	0.0	0.0		
2016	0.0	25.0		32.5
2017	0.0	0.0		
2018	0.0	10.0		10.0
2019	10.0	20.0	30.0	10.5
2020	0.0	33.3		5.0
2021	0.0	0.0		
2022	0.0	44.4		46.3
2023	0.0	20.0		30.0
2024	0.0	0.0		
2025	0.0	20.0		1.0
平年値	1.0	15.3	30.0	22.4

秋キュウリ・灰色かび病
発生圃場率

年度/月旬	8月	9月	発病株率	
	下旬	下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	0.0	0.0		
2016	0.0	0.0		
2017	0.0	0.0		
2018	0.0	0.0		
2019	0.0	0.0		
2020	0.0	0.0		
2021	0.0	0.0		
2022	0.0	0.0		
2023	0.0	0.0		
2024	0.0	0.0		
2025	0.0	0.0		
平年値	0.0	0.0	-	-

秋キュウリ・斑点細菌病
発生圃場率

年度/月旬	8月	9月	発病葉率	
	下旬	下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	0.0	0.0		
2016	0.0	0.0		
2017	0.0	0.0		
2018	0.0	0.0		
2019	0.0	0.0		
2020	0.0	0.0		
2021	0.0	0.0		
2022	0.0	0.0		
2023	0.0	0.0		
2024	0.0	0.0		
2025	0.0	0.0		
平年値	0.0	0.0	-	-

秋キュウリ・アブラムシ類
発生圃場率

年度/月旬	8月		9月	
	下旬	下旬	下旬	下旬
2015	55.6	37.5	1.4	110.0
2016	50.0	75.0	13.4	391.1
2017	63.6	45.5	16.1	585.2
2018	36.4	50.0	6.3	19.8
2019	30.0	70.0	9.3	211.1
2020	14.3	50.0	2.0	73.7
2021	62.5	100.0	4.0	57.5
2022	72.7	55.6	12.6	338.6
2023	10.0	40.0	3.0	17.0
2024	62.5	80.0	33.1	3.8
2025	66.7	40.0	18.3	12.0
平年値	45.8	60.4	10.1	180.8

秋キュウリ・アザミウマ類
発生圃場率

年度/月旬	8月		9月	
	下旬	下旬	下旬	下旬
2015	0.0	50.0		16.0
2016	0.0	62.5		27.0
2017	36.4	27.3	40.3	138.7
2018	27.3	40.0	127.3	37.3
2019	0.0	10.0		1.0
2020	14.3	0.0	6.0	
2021	37.5	0.0	27.7	
2022	45.5	33.3	3.6	16.3
2023	30.0	0.0	1.0	
2024	25.0	40.0	1.0	1.0
2025	0.0	60.0		42.7
平年値	21.6	26.3	29.6	33.9

秋キュウリ・ハスモンヨトウ
発生圃場率

年度/月旬	8月		9月	
	下旬	下旬	下旬	下旬
2015	11.1	0.0	1.0	
2016	60.0	12.5	1.7	1.0
2017	36.4	18.2	1.0	0.8
2018	18.2	10.0	1.0	1.0
2019	10.0	10.0	1.0	0.5
2020	14.3	0.0	1.0	
2021	0.0	0.0		
2022	0.0	0.0		
2023	10.0	0.0	1.0	
2024	0.0	0.0		
2025	0.0	0.0		
平年値	16.0	5.1	1.1	0.8

秋キュウリ・コナジラミ類
発生圃場率

年度/月旬	8月		9月	
	下旬	下旬	下旬	下旬
2015	33.3	50.0	4.0	17.5
2016	60.0	50.0	3.0	34.5
2017	72.7	72.7	2.8	15.3
2018	18.2	70.0	5.0	5.9
2019	40.0	50.0	3.5	12.6
2020	0.0	0.0		
2021	50.0	50.0	2.8	1.0
2022	72.7	77.8	5.5	39.9
2023	50.0	100.0	5.4	10.2
2024	37.5	100.0	28.0	62.0
2025	83.3	100.0	10.6	159.6
平年値	43.4	62.1	6.7	22.1

秋キュウリ・ハダニ類
発生圃場率

年度/月旬	8月		9月	
	下旬	下旬	下旬	下旬
2015	0.0	12.5		11.0
2016	0.0	25.0		19.0
2017	9.1	9.1	21.0	14.0
2018	27.3	40.0	1.7	45.5
2019	0.0	10.0		2645.0
2020	0.0	0.0		
2021	25.0	0.0	1.5	
2022	18.2	33.3	1.5	100.7
2023	20.0	40.0	8.0	139.5
2024	0.0	0.0		
2025	0.0	0.0		
平年値	10.0	17.0	6.7	425.0

秋キュウリ・オオタバコガ
発生圃場率

年度/月旬	8月		9月	
	下旬	下旬	下旬	下旬
2015	44.4	12.5	3.3	4.0
2016	70.0	25.0	10.1	1.0
2017	45.5	9.1	7.2	2.0
2018	54.5	30.0	3.0	1.7
2019	10.0	70.0	6.0	1.1
2020	28.6	33.3	5.0	2.5
2021	12.5	50.0	1.0	4.0
2022	27.3	44.4	2.3	2.3
2023	30.0	20.0	1.0	1.0
2024	12.5	20.0	2.0	1.0
2025	50.0	60.0	1.0	1.3
平年値	33.5	31.4	4.1	2.1

(5) ニンジン

① 主要病害虫の発生状況

ニンジン 95ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
黒葉枯病	平年：遅い	平年：やや少	8ha	平年より遅い11月に発生を認め、発生量はやや少なかった。	防除の徹底。
ヨトウガ	平年：並	平年：多	8ha	平年と同様 10 月に発生を認め、発生量は多かった。	秋季の高温少雨。

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実防除	延防除
ニンジン	95	黒葉枯病	0	0	0	8	8	95	95
		ヨトウガ	0	0	0	8	8	95	190

③ 調査結果

ア 巡回調査

金時ニンジン・黒葉枯病

発生圃場率	9月			発生株率		
	年度/月旬	9月下旬	10月下旬	11月下旬	9月下旬	10月下旬
	2015	75.0	100.0	100.0	9.0	8.5
	2016	0.0	91.7	83.3		11.5
	2017	0.0	50.0	91.7		6.1
	2018	33.3	100.0	100.0	5.5	27.5
	2019	0.0	45.5	100.0		4.4
	2020	16.7	63.6	45.5	3.0	1.9
	2021	8.3	0.0	0.0	1.0	
	2022	0.0	0.0	16.7		0.8
	2023	0.0	0.0	0.0		
	2024	0.0	0.0	0.0		
	2025	0.0	0.0	8.3		5.0
	平年値	13.3	45.1	53.7	4.6	10.0

金時ニンジン・ヨトウガ

発生圃場率	9月			発生株率		
	年度/月旬	9月下旬	10月下旬	11月下旬	9月下旬	10月下旬
	2015	0.0	0.0	8.3		1.0
	2016	0.0	0.0	0.0		
	2017	0.0	0.0	0.0		
	2018	0.0	0.0	0.0		
	2019	0.0	0.0	0.0	0.0	
	2020	0.0	0.0	0.0		
	2021	0.0	0.0	0.0		
	2022	0.0	0.0	0.0		
	2023	33.3	8.3	0.0	1.0	1.0
	2024	0.0	8.3	0.0		0.1
	2025	0.0	8.3	0.0		1.0
	平年値	3.3	1.7	0.8	0.5	0.6

(6) タマネギ

① 主要病害虫の発生状況

タマネギ 210ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
白色疫病	平年：－	平年：やや少	0ha	早生タマネギ及び中晩生タマネギでは、発生は認められなかった。	防除の徹底。
べと病	平年：－	平年：やや少	0ha	早生タマネギ及び中晩生タマネギでは、発生は認められなかった。	防除の徹底。
ネギアザミウマ	平年：並	平年：並	186ha	早生タマネギでは、平年同様1月から発生し、発生量は、発生初期はやや多かったが、その後は平年並の発生量で推移した。 中晩生タマネギでは、平年同様2月から発生し発生量は、発生初期は平年並みであったが、その後はやや少ない発生量で推移した。	防除の徹底。

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実防除	延防除
タマネギ	210	白色疫病	0	0	0	0	0	210	735
		べと病	0	0	0	0	0	210	735
		ネギアザミウマ	3	29	20	134	186	210	420

③ 調査結果

ア 巡回調査

タマネギ早生栽培・べと病

発生圃場率

年度/月旬	発生圃場率			発病株率		
	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0			
2016	0.0	0.0	10.0			0.2
2017	10.0	20.0	30.0	0.2	0.2	2.0
2018	0.0	0.0	8.3			0.1
2019	0.0	0.0	0.0			
2020	10.0	0.0	0.0	0.1		
2021	0.0	0.0	40.0			0.8
2022	10.0	10.0	20.0	0.1	0.1	2.0
2023	20.0	10.0	11.1	0.2	0.1	5.0
2024	10.0	20.0	10.0	0.2	1.0	15.0
2025	0.0	0.0	0.0			
平年値	6.0	6.0	12.9	0.2	0.4	3.6

タマネギ早生栽培・白色疫病

発生圃場率

年度/月旬	発生圃場率			発病株率		
	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2015	0.0	20.0	30.0			0.6
2016	10.0	10.0	10.0	0.7	5.0	0.5
2017	10.0	20.0	0.0	3.0	5.0	
2018	0.0	0.0	0.0			
2019	0.0	0.0	0.0			
2020	0.0	10.0	0.0		3.0	
2021	0.0	0.0	0.0			
2022	0.0	0.0	0.0			
2023	10.0	0.0	0.0	0.1		
2024	0.0	0.0	0.0			
2025	0.0	0.0	0.0			
平年値	3.0	6.0	4.0	1.3	3.4	2.9

タマネギ早生栽培・ネギアザミウマ
発生圃場率

年度/月 旬	1月	2月	3月	虫数／10株		
	下旬	下旬	下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2015	60.0	70.0	70.0	3.3	5.1	26.4
2016	70.0	90.0	100.0	19.1	35.6	79.6
2017	0.0	60.0	100.0		11.5	14.9
2018	16.7	0.0	25.0	3.0		8.7
2019	50.0	70.0	100.0	9.8	77.1	54.6
2020	80.0	80.0	100.0	15.5	32.6	148.4
2021	70.0	100.0	100.0	7.4	27.0	240.5
2022	60.0	60.0	60.0	11.7	6.5	103.8
2023	60.0	50.0	88.9	5.0	29.2	75.6
2024	70.0	80.0	90.0	20.0	19.4	18.4
2025	80.0	77.8	88.9	16.9	3.0	90.0
平年値	53.7	66.0	83.4	10.5	27.1	77.1

タマネギ普通栽培・べと病
発生圃場率

年度/月 旬	2月	3月	4月	発病株率		
	下旬	下旬	下旬	2月 下旬	3月 下旬	4月 下旬
2015	0.0	0.0	27.8			3.8
2016	38.9	66.7	82.4	21.9	13.6	52.9
2017	0.0	5.6	0.0		0.1	
2018	0.0	0.0	0.0			
2019	0.0	0.0	0.0			
2020	0.0	0.0	0.0			
2021	0.0	0.0	26.7			15.8
2022	0.0	15.4	30.8		0.3	1.6
2023	0.0	0.0	75.0			28.6
2024	7.1	7.1	14.3	6.0	12.0	86.5
2025	0.0	0.0	0.0			
平年値	4.6	9.5	25.7	14.0	6.5	31.5

タマネギ普通栽培・白色疫病
発生圃場率

年度/月 旬	2月	3月	4月	発病株率		
	下旬	下旬	下旬	2月 下旬	3月 下旬	4月 下旬
2015	11.1	0.0	0.0	5.0		
2016	22.2	27.8	0.0	26.3	6.6	
2017	38.9	5.6	16.7	9.6	5.0	43.0
2018	0.0	0.0	0.0			
2019	0.0	0.0	0.0			
2020	5.6	0.0	0.0	0.1		
2021	0.0	0.0	0.0			
2022	6.7	0.0	0.0	1.0		0.0
2023	0.0	0.0	0.0			
2024	0.0	7.1	35.7		0.1	0.6
2025	0.0	0.0	0.0			
平年値	8.5	4.0	5.2	8.4	3.9	14.5

タマネギ普通栽培・ネギアザミウマ
発生圃場率

年度/月 旬	2月	3月	4月	虫数／10株		
	下旬	下旬	下旬	2月 下旬	3月 下旬	4月 下旬
2015	16.7	16.7	72.2	2.7	11.7	16.8
2016	22.2	55.6	82.4	6.0	6.9	39.0
2017	16.7	55.6	83.3	3.0	4.9	26.1
2018	5.9	5.6	61.1	1.0	31.0	16.2
2019	33.3	66.7	83.3	12.2	26.4	136.6
2020	33.3	61.1	72.2	8.8	42.6	111.2
2021	46.7	60.0	100.0	3.3	49.4	135.3
2022	0.0	30.8	76.9		25.0	41.9
2023	33.3	100.0	100.0	15.0	5.8	43.7
2024	35.7	64.3	85.7	4.8	9.2	48.9
2025	22.2	37.5	88.9	4.0	9.7	12.0
平年値	24.4	51.6	81.7	6.3	21.3	61.6

(7) ネギ

① 主要病害虫の発生状況

ネギ 138ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
ネギアザミウマ	平年：並	平年：やや多	130ha	平年と同様5月に発生を認め、6月に発生のパークを迎えやや多い発生量となった。夏期はやや減少したが平年に比べるとやや多く推移した。	期間を通しての少雨傾向。
アブラムシ類	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	例年ネギでの発生は少ない。
ネギコガ	平年：並	平年：やや少	8ha	平年同様4月から発生を認めたが、その後は発生が認められなかった。	防除の徹底。
ネギハモグリバエ	平年：やや遅い	平年：やや少	55ha	平年よりやや遅い6月から発生を認め、その後8月まで発生を認めず、やや少ない発生量で推移した。	防除の徹底。
さび病	平年：並	平年：並	15ha	平年同様5月からに発生を認め、その後平年同様6月まで発生した。発生量は平年並であった。	
べと病	平年：並	平年：並	8ha	平年同様5月からに発生を認め、その後は発生を認めなかった。発生量は平年並であった。	
黒斑病	平年：並	平年：並	8ha	平年同様5月から発生を認めた。その後8月に一時的に発生量が多くなったが、その他の時期は平年並で推移した。	

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実防除	延防除
ネギ	138	ネギアザミウマ	38	8	23	61	130	138	690
		アブラムシ類	0	0	0	0	0	138	690
		ネギコガ	0	0	0	8	8	138	552
		ネギハモグリバエ	0	0	0	55	55	138	552
		さび病	0	0	0	15	15	138	138
		べと病	0	0	8	0	8	138	690
		黒斑病	0	0	0	8	8	138	138

③ 調査結果

ア 巡回調査

葉ネギ・ネギアザミウマ

発生圃場率

年度/月旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
2015	93.8	100.0	61.1	72.2	58.8	
2016	100.0	68.8	80.0	50.0	27.8	33.3
2017	94.4	100.0	88.2	52.9	27.8	5.9
2018	100.0	100.0	33.2	50.0	5.6	22.2
2019	82.4	100.0	62.5	57.1	16.7	37.5
2020	100.0	94.4	86.7	44.4	27.8	37.5
2021	88.9	100.0	88.2	40.0	55.3	64.7
2022	92.9	100.0	100.0	81.3	93.8	64.7
2023	100.0	100.0	92.9	71.4	64.7	62.5
2024	90.9	53.3	83.3	54.5	37.5	37.5
2025	77.8	94.4	71.4	72.2	66.3	93.3
平年値	94.3	91.6	77.6	57.4	41.6	40.6

被害葉率

5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
25.4	34.8	9.1	13.8	11.5	
31.4	21.3	23.3	5.9	10.6	2.3
26.5	53.8	26.4	12.3	2.1	0.4
30.3	32.5	1.9	4.6	1.0	7.0
21.3	48.7	17.3	3.8	68.0	20.7
19.3	49.4	9.1	9.6	1.4	8.8
50.0	43.5	29.2	2.1	30.4	12.5
61.6	70.3	62.4	29.9	26.3	23.6
56.6	52.4	77.3	7.2	44.6	40.6
32.5	56.5	63.9	30.2	9.8	25.3
67.4	72.2	76.5	65.8	42.3	45.8
35.5	46.3	32.0	11.9	20.6	15.7

葉ネギ・アブラムシ類

発生圃場率

年度/月旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2016	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

寄生株率

5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
1.3					
3.0					
3.5					
2.6	-	-	-	-	-

葉ネギ・ネギコガ

発生圃場率

年度/月旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
2015	12.5	35.3	38.9	5.6	41.2	
2016	7.1	18.8	13.3	0.0	0.0	0.0
2017	5.6	0.0	17.6	0.0	5.6	5.9
2018	5.6	11.1	0.0	0.0	11.1	0.0
2019	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023	6.3	0.0	0.0	7.1	5.9	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	5.4	6.5	7.0	1.3	6.4	0.7

寄生株率

5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
0.5	2.7	0.7	0.7	2.2	
1.0	1.8	0.1			
1.0		1.7		1.0	0.1
2.0	0.3			2.2	
0.3					
0.1					
1.0			1.0	1.0	
0.1					
0.8	1.6	0.8	0.8	1.6	0.1

葉ネギ・ネギハモグリバエ

発生圃場率

年度/月旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
2015	12.5	35.3	22.2	16.7	47.1	
2016	7.1	6.3	13.3	33.3	44.4	53.3
2017	16.7	11.1	23.5	50.0	38.9	29.4
2018	22.2	38.9	16.7	6.3	27.8	33.3
2019	11.8	5.6	25.0	7.1	17.0	25.0
2020	25.0	11.1	0.0	0.0	0.0	6.3
2021	5.6	26.7	0.0	0.0	25.0	52.9
2022	21.4	0.0	18.8	18.8	6.3	11.8
2023	12.5	6.7	0.0	0.0	11.8	37.5
2024	0.0	6.7	0.0	9.1	0.0	6.3
2025	0.0	38.9	0.0	0.0	17.6	40.0
平年値	13.5	14.8	12.0	14.1	21.8	28.4

寄生株率

5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
1.0	0.9	1.4	1.3	4.1	
1.0	1.0	5.0	19.8	18.7	3.8
7.0	25.4	1.5	19.1	24.8	20.3
2.0	1.8	0.9	2.0	25.3	6.5
0.1	1.0	1.8	0.1	1.0	1.2
0.3	1.5				1.0
0.1	1.3			1.5	3.7
0.1		1.3	0.7	0.1	0.1
0.6	0.5			1.0	1.6
	0.1		1.0		1.0
	1.5			2.2	0.4
1.4	3.7	2.0	6.3	9.6	4.4

葉ネギ・さび病

発生圃場率

年度/月旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
2015	6.3	35.3	0.0	0.0	0.0	
2016	21.4	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2017	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020	31.3	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2021	5.6	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	18.2	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	5.6	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	11.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0

発病株率

5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
0.1	2.6				
0.2	1.0				
	10.0				
5.2	0.3				
0.1	0.1				
8.2					
0.1	0.1				
0.2	4.0				
2.3	2.3	-	-	-	-

葉ネギ・べと病

発生圃場率

年度/月旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
2015	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0	
2016	35.7	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2017	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2019	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023	25.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	18.2	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	12.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0

発病株率

5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
	3.6				
9.8	1.0				
	0.4				
	10.0				
0.1					
0.1					
0.1					
4.1	0.5				
0.2	2.0				
11.4					
2.4	2.9	-	-	-	-

葉ネギ・黒斑病

発生圃場率

年度/月旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
2015	0.0	58.8	5.6	11.1	27.8	
2016	0.0	12.5	26.7	0.0	0.0	0.0
2017	0.0	5.6	17.6	0.0	0.0	5.9
2018	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	5.9
2019	11.8	0.0	43.8	0.0	0.0	0.0
2020	18.8	11.1	60.0	0.0	5.6	0.0
2021	5.6	0.0	11.8	13.3	0.0	5.9
2022	7.1	0.0	31.3	0.0	6.3	0.0
2023	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	5.6	5.6	0.0	11.1	0.0	0.0
平年値	5.6	10.6	19.7	2.4	4.0	2.0

発病株率

5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
	1.9	1.5	0.5	2.4	
	0.5	1.8			
	1.0	1.2			1.5
	0.5				1.5
0.8		2.4			
0.5	0.5	2.5		2.0	
0.5		0.5	1.3		1.0
0.1		0.7		0.5	
3.8					
	2.0				
2.5	1.0		8.5		
1.1	1.1	1.5	0.9	1.6	1.3

(8) キャベツ

① 主要病害虫の発生状況

冬キャベツ 128ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
黒腐病	平年：－	平年：やや少	0ha	発生は認められなかった。	9月下旬以降の少雨。
菌核病	平年：－	平年：やや少	0ha	発生は認められなかった。	9月末頃からの少雨による子のう盤形成抑制。
アブラムシ類	平年：やや遅い	平年：並	21ha	平年よりやや遅い10月から発生し、平年並の発生量で推移した。	
コナガ	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	防除の徹底。
モンシロチョウ	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	防除の徹底。
ハスモンヨトウ	平年：－	平年：やや少	0ha	発生は認められなかった。	防除の徹底。
オオタバコガ	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	防除の徹底。
ヨトウガ	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	防除の徹底。

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実防除	延防除
冬キャベツ	128	黒腐病	0	0	0	0	0	128	192
		菌核病	0	0	0	0	0	128	192
		アブラムシ類	0	0	0	21	21	128	256
		コナガ	0	0	0	0	0	128	128
		モンシロチョウ	0	0	0	0	0	128	192
		ハスモンヨトウ	0	0	0	0	0	128	256
		オオタバコガ	0	0	0	0	0	128	256
		ヨトウガ	0	0	0	0	0	128	256

③ 調査結果

ア 巡回調査

冬キャベツ・黒腐病
発生圃場率

年度/月旬	発生圃場率			発病株率		
	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	0.0	16.7	0.0		20.0	
2016	0.0	0.0	33.3			15.0
2017	0.0	0.0	0.0			
2018	0.0	50.0	16.7		36.7	2.0
2019	0.0	0.0	0.0			
2020	0.0	0.0	33.3			3.0
2021	0.0	0.0	0.0			
2022	0.0	0.0	16.7			0.1
2023	0.0	0.0	0.0			
2024	0.0	0.0	0.0			
2025	0.0	0.0	0.0			
平年値	0.0	6.7	10.0	-	28.4	5.0

冬キャベツ・菌核病
発生圃場率

年度/月旬	発生圃場率			発病株率		
	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	0.0	0.0	33.3			6.1
2016	0.0	0.0	66.7			2.8
2017	0.0	50.0	50.0		4.0	3.2
2018	0.0	16.7	50.0		2.0	1.1
2019	0.0	16.7	16.7		2.0	1.0
2020	0.0	16.7	0.0		2.0	
2021	0.0	0.0	16.7			1.0
2022	0.0	16.7	0.0		0.1	
2023	0.0	0.0	16.7			0.1
2024	0.0	0.0	0.0			
2025	0.0	0.0	0.0			
平年値	0.0	11.7	25.0	-	2.0	2.2

冬キャベツ・アブラムシ類
発生圃場率

年度/月旬	発生圃場率			虫数/10株		
	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	33.3	0.0	16.7	5.5		22.0
2016	0.0	0.0	0.0			
2017	16.7	0.0	0.0	5.0		
2018	0.0	0.0	0.0	5.0		
2019	0.0	16.7	0.0		12.0	
2020	0.0	16.7	0.0		2.0	
2021	16.7	0.0	0.0	6.0		
2022	0.0	0.0	0.0	6.0		
2023	50.0	33.0	0.0	2.7	14.0	
2024	0.0	33.3	16.7		17.0	41.0
2025	0.0	16.7	16.7		2.0	2.0
平年値	11.7	10.0	3.3	5.0	11.3	31.5

冬キャベツ・コナガ

発生圃場率				虫数／10株		
年度/月旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	16.7	0.0	50.0	1.0		3.0
2016	0.0	0.0	33.3			6.5
2017	0.0	16.7	0.0		1.0	
2018	0.0	0.0	0.0			
2019	0.0	0.0	0.0			
2020	0.0	0.0	0.0			
2021	0.0	0.0	0.0			
2022	0.0	0.0	0.0			
2023	0.0	0.0	0.0			
2024	0.0	0.0	0.0			
2025	0.0	0.0	0.0			
平年値	1.7	1.7	8.3	1.0	1.0	4.8

冬キャベツ・モンシロチョウ

発生圃場率				虫数／10株		
年度/月旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	0.0	0.0	16.7			1.0
2016	0.0	16.7	0.0		3.0	
2017	0.0	0.0	16.7			1.0
2018	0.0	0.0	0.0			
2019	0.0	16.7	0.0		1.0	
2020	16.7	0.0	0.0	1.0		
2021	0.0	0.0	0.0			
2022	0.0	0.0	0.0			
2023	0.0	16.7	0.0		0.1	
2024	0.0	0.0	0.0			
2025	0.0	0.0	0.0			
平年値	1.7	5.0	3.3	1.0	1.4	1.0

冬キャベツ・ハスモンヨトウ

発生圃場率				虫数／10株		
年度/月旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	0.0	0.0	16.7			2.0
2016	16.7	16.7	0.0	3.0	1.0	
2017	0.0	0.0	0.0			
2018	50.0	0.0	0.0	9.0		
2019	83.3	16.7	0.0	4.6	2.0	
2020	16.7	0.0	0.0	1.0		
2021	0.0	0.0	0.0			
2022	50.0	16.7	0.0	12.0	0.1	
2023	0.0	16.7	0.0		0.1	
2024	33.3	0.0	0.0	2.0		
2025	0.0	0.0	0.0			
平年値	25.0	6.7	1.7	5.3	0.8	2.0

冬キャベツ・オオタバコガ

発生圃場率				虫数／10株		
年度/月旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0			1.0
2016	0.0	0.0	0.0			
2017	0.0	0.0	0.0			
2018	0.0	0.0	0.0			
2019	0.0	0.0	16.7			1.0
2020	0.0	0.0	0.0			
2021	0.0	0.0	0.0			
2022	0.0	0.0	0.0			
2023	16.7	0.0	0.0	1.0		
2024	0.0	0.0	0.0			
2025	0.0	0.0	0.0			
平年値	1.7	0.0	1.7	1.0	-	1.0

冬キャベツ・ヨトウガ

発生圃場率				虫数／10株		
年度/月旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0			
2016	0.0	33.3	16.7		6.0	1.0
2017	0.0	0.0	0.0			
2018	0.0	0.0	0.0			
2019	0.0	0.0	0.0			
2020	0.0	0.0	0.0			
2021	0.0	0.0	0.0			
2022	0.0	0.0	0.0			
2023	0.0	0.0	0.0			
2024	0.0	0.0	0.0			
2025	0.0	0.0	0.0			
平年値	0.0	3.3	1.7	-	6.0	1.0

(9) イチゴ

① 主要病害虫の発生状況

イチゴ 86ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
炭疽病	平年：やや早	平年：やや多	35ha	育苗期では、平年よりやや早い5月から発生し、発生量は多かった。本圃では、平年並の9月に発生し、発生量は多かった。	夏季の高温。 薬剤の防除効果の低下。
うどんこ病	平年：やや遅	平年：やや多	23ha	育苗期では、平年よりやや遅い5月から発生し、少なく推移した。本圃では、平年並の11月から果実で発生を認め、12月の発生量はやや多かったが、その後の発生量は平年並で推移した。	夏季の高温。
灰色かび病	平年：やや遅	平年：少	7ha	本圃では、平年よりやや遅い3月から果実で発生し、発生量は少なかった。	防除の徹底。
ハダニ類	平年：並	平年：並	54ha	育苗期では、平年並の4月から発生し、発生量は少なかったが、その後平年並で推移した。本圃では、9月から発生を認め、平年並～多い発生量で推移した。	防除の徹底。
アブラムシ類	平年：並	平年：やや多	57ha	育苗期では、平年並の4月から発生を認め、発生量は平年並であったが、7月の発生量は多かった。その後は平年並の発生量で推移した。本圃では、平年同様9月から発生し、発生量は多かったが、その後やや少～平年並の発生量で推移した。	4月の高温。
アザミウマ類	平年：並	平年：やや少	35ha	本圃では、平年並の10月から発生を認め、以降やや少～平年並の発生量で推移した。	防除の徹底。
コナジラミ類	平年：並	平年：やや多	43ha	本圃では、平年並の9月から発生を認め、発生量はやや多かったがその後平年並の発生量で推移した。	夏期の高温。
ハスモンヨトウ	平年：やや早	平年：やや多	35ha	育苗期では、平年よりやや早い7月に発生を認め、発生量は多かったが、その後平年並で推移した。本圃では平年同様9月から発生し、発生量は多かったが、11月以降の発生は認められなかった。	夏季の高温少雨により 野外での発生増。

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付 面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実 防除	延 防除
イチゴ	86	炭疽病	0	0	7	28	35	86	430
		うどんこ病	0	0	0	23	23	86	344
		灰色かび病	0	0	0	7	7	86	344
		ハダニ類	0	0	8	54	62	86	258
		アブラムシ類	0	0	0	57	57	86	344
		アザミウマ類	14	0	7	14	35	86	258
		コナジラミ類	0	0	9	34	43	86	172
		ハスモンヨトウ	0	0	9	26	35	86	172

③ 調査結果

ア 巡回調査

イチゴ(採苗圃の子株)・炭疽病

発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017	0.0	0.0	0.0	8.3	8.3
2018	0.0	0.0	0.0	18.2	20.0
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2
2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023		0.0	0.0	0.0	9.1
2024	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0
2025	0.0	8.3	0.0	16.7	41.7
平年値	0.0	0.0	0.0	3.5	9.1

発病株率

4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬
				7.0
			0.5	0.1
			5.5	12.5
				0.2
				3.0
				27.5
				1.0
			0.5	
	0.1		2.0	9.6
-	-	-	3.0	7.1

イチゴ(採苗圃の子株)・うどんこ病

発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬
2015	20.0	50.0	75.0	33.3	0.0
2016	58.3	83.3	75.0	18.2	0.0
2017	80.0	91.7	83.3	27.3	0.0
2018	12.5	81.0	81.8	9.1	0.0
2019	0.0	58.3	50.0	41.7	0.0
2020	83.3	60.0	81.8	50.0	9.1
2021	12.5	41.7	54.5	25.0	9.1
2022	33.3	54.5	72.7	25.0	0.0
2023		50.0	83.3	41.7	0.0
2024	25.0	66.7	83.3	33.3	0.0
2025	0.0	41.7	83.3	8.3	8.3
平年値	36.1	63.7	74.1	30.5	1.8

発病株率

4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬
15.0	32.0	42.8	16.5	
39.3	42.0	33.1	2.5	
50.6	57.1	63.7	5.3	
6.0	47.3	37.8	8.0	
	27.1	40.2	7.2	
14.4	53.2	23.1	2.7	2.0
2.0	45.6	25.7	9.3	1.0
7.3	28.7	27.8	8.7	
	33.3	36.6	11.2	
4.0	25.3	44.6	9.0	
	18.4	13.0	18.0	4.0
17.3	39.2	37.5	8.0	1.5

イチゴ(採苗圃の子株)・ハダニ類

発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬
2015	60.0	83.3	66.7	50.0	75.0
2016	58.3	75.0	66.7	75.0	25.0
2017	40.0	50.0	25.0	16.7	41.7
2018	62.5	50.0	45.5	27.3	30.0
2019	25.0	58.3	8.3	8.3	9.1
2020	33.3	60.0	18.2	25.0	27.3
2021	50.0	16.7	36.4	8.3	54.5
2022	55.6	27.3	54.5	25.0	63.6
2023		75.0	90.0	41.7	72.7
2024	25.0	41.7	58.3	33.3	45.5
2025	0.0	33.3	33.3	41.7	50.0
平年値	45.5	53.7	47.0	31.1	44.4

寄生株率

4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬
13.3	23.8	16.8	15.0	21.8
31.9	21.3	13.5	29.3	7.3
2.4	46.3	32.7	25.0	29.2
19.2	16.4	23.2	5.0	24.7
12.0	9.1	4.0	1.0	8.0
16.0	20.0	15.0	1.7	4.0
29.0	32.0	3.5	2.0	32.5
9.2	9.3	10.7	14.7	18.9
	7.6	10.2	6.4	16.3
16.0	16.0	10.6	19.0	6.8
	4.5	11.0	18.4	14.3
16.6	20.2	14.0	11.9	16.9

イチゴ(採苗圃の子株)・アブラムシ類

発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬
2015	60.0	66.7	0.0	16.7	0.0
2016	41.7	58.3	33.3	20.0	41.7
2017	80.0	16.7	33.3	25.0	33.3
2018	12.5	63.6	18.2	9.1	30.0
2019	75.0	83.3	16.7	33.3	27.3
2020	83.3	90.0	45.5	8.3	45.5
2021	50.0	58.3	9.1	16.7	9.1
2022	88.9	45.5	54.5	33.3	18.2
2023		50.0	42.9	33.3	27.3
2024	100.0	58.3	41.7	25.0	27.3
2025	85.7	41.7	58.3	41.7	58.3
平年値	65.7	59.1	29.5	22.1	26.0

寄生株率

4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬
9.3	26.8		14.0	
18.8	18.9	11.0	17.0	4.8
42.0	22.0	10.5	9.3	25.5
12.0	6.9	4.0	12.0	24.7
9.0	17.6	19.0	7.5	12.0
6.0	21.8	14.0	17.0	5.4
7.5	13.7	6.0	7.0	4.0
7.3	7.2	21.3	18.0	3.0
	6.0	26.6	5.0	25.3
47.5	7.0	18.4	20.7	17.3
8.7	11.7	6.3	22.4	9.4
17.7	14.8	14.5	12.8	13.6

イチゴ(採苗圃の子株)・ハスモンヨトウ

発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
2022	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3
2023		0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3
2025	0.0	0.0	0.0	8.3	8.3
平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1

寄生株率

4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬
				1.3
				10.0
				1.0
				2.0
				2.7
				1.2
			0.3	1.0
-	-	-	-	3.0

イチゴ(本圃)・炭疽病

発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022	0.0							
2023	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	14.3	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025		30.0	41.7	16.7	9.1	9.1	0.0	8.3
平均値	0.0	11.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

発病株率

4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
	0.1						
	10.0	1.0					
	10.7	2.6	0.5	0.1	1.0		0.1
-	5.1	1.0	-	-	-	-	-

イチゴ(本圃)・うどんこ病(葉)

発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022	50.0							
2023	66.7	18.2	8.3	41.7	36.4	20.0	41.7	45.5
2024	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	9.1	9.1
2025		10.0	16.7	16.7	18.2	27.3	16.7	33.3
平均値	48.9	9.1	4.2	20.8	18.2	15.0	25.4	27.3

発病株率

4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
	13.6						
69.3	4.0	14.0	34.0	12.5	26	20.4	14
26.0					2.0	2.0	8.0
	8.0	6.0	35.0	28.0	12.0	8.0	24.0
36.3	4.0	14.0	34.0	12.5	14.0	11.2	11.0

イチゴ(本圃)・うどんこ病(果)

発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022	20.0							
2023	41.7	0.0	0.0	25.0	18.2	60.0	50.0	36.4
2024	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	18.2
2025		0.0	0.0	8.3	27.3	18.2	16.7	25.0
平均値	30.6	0.0	0.0	12.5	9.1	30.0	29.5	27.3

発病株率

4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
	17.0						
26.8			1.5	3.0	8.5	5.0	24.0
2.7						23.0	8.0
			2.0	1.7	3.0	16.0	11.3
15.5	-	-	1.5	3.0	8.5	14.0	16.0

イチゴ(本圃)・灰色かび病(果)

発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022	40.0							
2023	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	27.3
2024	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2
2025		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
平均値	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	22.7

発病果率

4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
	3.3						
3.0						4	5.3
1.0							8.0
							2.0
2.4	-	-	-	-	-	4.0	6.7

イチゴ(本圃)・ハダニ類

発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022	40.0							
2023	33.3	81.8	50.0	41.7	36.4	40.0	33.3	45.5
2024	10.0	42.9	36.4	33.3	55.6	50.0	36.4	45.5
2025		10.0	25.0	41.7	72.7	54.5	41.7	25.0
平均値	27.8	62.3	43.2	37.5	46.0	45.0	34.8	45.5

寄生株率

4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
	6.0						
19.0	24.9	35.7	16.4	12.5	10.0	25.5	22.8
6.0	20.7	19.0	30.7	36.8	20.4	35.5	40.4
	8.0	36.7	18.0	17.6	35.7	34.8	5.3
10.3	22.8	27.4	23.5	24.7	15.2	30.5	31.6

イチゴ(本圃)・アブラムシ類
発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022	10.0							
2023	58.3	45.5	25.0	25.0	27.3	40.0	58.3	45.5
2024	60.0	14.3	27.3	18.2	22.2	30.0	27.3	18.2
2025		60.0	50.0	66.7	36.4	36.4	33.3	33.3
平均値	42.8	29.9	26.1	21.6	24.7	35.0	42.8	31.8

寄生株率

4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
46.0							
12.3	15.2	4.7	3.3	12.0	6	8.6	8
6.3	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	8.0	25.0
	16.3	14.2	4.8	2.0	6.5	7.0	21.0
21.5	8.6	4.4	3.7	8.0	4.0	8.3	16.5

イチゴ(本圃)・アザミウマ類
発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022	80.0							
2023	83.3	0.0	8.3	16.7	9.1	10.0	33.3	45.5
2024	70.0	0.0	40.0	30.0	22.2	0.0	27.3	36.4
2025		0.0	41.7	25.0	18.2	27.3	16.7	41.7
平均値	77.8	0.0	24.2	23.3	15.7	5.0	30.3	40.9

寄生花率

4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
43.0							
30.0		2.0	2.0	2.0	6.0	40.0	24.4
25.7		17.5	16.0	2.0		5.3	10.5
		11.2	4.7	1.5	3.3	12.0	11.6
32.9	-	9.8	9.0	2.0	6.0	22.7	17.5

イチゴ(本圃)・コナジラミ類
発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022	10.0							
2023	25.0	27.3	16.7	25.0	9.1	10.0	25.0	18.2
2024	30.0	42.9	36.4	18.2	33.3	40.0	18.2	18.2
2025		50.0	33.3	33.3	27.3	36.4	25.0	33.3
平均値	21.7	35.1	26.5	21.6	21.2	25.0	21.6	18.2

寄生株率

4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2.0							
35.3	7.3	37.0	16.7	14.0	32	28	27
61.3	10.0	22.0	44.0	42.7	25.5	58.0	71.0
	18.0	16.5	18.0	12.3	21.5	42.7	42.0
32.9	8.7	29.5	30.3	28.3	28.8	43.0	49.0

イチゴ(本圃)・ハスモンヨトウ
発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022	0.0							
2023	0.0	9.1	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	28.6	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025		40.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均値	0.0	18.8	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

寄生株率

4月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	3月 下旬
	0.3	1.8					
	1.4	0.7					
	2.2	1.0					
-	0.8	1.3	-	-	-	-	-

(10) ブロッコリー

① 主要病害虫の発生状況

ブロッコリー 1,350ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
ハスモンヨトウ	平年：並	平年：並	90ha	4～5月どり栽培では、平年同様発生は認められなかった。11～12月どり栽培では、平年同様9月から発生を認め、平年並の発生量であった。1～2月どり栽培では、発生は認められなかった。	防除の徹底。
シロイチモジヨトウ	平年：並	平年：並	165ha	4～5月どり栽培では、平年同様発生は認められなかった。11～12月どり栽培では、平年同様9月から発生を認め、平年並の発生量であった。1～2月どり栽培では、平年同様11月に発生を認め、やや少ない発生量であった。	防除の徹底。
コナガ	平年：並	平年：やや少	18ha	4～5月どり栽培では、発生は認められなかった。11～12月どり栽培では、10月から発生を認め、平年並の発生量であった。1～2月どり栽培では、発生は認められなかった。	近年ブロッコリーでの発生は少ない。
ヨトウガ	平年：並	平年：やや多	39ha	4～5月どり栽培では、4月から発生を認め、やや多い発生量であった。11～12月どり及び1～2月どり栽培では、平年同様発生は認められなかった。	4月の高温。
オオタバコガ	平年：やや遅い	平年：やや多	30ha	4～5月どり栽培では、平年同様発生は認められなかった。11～12月どり栽培では、平年よりやや遅い10月から発生を認め、1～2月どり栽培では、平年同様11月から発生を認め、やや多い発生量であった。	7月下旬から10月にかけての高温少雨。

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実防除	延防除
ブロッコリー	1,350	ハスモンヨトウ	0	0	15	75	90	1,350	4,050
		シロイチモジヨトウ	30	30	15	90	165	1,350	4,050
		コナガ	0	0	0	18	18	1,350	2,700
		ヨトウガ	0	13	0	26	39	1,350	4,050
		オオタバコガ	0	0	0	30	30	1,350	4,050

③ 調査結果

ア 巡回調査

ブロッコリー・ハスモンヨトウ(破線より左は11-12月どり、右は1-2月どり)

発生圃場率

年度/月旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬
2015	13.0	12.5	20.0	29.2	0.0	0.0	0.0
2016	58.3	58.3	10.0	4.2	0.0	0.0	0.0
2017	4.2	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018	25.0	62.5	16.7	8.3	0.0	0.0	0.0
2019	8.7	25.0	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0
2020	8.3	58.3	29.2	4.2	0.0	0.0	0.0
2021	17.4	37.5	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	25.0	25.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2023	42.1	23.8	5.6	6.7	0.0	0.0	0.0
2024	38.5	80.0	13.3	17.6	0.0	0.0	0.0
2025	33.3	33.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	24.1	42.0	13.3	7.8	0.0	0.0	0.0

個体群数/100株

9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬
1.7	1.3	1.3	1.3			
1.9	5.1	1.0	1.0			
1.0	1.8					
1.8	2.0	1.5	1.0			
1.5	4.5	1.7	1.0			
1.0	7.5	2.0	5.0			
1.8	4.2	1.0				
10.7	0.6	1.0				
1.5	3.8	1.0	0.1			
24.0	3.4	0.6	3.7			
4.4	3.7	0.5				
4.7	3.4	1.2	1.9	-	-	-

ブロッコリー・シロイチモジヨトウ(破線より左は11-12月どり、右は1-2月どり)

発生圃場率

年度/月旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016	29.2	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017	25.0	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018	83.3	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2019	82.6	54.2	4.2	20.8	4.2	0.0	0.0
2020	70.8	37.5	8.3	25.0	8.3	0.0	0.0
2021	13.0	12.5	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	54.2	33.3	9.5	14.3	4.2	0.0	0.0
2023	42.1	28.6	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0
2024	61.5	33.3	13.3	11.8	0.0	5.9	0.0
2025	55.6	33.3	6.7	5.6	0.0	0.0	0.0
平年値	46.2	26.2	4.8	9.9	1.7	0.6	0.0

個体群数/100株

9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬
3.7	6.0					
2.1	3.1					
18.8	3.3	1.5				
25.7	13.5	1.0	1.0	1.0		
7.9	4.6	2.0	3.0	2.1		
14.3	1.1	2.0				
19.6	4.5	3.0	2.7	1.0		
12.2	2.7		0.3			
54.4	11.2	0.6	8.0		1.0	
16.2	6.5	1.0	0.2			
17.6	5.6	1.7	3.0	1.4	1.0	-

ブロッコリー・コナガ(破線より左は11-12月どり、右は1-2月どり)

発生圃場率

年度/月旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬
2015	13.0	8.3	10.0	20.8	12.5	4.5	0.0
2016	12.5	25.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2017	0.0	33.3	17.4	12.5	8.3	0.0	0.0
2018	8.3	25.0	29.2	16.7	12.5	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0
2020	4.2	4.2	0.0	8.3	4.2	0.0	0.0
2021	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	9.5	4.8	4.2	0.0	0.0
2023	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	5.6	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	5.2	9.6	8.0	6.7	4.2	0.5	0.0

虫数/10株

9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬
1.3	1.0	1.0	1.6	2.0	1.0	
1.0	1.2	1.0				
	1.3	1.0	1.3	1.0		
2.0	1.8	1.9	1.0	0.8		
		1.0	1.0			
1.0	1.0		1.5	8.0		
1.0						
0.0		0.1	0.1	2.0		
3.0						
1.0	1.0					
1.3	1.3	1.0	1.1	2.8	1.0	-

ブロッコリー・ヨトウガ(破線より左は11-12月どり、右は1-2月どり)

発生圃場率								発生株率							
年度/月旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	
2015	4.3	8.3	5.0	0.0	4.2	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	2.0				
2016	4.2	8.3	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.5	1.0					
2017	0.0	8.3	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0		1.5			1.0			
2018	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0						
2019	4.3	0.0	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	1.0		1.0	1.0				
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
2022	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		10.0						
2023	15.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0						
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
平年値	2.9	4.2	1.4	0.8	0.4	0.0	0.0	1.0	3.0	1.3	1.3	-	-	-	

ブロッコリー・オオタバコガ(破線より左は11-12月どり、右は1-2月どり)

発生圃場率								発生株率							
年度/月旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	9月 下旬	10月 下旬	11月 下旬	11月 下旬	12月 下旬	1月 下旬	2月 下旬	
2015	0.0	0.0	10.0	8.3	0.0	0.0	0.0			1.0	1.0				
2016	4.2	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	1.0			1.0				
2017	4.2	4.2	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0					
2018	0.0	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0		1.0		1.0				
2019	0.0	12.5	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0		2.0			1.0			
2020	0.0	4.2	4.1	0.0	0.0	0.0		1.0	1.0	1.0					
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
2022	0.0	0.0	9.5	4.8	0.0	0.0	0.0			1.0	1.0				
2023	5.3	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1						
2024	0.0	6.7	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	1.1					
2025	0.0	5.6	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0		1.0		1.0	1.0			
平年値	1.4	4.5	4.1	2.6	0.4	0.0	0.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	-	-	

ブロッコリー(4-5月どり)・コナガ

発生圃場率			虫数/10株	
年度/月旬	3月 下旬	4月 下旬	3月 下旬	4月 下旬
2015	0.0	16.7		3.7
2016	0.0	26.7		3.8
2017	0.0	22.2		1.5
2018	0.0	38.9		1.0
2019	0.0	0.0		
2020	0.0	11.1		0.3
2021	0.0	11.1		2.5
2022	0.0	0.0		
2023	0.0	6.7		2.0
2024	0.0	20.0		1.3
2025	0.0	0.0		
平年値	0.0	15.3	-	2.0

ブロッコリー(4-5月どり)・ヨトウガ

発生圃場率			発生株率	
年度/月旬	3月 下旬	4月 下旬	3月 下旬	4月 下旬
2015	0.0	0.0		
2016	0.0	0.0		
2017	0.0	0.0		
2018	0.0	0.0		
2019	0.0	0.0		
2020	0.0	0.0		
2021	0.0	0.0		
2022	0.0	0.0		
2023	0.0	13.3		1.0
2024	0.0	0.0		
2025	0.0	6.7		1.0
平年値	0.0	1.3	-	1.0

① 主要病害虫の発生状況

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
アザミウマ類	平年：並	平年：並	85ha	平年並の4月から発生し、9月にかけてやや多い発生量で推移した。	夏季の高温。
ハスモンヨトウ	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	例年本種の発生は少ない。
シロイチモジヨトウ	平年：やや早い	平年：やや多	12ha	平年よりやや早い7月から発生を認め、10月にかけてやや多い発生量で推移した。	夏季の高温。

作物名	(ha) 作付 面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実 防除	延 防除
アスパラガス	87	アザミウマ類	0	16	11	58	85	87	696
		ハスモンヨトウ	0	0	0	0	0	87	435
		シロイチモジヨトウ	0	0	0	12	12	87	435

年度/月 旬	4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
2015							
2016							
2017							
2018							
2019							
2020							
2021							
2022							
2023	71.4	94.4	77.8	77.8	44	35	38
2024	87.5	94.4	88.9	70.6	35.3	52.9	62.5
2025	53.8	88.9	58.8	76.5	35.3	43.8	25.0
平均值	79.5	94.4	83.3	74.2	39.9	44.1	50.0

4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
22.1	81.7	44.1	140.1	236	156	682
6.4	66.4	33.7	107.2	338.5	164.0	216.0
2.6	49.4	16.1	130.1	10.3	407.7	38.3
14.2	74.1	38.9	123.7	287.0	159.8	449.0

發生圍場率

年度/月旬	4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
2015							
2016							
2017							
2018							
2019							
2020							
2021							
2022							
2023	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	12.5
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均值	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.3

発生圃場率

年度/月旬	4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
2015							
2016							
2017							
2018							
2019							
2020							
2021							
2022							
2023	0.0	0.0	0.0	0	0	6	0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	5.9	11.8	12.5	12.5
平均值	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0

寄生株率

寄生懷孕						
4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
					1	1.5
					1.0	1.5

寄生株率

4月 下旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬	10月 下旬
					1	
			1.0	2.0	0.1	1
					1.0	

5)花き病害虫発生予察

(1) 巡回調査

作物・作型	調査地点	調査時期	ほ場数
夏・秋ギク 露地栽培 (10月どり)	小豆島町池田	6下、7下、8下、9下	9
小ギク 露地栽培	三豊市詫間町松崎	5下、6下、7下、8下、9下	12

(2) 夏秋キク

① 主要病害虫の発生状況

夏秋キク 44ha

病害虫名	発生時期	発生量	発生面積	発生経過の概要	発生要因の解析
白さび病	平年：並	平年：やや少	10ha	小ギクでは、5月に発生し、やや多い発生量であったが、その後発生は認められずやや少ない発生量となった。輪ギクでは、6月に発生したが、その後発生は認められずやや少ない発生量となった。	7月以降の高温。防除の徹底。
アブラムシ類	平年：やや遅い	平年：やや少	3ha	小ギクでは、8月に発生し、やや多い発生量であったが、その後発生は認められず平年並の発生量となった。輪ギクでは、6月から発生し、平年並の発生量となった。	7月、8月の高温。
アザミウマ類	平年：並	平年：やや多	13ha	小ギクでは、平年同様5月から発生し、やや多い発生量で推移した。輪ギクでは、平年同様6月から発生し、やや多い発生量で推移した。	7月以降の高温。防除の徹底。
ハダニ類	平年：並	平年：並	13ha	小ギクでは、6月から発生し平年並の発生量で推移した。輪ギクでは、平年同様8月から発生し、平年並の発生量で推移した。	
ハスモンヨトウ	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	例年キクでの発生は少ない。
シロイチモジヨトウ	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	例年キクでの発生は少ない。
ヨトウガ	平年：－	平年：並	0ha	発生は認められなかった。	例年キクでの発生は少ない。
オオタバコガ	平年：やや遅い	平年：やや少	7ha	小ギクでは、平年よりやや遅い7月から発生し、平年並の発生量で推移した。輪ギクでは、平年よりやや遅い7月から発生し、9月にかけて増加しやや少ない発生量で推移した。	防除の徹底。

② 病害虫の程度別発生面積及び防除面積

作物名	(ha) 作付 面積	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)	
			甚	多	中	少	合計	実 防除	延 防除
夏秋キク	44	白さび病	2	3	0	5	10	44	167
		アブラムシ類	0	0	1	2	3	44	66
		アザミウマ類	8	0	2	3	13	44	158
		ハダニ類	0	8	4	1	13	44	176
		ハスモンヨトウ	0	0	0	0	0	44	176
		シロイチモジヨトウ	0	0	0	0	0	44	132
		ヨトウガ	0	0	0	0	0	44	132
		オオタバコガ	0	0	1	6	7	44	176

③調査結果

ア 巡回調査

小ギク・白さび病

発生品種率

年度/月旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	16.7	8.3	33.3	0.0	0.0
2016	18.2	66.7	33.3	27.3	
2017	41.7	0.0	8.3	8.3	0.0
2018	82.4	58.8	64.7	43.8	50.0
2019	43.8	16.7	0.0	8.3	20.0
2020	58.3	25.0	33.3	27.3	20.0
2021	44.4	55.6	55.6	37.5	0.0
2022	90.9	54.5	0.0	0.0	0.0
2023	85.7	75.0	100.0	37.5	0.0
2024	85.7	100.0	42.9	0.0	0.0
2025	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	56.8	46.1	37.1	19.0	10.0

発病葉率

5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
0.7	1.5	1.4		
0.8	35.7	33.3	3.4	
9.0		10.0	5.0	
7.6	42.8	9.5	3.0	2.7
3.0	1.5		1.0	9.5
39.8	8.3	33.0	1.7	8.0
40.0	39.2	18.8	2.7	
69.5	11.2			
40.0	41.7	52.0	20.0	
30.8	23.1	15.0		
34.2				
24.1	22.8	21.6	5.3	6.7

小ギク・アブラムシ類(葉)

発生品種率

年度/月旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016	0.0	0.0	0.0	0.0	
2017	8.3	16.7	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2020	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	22.2	11.1	0.0	0.0
2022	0.0	9.1	0.0	9.1	0.0
2023	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0
平年値	8.2	7.7	1.1	0.9	1.9

250葉当たり虫数

5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
12.0	1.5			
				1.0
1192.2				
	5.0	0.1		
	2.0		50.0	
1.0				
3.3	30.0			
			10.0	
302.1	9.6	0.1	50.0	1.0

小ギク・アブラムシ類(穂)

発生品種率

年度/月旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016	0.0	8.3	0.0	18.2	
2017	0.0	41.7	0.0	0.0	0.0
2018	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0
2019	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
2020	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	14.3	28.6	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3
平年値	2.8	10.4	3.7	1.8	0.0

小ギク・アザミウマ類被害

発生品種率

年度/月旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2016	100.0	75.0	83.3	100.0	
2017	100.0	100.0	91.7	66.7	55.6
2018	58.8	76.5	70.6	64.7	33.3
2019	100.0	100.0	100.0	33.3	30.0
2020	100.0	100.0	16.7	8.3	80.0
2021	88.9	11.1	11.1	25.0	100.0
2022	45.5	90.9	72.7	63.6	77.8
2023	42.9	50.0	37.5	0.0	0.0
2024	57.1	100.0	71.4	100.0	100.0
2025	100.0	66.7	66.7	66.7	66.7
平年値	79.3	80.4	65.5	56.2	64.1

小ギク・ハダニ類

発生品種率

年度/月旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016	0.0	0.0	0.0	9.1	
2017	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2018	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9
2019	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
2022	0.0	0.0	0.0	63.6	66.7
2023	57.1	0.0	100.0	87.5	0.0
2024	57.1	85.7	71.4	42.9	100.0
2025	0.0	50.0	66.7	100.0	83.3
平年値	12.3	8.6	17.1	20.9	31.4

25穂当たり虫数

5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
	1.0		5.0	
	64.6			
8.5	1.0			
		1.0		
7.5				
	4.7			
8.0				
	30.0	10.0		
				4.5
8.0	20.3	5.5	5.0	-

被害葉率

5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
32.7	34.3	22.1	13.5	16.5
66.9	21.1	13.8	35.7	
73.5	45.8	17.5	13.7	2.0
17.7	38.7	20.9	15.5	2.5
30.8	54.3	18.0	5.0	8.3
45.9	10.8	3.0	4.0	28.0
30.9	0.1	2.0	2.8	30.0
27.8	5.0	2.0	0.9	38.7
3.7	2.0	1.9		
1.8	3.3	37.0	50.9	52.6
77.5	2.3	1.6	4.8	56.8
33.2	21.5	13.8	15.8	22.3

250葉当たり虫数

5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
			5.0	
1.0				
			5.0	5.0
				51.0
				30.0
			1885.7	1267.5
227.0		734.4	491.1	
38.9	261.7	273.4	80.0	400.0
	2.8	568.8	793.8	213.0
89.0	261.7	503.9	493.4	350.7

小ギク・ヨトウ類

発生品種率

年度/月旬	5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
2016	0.0	24.0	0.0	9.1	
2017	0.0	8.3	16.7	8.3	22.2
2018	0.0	5.9	23.5	17.6	16.7
2019	0.0	0.0	8.3	0.0	30.0
2020	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
2021	0.0	33.3	33.3	25.0	0.0
2022	0.0	36.4	9.1	72.7	0.0
2023	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
2024	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0
2025	0.0	0.0	33.3	16.7	0.0
平年値	0.0	13.3	11.6	13.3	18.2

被害葉率

5月 下旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
		1.0		
	1.3		2.0	
	0.1	8.0	4.0	8.0
	0.3	1.6	1.3	5.0
		0.1		1.0
				1.5
	1.7	1.3	3.5	
	1.6	0.1	1.3	
	0.1			
				0.1
		0.6	1.0	
-	0.9	2.0	2.4	3.1

輪ギク・白さび病

発生品種率

年度/月旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	50.0	12.5	0.0	40.0
2016	50.0	0.0		
2017	60.0	10.0	0.0	0.0
2018	62.5	0.0	0.0	0.0
2019	42.9	12.5	37.5	25.0
2020	40.0	40.0	30.0	9.1
2021	54.5	40.0	0.0	50.0
2022	62.5	22.2	0.0	0.0
2023	100.0	33.3	0.0	0.0
2024	50.0	0.0	0.0	0.0
2025	25.0	0.0	0.0	0.0
平年値	57.2	17.1	7.5	13.8

発病葉率

6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
12.0	10.0		6.3
4.7			
20.0	5.2		
4.9			
23.7	3.0	9.0	10.5
28.8	26.0	12.3	1.0
24.5	11.8		0.8
28.8	3.5		
38.3	8.3		
20.3			
0.1			
20.6	9.7	10.7	4.6

輪ギク・アブラムシ類(葉)

発生品種率

年度/月旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0	0.0
2016	0.0	16.7	0.0	0.0
2017	0.0	0.0	0.0	0.0
2018	25.0	0.0	14.3	0.0
2019	0.0	0.0	12.5	25.0
2020	10.0	0.0	0.0	9.1
2021	0.0	0.0	0.0	37.5
2022	0.0	0.0	0.0	22.2
2023	16.7	0.0	11.1	0.0
2024	16.7	0.0	0.0	0.0
2025	0.0	0.0	10.0	10.0
平年値	6.8	1.7	3.8	9.4

250葉当たり虫数

6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
	1.0		
1.8		2.0	
		25.0	10.5
1.0			25.0
			236.7
			25.5
1.0		250.0	
10.0			
		5.0	37.5
3.5	1.0	92.3	74.4

輪ギク・アブラムシ類(穂)

発生品種率

年度/月旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0	0.0
2016	0.0	16.7	42.9	28.6
2017	0.0	0.0	0.0	25.0
2018	25.0	9.1	57.1	57.1
2019	0.0	0.0	37.5	25.0
2020	0.0	0.0	36.4	9.1
2021	0.0	0.0	0.0	62.5
2022	0.0	0.0	0.0	11.1
2023	0.0	0.0	22.2	11.1
2024	0.0	10.0	0.0	22.2
2025	0.0	0.0	10.0	20.0
平年値	2.5	3.6	19.6	25.2

25穂当たり虫数

6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
	6.0	26.0	22.5
			4.3
2.5	1.0	43.3	6.3
		90.0	7.5
		6.5	20.0
			41.9
			400.0
		245.0	5.0
	72.0		7.1
		21.0	8.6
2.5	26.3	82.2	57.2

輪ギク・アザミウマ類被害
発生品種率

年度/月旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	66.7	87.5	25.0	40.0
2016	50.0	83.3	42.9	57.1
2017	80.0	90.0	50.0	75.0
2018	50.0	63.6	14.3	0.0
2019	85.7	50.0	50.0	0.0
2020	90.0	20.0	40.0	9.1
2021	27.3	40.0	30.0	12.5
2022	50.0	100.0	11.1	44.4
2023	80.0	44.4	33.3	22.2
2024	50.0	30.0	0.0	22.2
2025	50.0	60.0	20.0	50.0
平年値	63.0	60.9	29.7	28.3

被害葉率

6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
30.0	11.1	0.1	7.5
34.7	6.2	5.7	12.3
35.4	3.2	4.6	3.6
0.8	13.0	2.0	
9.3	0.4	1.8	
13.8	0.1	0.8	20.0
2.3	1.3	3.7	1.0
25.5	7.1	2.0	3.3
10.5	27.5	17.0	1.0
2.3	10.0		0.3
0.6	7.3	30.0	41.1
16.5	8.0	4.2	6.1

輪ギク・ハダニ類
発生品種率

年度/月旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	0.0	0.0	0.0	0.0
2016	0.0	0.0	0.0	0.0
2017	0.0	0.0	10.0	62.5
2018	0.0	0.0	42.9	0.0
2019	0.0	0.0	0.0	50.0
2020	0.0	0.0	10.0	81.8
2021	0.0	0.0	10.0	25.0
2022	0.0	0.0	22.2	77.8
2023	0.0	0.0	44.4	55.6
2024	0.0	10.0	40.0	55.6
2025	0.0	0.0	80.0	50.0
平年値	0.0	1.0	18.0	40.8

250葉当たり虫数

6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
		1.6	19.4
		834.0	
			468.8
		5.0	321.8
		3250.0	125.0
		562.5	100.1
		593.0	160.0
	75.0	382.6	94.9
		123.8	307.3
-	75.0	804.1	184.3

輪ギク・ヨトウ類
発生品種率

年度/月旬	6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
2015	0.0	37.5	12.5	0.0
2016	33.3	66.7	85.7	75.0
2017	0.0	90.0	50.0	25.0
2018	0.0	36.4	57.1	71.4
2019	0.0	62.5	12.5	37.5
2020	20.0	20.0	100.0	54.5
2021	0.0	50.0	90.0	25.0
2022	25.0	66.7	66.7	22.2
2023	16.7	55.6	77.7	55.6
2024	16.7	10.0	80.0	22.2
2025	0.0	10.0	50.0	20.0
平年値	11.2	49.5	63.2	38.8

被害葉率

6月 下旬	7月 下旬	8月 下旬	9月 下旬
	1.7	5.0	
1.1	5.8	9.0	2.8
	6.1	6.8	2.0
	0.7	2.5	2.8
	0.4	1.0	0.2
1.5	0.1	1.8	14.8
	0.5	4.9	1.0
1.0	3.5	3.7	21.5
0.1	2.4	5.6	1.6
1.0	3.0	1.9	25.0
	0.1	3.0	4.0
0.9	2.4	4.2	8.0

6) ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウのフェロモントラップ調査

設 置 場 所	対 象 害 虫	調 査 期 間
三木町氷上	ハスモンヨトウ	5/1～12/31 毎日
高松市香川町浅野	ハスモンヨトウ	
坂出市青海町	ハスモンヨトウ	
善通寺市生野町	シロイチモジヨトウ	
観音寺市大野原町	シロイチモジヨトウ	

(1) 各地区シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ調査

① シロイチモジヨトウ


月・半旬		善通寺市生野町		観音寺市大野原町	
		2025	平均	2025	平均
5月	1	2	0.0	1	10.2
	2	2	0.2	4	7.2
	3	0	0.8	10	12.4
	4	3	1.0	6	11.8
	5	2	0.6	3	21.4
	6	3	1.0	17	38.2
6月	1	0	1.2	19	39.6
	2	0	2.2	18	40.8
	3	3	4.0	36	72.4
	4	5	3.6	48	110.0
	5	3	7.8	105	153.4
	6	1	2.6	70	280.4
7月	1	3	15.8	82	275.0
	2	5	18.0	147	285.6
	3	6	16.6	189	352.6
	4	7	6.0	435	331.0
	5	11	4.0	212	217.6
	6	10	4.4	221	282.6
8月	1	11	14.4	280	302.8
	2	6	13.0	483	533.0
	3	7	6.0	798	599.6
	4	5	4.4	952	558.6
	5	0	8.0	910	837.8
	6	8	8.2	550	1,198.8
9月	1	10	7.2	997	853.2
	2	11	12.0	434	880.0
	3	10	11.8	578	919.2
	4	16	23.0	571	748.4
	5	21	18.2	593	660.2
	6	25	10.0	832	663.0
10月	1	21	6.8	958	728.2
	2	14	6.2	991	634.2
	3	16	8.6	402	419.8
	4	9	8.8	307	228.6
	5	2	8.6	193	243.2
	6	8	7.6	190	225.6
11月	1	14	6.0	48	127.0
	2	19	4.6	20	70.4
	3	25	2.6	5	27.0
	4	18	4.8	15	24.0
	5	14	6.0	7	5.8
	6	2	3.4	0	10.2
12月	1	3	1.4	0	5.8
	2	1	1.0	0	1.4
	3	0	0.6	0	0.2
	4	0	0.0	0	0.0
	5	0	0.0	0	0.0
	6	0	0.0	0	0.0
計		362	303	12,737	14,048

② ハスモンヨトウ


月・半旬		高松市香川町		三木町		坂出市青海町	
		2025	平年	2025	平年	2025	平年
5月	1	2	1.1	0	0.5	1	7.8
	2	0	1.0	0	1.4	5	5.2
	3	13	1.6	1	2.1	6	10.3
	4	4	3.9	1	4.9	12	14.7
	5	11	5.5	18	12.1	30	16.7
	6	22	4.5	23	10.7	28	19.0
6月	1	1	3.0	3	9.8	7	14.8
	2	1	3.5	2	9.5	10	15.5
	3	4	5.5	2	23.2	21	25.0
	4	8	7.6	7	33.6	42	40.9
	5	15	8.3	6	26.8	60	45.1
	6	25	11.3	9	21.4	89	51.0
7月	1	2	11.6	8	36.3	59	48.4
	2	4	12.2	10	22.3	47	44.5
	3	10	10.7	23	30.5	25	44.2
	4	9	16.0	6	21.3	7	40.9
	5	12	19.0	7	25.7	3	39.3
	6	14	40.4	12	59.6	51	64.7
8月	1	1	34.0	19	53.2	39	69.3
	2	15	52.4	29	78.2	52	80.7
	3	17	36.0	1	46.4	26	72.7
	4	4	27.9	1	33.2	8	56.1
	5	14	36.8	1	76.7	15	68.4
	6	11	89.0	12	193.8	41	102.6
9月	1	7	72.9	44	175.4	18	122.5
	2	16	65.0	14	180.7	8	109.3
	3	5	46.7	16	141.5	7	96.0
	4	22	52.2	16	116.2	7	115.3
	5	26	48.7	44	101.5	8	120.7
	6	96	65.1	50	139.8	77	174.7
10月	1	14	129.8	10	245.6	119	274.1
	2	30	127.4	21	285.5	123	268.3
	3	32	173.4	63	279.0	138	234.0
	4	181	163.4	107	256.8	202	236.0
	5	124	196.0	118	278.6	249	193.1
	6	185	268.3	115	373.6	344	292.7
11月	1	118	228.2	53	239.3	210	255.4
	2	154	245.2	79	285.5	198	277.4
	3	107	189.3	35	207.7	207	221.5
	4	167	251.3	31	262.3	266	198.0
	5	93	144.8	12	151.1	324	151.9
	6	48	77.3	13	59.9	198	87.0
12月	1	24	32.4	2	32.5	46	64.0
	2	22	16.0	0	10.6	25	8.8
	3	3	9.3	0	6.3	9	6.0
	4	1	0	0	0	6	5
	5	0	0	0	0	5	1
	6	0	0	0	0	0	0
計		1,694	3,047	1,044	4,666	3,478	4,518

①シロイチモジヨトウ

ア 善通寺市生野町




イ 観音寺市大野原町




②ハスモンヨトウ


ア 高松市香川町



イ 三木町



ウ 坂出市青梅町



2 病害虫の診断及び生態調査

1) 耐性菌検定調査事業

イチゴの炭疽病に登録のあるベノミル、ジェトフェンカルブ、フルジオキシニルに対する感受性について、2025年に採取した44菌株について検定を行ったところ、ベノミル耐性でジェトフェンカルブ耐性が32菌株(72.7%)と高頻度で認められ、フルジオキシニル耐性菌は3菌株(6.8%)であった。また、本試験で供試した菌株についてPCRにより種を確認したところ、すべて *Colletotrichum gloeosporioides* 種複合体の一種である *Colletotrichum fructicola* であった。

2) 抵抗性害虫調査事業

8種殺ダニ剤に対するミカンハダニの薬剤感受性検定を行ったところ、コロマイト水和剤、アグリメック乳剤、ダニゲッターフロアブル、ダニオーテフロアブル、パロックフロアブル、カネマイトフロアブル、ダニコングフロアブルについては防除効果が高かったが、ダニトロンフロアブルについては県内全域で防除効果が低かった。

3) 保毒虫検定

ヒメトビウンカのイネ縞葉枯ウイルス保毒虫率は、全地点平均で2.5%であり、平年と比べ低かった。

3 病害虫発生予察情報

1) 病害虫発生の現況報告

有害動植物発生予察現況報告：4月～3月

前月の病害虫発生量及び当月の予想発生量等を報告した。

【有害動植物発生予察現況報告の報告日】

有害動植物発生予察現況報告			
報告日	備 考	報告日	備 考
4月9日	普通作、果樹、野菜	10月9日	果樹、野菜
5月9日	普通作、果樹、野菜	11月7日	果樹、野菜
6月5日	普通作、果樹、野菜、花き	12月5日	野菜
7月4日	普通作、果樹、野菜、花き	2月6日	野菜
8月8日	普通作、果樹、野菜、花き	3月4日	野菜
9月5日	普通作、果樹、野菜、花き		

2) 病害虫発生予察情報等の提供

(1) 病害虫発生予報(向こう1か月間の病害虫発生動向)

番 号	発表日	作 物 及 び 病 害 虫 名
第1号	4/7	4月の予報 (作物及び病害虫名は、次頁表のとおり)
第2号	5/2	5月の予報 (//)
第3号	6/3	6月の予報 (//)
第4号	7/1	7月の予報 (//)
第5号	8/4	8月の予報 (//)
第6号	9/2	9月の予報 (//)
第7号	10/7	10月の予報 (//)
第8号	11/4	11月の予報 (//)
第9号	12/2	12月の予報 (//)
第10号	2/3	2月の予報 (//)
第11号	3/2	3月の予報 (//)

病虫害発生予報の発表状況（令和7年度）

作物名	4月		5月		6月		7月		8月	
	病害虫名	予想発生量	病害虫名	予想発生量	病害虫名	予想発生量	病害虫名	予想発生量	病害虫名	予想発生量
水 稲			イネミズゾウムシ	並	葉いもち ヒメトビウンカ 縞葉枯病 イネミズゾウムシ	やや多 やや多 並 やや少	葉いもち (早・短期栽培) (普通期栽培) 穂いもち (早・短期栽培) 斑点米カメムシ類 ツマグロヨコバイ セジロウンカ ヒメトビウンカ 縞葉枯病	並 並 やや少 やや多 並 並 並 やや少	葉いもち (普通期栽培) 穂いもち (早・短期栽培) (普通期栽培) 紋枯病 (早・短期栽培) (普通期栽培) もみ枯細菌病 ごま葉枯病 セジロウンカ トビロウンカ ツマグロヨコバイ コブノメイガ (普通期栽培) 斑点米カメムシ類	並 少 並 やや少 やや多 やや少 やや少 やや少 多
	赤かび病 アブラムシ類	並 並	赤かび病 黒銹病 裸黒銹病 アブラムシ類	やや多 並 並 並						
カンキツ			黒点病 かいよう病 灰色かび病 アブラムシ類 ミカンハダニ	やや少 並 並 やや少 多	そうか病 黒点病 カイガラムシ類(ヤノ ネカイガラムシ、ナシ マルカイガラムシ) ミカンハダニ アブラムシ類	並 並 並 やや多 やや少	そうか病 黒点病 ミカンハダニ ミカンサビダニ ゴマダラカミキリ ミカンハモグリガ アザミウマ類 アブラムシ類	少 やや少 多 やや多 並 やや多 並 やや少	そうか病 黒点病 ミカンハダニ ミカンサビダニ ミカンハモグリガ	やや少 やや少 やや多 並 並
	せん孔細菌病 うどんこ病 ナシヒメシクイ	やや少 やや少 やや多	せん孔細菌病 灰星病 モモハモグリガ アブラムシ類 ナシヒメシクイ	並 並 少 並 並	せん孔細菌病 果実腐敗性病害 (灰星病、ホモフス蟻蟻等) 褐さび病 アブラムシ類 モモハモグリガ ナシヒメシクイ モモノゴダラノメイガ	やや少 並 並 やや多 少 並 やや少	せん孔細菌病 褐さび病 ハダニ類 モモハモグリガ ナシヒメシクイ モモノゴダラノメイガ	やや少 やや少 やや多 少 並 並	せん孔細菌病 ハダニ類 ナシヒメシクイ	やや少 やや多 やや多
カ キ	炭疽病 フジコナカイガラムシ	並 並	炭疽病 うどんこ病 フジコナカイガラムシ	並 並 並	炭疽病 うどんこ病 落葉病 カキノヘタムシガ フジコナカイガラムシ	並 やや多 並 やや少 やや少	炭疽病 落葉病 うどんこ病 カキノヘタムシガ フジコナカイガラムシ	並 並 並 並 やや多	炭疽病 うどんこ病 カキノヘタムシガ フジコナカイガラムシ	やや少 並 やや少 やや多
			べと病	やや少	べと病	並	べと病	やや少	べと病	やや少
果樹の 共通害虫	クワゴマダラヒトリ ハマキムシ類 カメムシ類	並 並 並	クワゴマダラヒトリ カメムシ類 ハマキムシ類	やや少 やや少 やや多	カメムシ類 ハマキムシ類	やや少 やや多	カメムシ類 吸蛾類 (アカエグリバ、 ヒメエグリバ)	やや少 並	カメムシ類 吸蛾類	やや少 やや多
レタス	灰色かび病 菌核病 べと病 アブラムシ類	少 少 少 並								
露地 キュウリ							べと病 炭疽病 褐斑病 うどんこ病 斑点細菌病 モザイク病 ミナミキイロアザミウマ アザミウマ類(キアザミ ウマ、幼キイロアザミウ マ) アブラムシ類 ハダニ類	やや少 やや少 やや少 少 並 やや多 やや多 やや多 並	べと病 炭疽病 褐斑病 うどんこ病 斑点細菌病 モザイク病 ミナミキイロアザミウマ アザミウマ類 アブラムシ類 ハダニ類	並 並 やや少 やや多 少 やや少 並 並 並
	べと病 腐敗病 ネギアザミウマ	やや少 やや少 並	べと病 腐敗病 ネギアザミウマ	少 やや少 やや多						
ニンニク	春腐病 さび病 ネギアザミウマ	やや少 やや少 やや多	春腐病 さび病 ネギアザミウマ	やや少 少 やや多						
青ネギ					疫病 さび病 べと病 軟腐病 ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	並 並 やや多 並 やや多 やや少	黒斑病 疫病 軟腐病 ネギハモグリバエ ネギアザミウマ	並 やや少 やや少 やや多 やや多	疫病 軟腐病 ネギハモグリバエ ネギアザミウマ	やや少 並 やや少 やや多 やや多
	(施設本圃) うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類 アザミウマ類	並 並 やや多 やや多 やや多 やや多	(施設本圃) うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類 アザミウマ類	やや少 やや多 やや多 やや多	(育苗床) 炭疽病 うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類	やや多 やや少 やや多 並	(育苗床) 炭疽病 うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類	(育苗床) 炭疽病 アブラムシ類 ハダニ類	やや多 やや多 やや多 やや多	
ブロッコリー	花蕾腐敗病 べと病 アブラムシ類	やや少 やや少 並								
アスパラガス			ネギアザミウマ ハダニ類 アブラムシ類	やや多 やや多 やや多	褐斑病 ネギアザミウマ ハダニ類 アブラムシ類	やや多 やや多 やや多 やや多	褐斑病 ネギアザミウマ ハダニ類 アブラムシ類	やや少 やや多 やや多 やや多	褐斑病 ネギアザミウマ アブラムシ類 ハダニ類	並 やや多 並 やや多
露地キク					白さび病	やや多	白さび病 アブラムシ類 ハダニ類 アザミウマ類	少 やや多 やや多 やや多	白さび病 アブラムシ類 ハダニ類 アザミウマ類	やや少 並 やや多 並
野菜、花き の共通害虫	コナガ	やや少			オオタバコガ シロイチモジヨトウ コナガ	多 やや多 やや多	シロイチモジヨトウ タバコガ類(タバコガ、オ オタバコガ)	やや多 やや多	シロイチモジヨトウ タバコガ類	やや多 やや多

病害虫発生予報の発表状況（令和7年度）

作物名	9月		10月		11月		12月		2月		3月	
	病害虫名	予想発生量	病害虫名	予想発生量	病害虫名	予想発生量	病害虫名	予想発生量	病害虫名	予想発生量	病害虫名	予想発生量
水 稲	穂いもち 紋枯病 斑点米カメムシ類 トビイロウンカ	やや多 やや多 並 やや少										
カンキツ	黒点病 かんよう病 ミカンハダニ ミカンサビダニ アブラムシ類 アザミウマ類	やや少 やや少 やや多 やや多 並 並	貯蔵病害（緑か び病、青かび病） ミカンハダニ	並 並	貯蔵病害（緑か び病、青かび病）	やや多	カイガラムシ類 （ヤノネカイガラ ムシ、ナシマルカイガ ラムシ等） ミカンハダニ	並 並				
モ モ	せん孔細菌病 ハダニ類 ナシヒメシロウキ	やや少 やや多 やや多					カイガラムシ類 （クワシロカイガラ ムシ、ナシマルカイ ガラムシ等）	並			縮葉病 せん孔細菌病	やや少 やや少
カ キ	炭疽病 フジナカイガラムシ	やや少 やや多	炭疽病	やや多			フジナカイガラムシ カキノヘタムシガ	並 やや少				
ブドウ	べと病	やや少										
キウイ フルーツ									クワシロカイガラムシ	並		
果樹の 共通害虫	カメムシ類 吸蛾類	並 多	カメムシ類 吸蛾類	やや多 多								
レタス					灰色かび病 菌核病 斑点細菌病 モザイク病 アブラムシ類	並 並 並 並 やや多	灰色かび病 菌核病 腐敗病 斑点細菌病 モザイク病	やや少 やや少 やや少 やや少 並	灰色かび病 菌核病 べと病 疫病 腐敗病 斑点細菌病 モザイク病	少 少 少 少 やや少 少 並	灰色かび病 菌核病 べと病 疫病 腐敗病 斑点細菌病 モザイク病	やや少 並 やや少 やや少 やや少 やや少 やや少
露地 キュウリ	べと病 炭疽病 褐斑病 うどんこ病 斑点細菌病 モザイク病 ミナミキイロアザミウマ アブラムシ類 ハダニ類	やや少 やや少 やや少 やや少 少 やや少 並 やや多 やや少										
ニンジン			黒葉枯病 萎黄病 ハモクグリハエ類	やや少 やや少 やや少	黒葉枯病	並						
タマネギ									べと病 白色疫病 ネギアザミウマ	やや少 少 並	べと病 白色疫病 腐敗病 ネギアザミウマ	やや少 やや少 やや少 多
ニンニク											春腐病 さび病 ネギアザミウマ	やや少 やや少 多
青ネギ	疫病 軟腐病 ネギハモグリハエ ネギアザミウマ	やや少 やや少 やや少 やや多	軟腐病 疫病 ネギハモグリハエ ネギアザミウマ	やや多 並 並 やや多								
キャベツ			黒腐病 べと病 アブラムシ類	並 並 並	黒腐病 べと病 菌核病 アブラムシ類	並 並 並 並						
イチゴ	（育苗床） 炭疽病 うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類	多 並 並 やや多	（施設本圃） 炭疽病 うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類	並 やや多 やや多 やや多	（施設本圃） うどんこ病 アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類	並 やや多 やや多 やや多	（施設本圃） うどんこ病 アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類	並 並 並 並	（施設本圃） うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類 アザミウマ類	並 並 並 並 やや多 並	（施設本圃） うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類 アザミウマ類	並 並 やや多 やや多 やや多 やや多
ブロッコリー			黒腐病 べと病 アブラムシ類	並 並 並	黒腐病 べと病 菌核病 アブラムシ類	並 並 並 やや少	黒腐病 花蕾腐敗病 べと病 菌核病	やや少 やや少 やや少 やや少	黒腐病 花蕾腐敗病 べと病 菌核病	少 少 やや少 やや少	黒腐病 花蕾腐敗病 べと病 菌核病	やや少 やや少 並 やや少
アスパラガス	褐斑病 ネギアザミウマ アブラムシ類 ハダニ類	やや少 やや多 並 やや多	褐斑病 ネギアザミウマ ハダニ類 アブラムシ類	並 やや多 やや多 やや多							ネギアザミウマ	やや多
露地キク	白さび病 アブラムシ類 ハダニ類 アザミウマ類	並 並 やや多 やや多	白さび病 アブラムシ類 アザミウマ類 ハダニ類	やや少 並 やや多 やや多								
野菜、花きの 共通害虫	ハスモンヨトウ シロイチモンジトウ タバコガ類（タバ コガ、オオタバコガ）	並 やや多 やや多	ハスモンヨトウ シロイチモンジトウ コナガ類 タバコガ類（タバ コガ、オオタバコガ）	並 多 少 やや多	ハスモンヨトウ シロイチモンジトウ コナガ タバコガ類（タバ コガ、オオタバコガ）	やや多 やや多 並 やや多	ハスモンヨトウ コナガ タバコガ類（主 にオオタバコガ）	並 やや少 並				

(2) 警報(病害虫が激発し、緊急に防除が必要なもの)

発表はありません

(3) 注意報(病害虫が多発しており防除が必要なもの)

番 号	発表日	作 物 及 び 病 害 虫 名
第 1 号	5 / 19	ナス、トマト、ミニトマト、キュウリ、スイートコーン、オクラ、キク、カーネーション等 オオタバコガ

(4) 特殊報(新病害虫発生など、通常と異なる発生状況の場合の情報)

番 号	発表日	作 物 及 び 病 害 虫 名
第 1 号	8 / 19	カンキツ、キウイフルーツ、オウトウ、ツバキ チュウゴクアミガサハゴロモ

(5) 調査速報

番 号	発表日	作 物 及 び 病 害 虫 名
第 1 号	6 / 13	水稻 ヒメトビウンカのイネ縞葉枯ウイルス保毒虫率検定 (結果の速報)
第 2 号	9 / 26	野菜、花き類 (ネギ、レタス、ブロッコリー、アスパラガス、パセリ、キクなど) シロイチモジヨトウ
第 3 号	2 / 17	イチゴ イチゴ炭疽病菌の薬剤感受性検定 (結果の速報)
第 4 号	3 / 19	ミカンハダニの薬剤感受性検定 (結果の速報)

(6) 技術情報

発表日	作 物 及 び 病 害 虫 名
5 / 19	コナガ、シロイチモジヨトウの発生状況に注意してください
5 / 23	カキノヘタムシガの防除適期は5月30日頃です。
6 / 11	イネいもち病 (葉いもち) の多発生に注意!
1 / 21	スクミリンゴガイ (ジャンボタニシ) の冬季防除を徹底しましょう!
2 / 13	ブロッコリー黒すす病の耐性菌に注意!
3 / 17	果樹カメムシ類の発生は「やや多め・早め」です!

(7) 令和7年産 麦類 赤かび病に関する情報

番 号	第 1 号	第 2 号	第 3 号	第 4 号	第 5 号
発表日	3 / 19	3 / 28	4 / 7	4 / 18	4 / 25

3) 予察灯の調査及びウンカ類飛来状況報告

(1) 予察灯の調査

100Wの高圧水銀灯を設置し、主要害虫の日別誘殺数を調査した。

設置場所：綾川町 (農業試験場内)

調査期間：4月1日～11月30日

(2) ウンカ飛来状況報告

トビイロウンカ、セジロウンカ及びヒメトビウンカの日別誘殺数を調査し、報告した。

調査期間 4月1日～11月30日

報告日：月末締めで第1半旬中に報告した。

※ (1), (2) の具体的データは次頁からの表のとおり

4) ホームページサービス

病害虫防除所のホームページに病害虫発生予察情報、防除に関する情報 (麦類赤かび病に関する情報、技術情報等)、農薬に関する情報等を掲載し、適時更新して最新の情報を提供した。

6 主要害虫半旬別誘殺数

1) 高圧水銀灯（100W水銀灯）

(1) 農業試験場本場（綾川町北）

① ウンカ・ヨコバイ類（2025）

月半旬	イナズマ ヨコバイ	セジロウ ンカ	ツماغロ ヨコバイ	トビイロ ウンカ	ヒメトビ ウンカ	ヒメフタ テンヨコ バイ
4.1	0	0	0	0	0	0
4.2	0	0	0	0	0	0
4.3	0	0	0	0	0	0
4.4	0	0	0	0	0	0
4.5	0	0	0	0	0	1
4.6	0	0	0	0	0	2
5.1	0	0	0	0	0	1
5.2	0	0	0	0	0	1
5.3	2	0	1	0	0	140
5.4	44	0	1	0	0	116
5.5	37	0	1	0	0	35
5.6	160	0	5	0	0	39
6.1	124	0	28	0	0	11
6.2	79	0	122	0	13	21
6.3	73	0	416	0	13	6
6.4	0	0	53	0	0	14
6.5	0	0	14	0	0	21
6.6	1	0	3	0	4	55
7.1	5	1	4	0	23	95
7.2	8	0	5	0	14	40
7.3	2	9	3	0	13	61
7.4	0	2	10	0	9	54
7.5	10	1	18	0	7	52
7.6	70	2	20	0	57	186
8.1	146	29	66	0	114	164
8.2	26	327	76	0	98	37
8.3	41	155	186	0	47	39
8.4	61	50	26	0	39	114
8.5	11	11	2	0	4	53
8.6	35	158	15	0	87	199
9.1	24	90	11	0	116	118
9.2	34	225	40	5	103	96
9.3	50	45	120	3	52	89
9.4	20	136	302	6	20	72
9.5	25	35	240	1	7	22
9.6	26	253	527	7	60	66
10.1	68	582	42	593	119	181
10.2	171	1,052	21	160	691	370
10.3	144	65	16	34	322	315
10.4	67	23	2	176	31	334
10.5	2	15	0	3	2	21
10.6	2	7	0	0	3	11
11.1	0	8	0	0	4	6
11.2	0	2	0	0	1	3
11.3	0	0	0	0	0	0
11.4	0	0	0	0	0	0
11.5	0	0	0	0	0	0
11.6	0	0	0	0	0	0
年計	1,568	3,283	2,396	988	2,073	3,261
4月	0	0	0	0	0	3
5月	243	0	8	0	0	332
6月	277	0	636	0	30	128
7月	95	15	60	0	123	488
8月	320	730	371	0	389	606
9月	179	784	1,240	22	358	463
10月	454	1,744	81	966	1,168	1,232
11月	0	10	0	0	5	9

①-2 日別誘殺数

ア) セジロウンカ日別誘殺数

月	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月	
日	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	17	13	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	11	10	11	8	2	2
3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	20	20	30	2	2
4	0	0	0	0	0	0	0	1	14	6	0	0	74	56	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23	13	180	173	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	7	84	67	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	40	60	500	276	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	55	27	25	33	51	58	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	68	55	14	18	4	2	2	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	80	16	16	8	4	6	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	62	17	4	5	3	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	0	0	21	4	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	26	9	9	8	0	3	0	0
14	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	5	17	17	0	0
15	0	0	0	0	0	0	5	2	9	3	6	3	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13	8	20	7	1	0	0
17	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7	0	1	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	14	6	10	3	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	15	1	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	37	24	1	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	5	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	10	5	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	35	28	3	2	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	19	28	4	1	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	20	37	66	60	0	1	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	21	17	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	9	12	0	0	0	0
31			0	0			0	0	7	3			1	0		

半旬計

1	0	0	0	0	0	0	0	1	19	10	42	48	302	280	4	4
2	0	0	0	0	0	0	0	0	211	116	99	126	643	409	2	0
3	0	0	0	0	0	0	6	3	121	34	24	21	41	24	0	0
4	0	0	0	0	0	0	2	0	22	28	70	66	19	4	0	0
5	0	0	0	0	0	0	1	0	7	4	18	17	10	5	0	0
6	0	0	0	0	0	0	1	1	75	83	135	118	4	3	0	0
月計	0	0	0	0	0	0	10	5	455	275	388	396	1,019	725	6	4

①-2 日別誘殺数

イ) トビイロウンカ日別誘殺数

月	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月	
日	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	277	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	7	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	67	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	23	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	16	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	41	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	7	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
31			0	0			0	0	0	0			0	0		

半旬計

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	281	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	76	84	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	11	23	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	112	64	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0
月計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	511	455	0	0

①-2 日別誘殺数

ウ) ヒメトビウンカ日別誘殺数

月	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月	
日	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂
1	0	0	0	0	0	0	4	7	11	16	6	41	2	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	6	31	1	1	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	1	11	14	2	19	2	4	2	2
4	0	0	0	0	0	0	0	2	22	12	0	1	38	33	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	4	3	15	4	6	17	21	0	0
6	0	0	0	0	1	0	2	3	30	35	9	3	8	10	0	0
7	0	0	0	0	1	1	1	5	0	5	6	11	226	246	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	16	91	101	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	2	10	9	6	19	3	0	0	0
10	0	0	0	0	6	4	0	1	5	1	8	19	4	2	1	0
11	0	0	0	0	5	0	0	7	3	1	3	8	13	0	0	0
12	0	0	0	0	2	1	4	0	1	1	1	0	117	65	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	18	11	4	10	5	1	0	0
14	0	0	0	0	3	1	1	0	2	4	3	8	56	61	0	0
15	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	5	10	4	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	2	11	8	1	7	6	2	0	0
17	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	1	2	1	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	14	4	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	3	1	0	0
20	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	2	4	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	4	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0
26	0	0	0	0	1	2	1	0	8	2	13	13	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	3	1	4	5	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	3	1	5	8	16	15	1	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	6	2	2	9	0	0	1	0	0	0
30	0	0	0	0	1	0	7	12	1	16	2	1	0	0	0	0
31			0	0			13	8	11	16			1	0		

半旬計

1	0	0	0	0	0	0	5	18	52	62	18	98	60	59	2	2
2	0	0	0	0	8	5	3	11	48	50	35	68	332	359	1	0
3	0	0	0	0	10	3	5	8	27	20	16	36	195	127	0	0
4	0	0	0	0	0	0	3	6	19	20	4	16	24	7	0	0
5	0	0	0	0	0	0	4	3	1	3	4	3	2	0	0	0
6	0	0	0	0	2	2	33	24	31	56	31	29	3	0	0	0
月計	0	0	0	0	20	10	53	70	178	211	108	250	616	552	3	2

①-2 日別誘殺数

エ) ツマグロヨコバイ日別誘殺数

月 日	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月	
	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂
1	0	0	0	0	3	0	0	0	9	7	1	0	5	1	0	0
2	0	0	0	0	21	2	0	1	8	6	1	1	2	1	0	0
3	0	0	0	0	0	0	1	1	11	6	0	0	0	2	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	1	9	7	0	0	15	4	0	0
5	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	4	4	6	6	0	0
6	0	0	0	0	38	10	2	1	2	1	4	1	2	0	0	0
7	0	0	0	0	23	3	0	0	0	0	5	6	6	5	0	0
8	0	0	0	0	13	2	1	0	54	13	4	7	6	2	0	0
9	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4	6	0	0	0	0
10	0	0	0	0	25	7	0	0	5	0	2	1	0	0	0	0
11	0	0	0	0	17	6	1	0	54	7	1	0	2	0	0	0
12	0	0	0	0	137	38	1	0	41	12	1	1	1	1	0	0
13	0	0	0	0	24	3	0	0	26	21	21	13	0	1	0	0
14	0	0	0	0	48	9	0	0	5	2	10	12	8	2	0	0
15	0	0	1	0	101	33	1	0	16	2	29	32	0	1	0	0
16	0	0	0	0	12	5	3	1	5	6	24	59	1	0	0	0
17	0	0	0	0	5	1	1	0	2	3	1	1	0	0	0	0
18	0	0	0	0	5	0	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0
19	0	0	0	0	2	0	3	1	0	1	10	6	0	0	0	0
20	0	0	1	0	18	5	0	0	2	1	73	127	0	0	0	0
21	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	9	16	0	0	0	0
22	0	0	0	0	8	1	4	0	0	0	3	5	0	0	0	0
23	0	0	0	0	2	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	78	102	0	0	0	0
25	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	14	13	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	55	125	0	0	0	0
27	0	0	0	0	3	0	4	2	2	2	1	4	0	0	0	0
28	0	0	2	2	0	0	1	0	1	1	147	183	0	0	0	0
29	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	5	1	1	2	4	5	0	0	0	0
31			0	0			1	2	1	0			0	0		

半旬計

1	0	0	0	0	25	3	1	3	40	26	6	5	28	14	0	0
2	0	0	0	0	99	23	4	1	62	14	19	21	14	7	0	0
3	0	0	1	0	327	89	3	0	142	44	62	58	11	5	0	0
4	0	0	1	0	42	11	8	2	12	14	108	194	2	0	0	0
5	0	0	1	0	13	1	17	1	2	0	104	136	0	0	0	0
6	0	0	3	2	3	0	14	6	6	9	209	318	0	0	0	0
月計	0	0	6	2	509	127	47	13	264	107	508	732	55	26	0	0

② カメムシ類 (2025)

月半旬	アオクサ カメムシ	アカスジ カスミカ メ	アカヒゲホ ソミドリカ スミカメ	アカヒメ ヘリカメ ムシ	イチモン ジカメム シ	イネカメ ムシ	イネクロ カメムシ	クサギカ メムシ
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	0	3	0	0	0	0	0	0
5.5	0	2	0	0	0	0	0	0
5.6	0	1	3	0	0	0	0	0
6.1	0	1	6	0	0	0	0	0
6.2	0	1	16	0	0	0	0	0
6.3	0	1	17	1	0	0	12	5
6.4	0	2	48	0	1	0	12	1
6.5	0	3	12	0	2	1	10	2
6.6	0	6	31	0	4	4	1	0
7.1	0	8	40	1	2	19	2	1
7.2	0	5	18	0	1	46	4	3
7.3	0	2	8	0	0	20	1	1
7.4	0	3	2	0	1	19	0	1
7.5	0	2	3	0	1	28	0	19
7.6	0	8	13	0	1	26	0	19
8.1	0	1	6	0	3	10	1	7
8.2	0	0	0	0	6	0	1	17
8.3	0	0	0	0	4	11	4	74
8.4	0	5	0	0	5	15	1	57
8.5	0	2	0	0	4	10	2	29
8.6	0	5	2	0	6	4	24	87
9.1	0	0	0	0	5	3	9	18
9.2	0	0	1	0	2	0	3	7
9.3	0	2	0	0	1	0	8	13
9.4	0	0	1	0	0	0	1	2
9.5	0	0	0	0	0	0	2	0
9.6	0	1	0	1	0	0	0	1
10.1	0	0	1	0	1	0	0	0
10.2	0	1	2	0	1	0	1	0
10.3	0	3	2	1	1	0	0	2
10.4	0	3	5	0	1	0	0	0
10.5	0	0	1	0	0	0	0	0
10.6	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	0	0	1	0	0	0	0	0
11.3	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	0	0	0	0	0	0	0	0
年計	0	71	239	4	53	216	99	366
4月	0	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	6	3	0	0	0	0	0
6月	0	14	130	1	7	5	35	8
7月	0	28	84	1	6	158	7	44
8月	0	13	8	0	28	50	33	271
9月	0	3	2	1	8	3	23	41
10月	0	7	11	1	4	0	1	2
11月	0	0	1	0	0	0	0	0

クモヘリ カメムシ	シラホシ カメムシ	チャバネ アオカメ ムシ	ツヤアオ カメムシ	ヒメナガ カメムシ	ホソハリ カメムシ	ホソヘリ カメムシ	マルカメ ムシ	ミナミア オカメム シ
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	9	9	2	0	0	0	5
0	0	1	1	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	3	20	4	3	0	0	0	5
2	4	11	1	3	1	0	0	0
0	35	17	1	3	0	1	0	1
0	6	6	0	65	3	0	0	2
1	10	4	1	196	12	0	0	8
1	8	5	0	227	6	0	0	11
0	2	8	0	228	3	0	0	13
0	15	3	0	232	2	0	0	12
1	13	21	0	329	5	0	0	22
0	24	22	0	2,060	9	0	0	46
1	9	25	0	1,815	6	0	0	50
1	5	20	1	822	5	0	0	18
1	25	101	1	4,880	10	0	0	32
0	1	61	0	681	3	0	0	22
0	0	88	2	88	0	2	0	27
3	7	457	1	314	0	1	0	116
3	3	221	0	95	2	0	0	62
0	3	149	0	398	0	0	0	29
0	5	229	0	717	1	0	0	80
1	4	176	0	352	1	0	0	53
0	6	176	4	69	0	0	0	62
0	14	447	7	83	0	0	0	156
0	15	369	8	89	1	0	0	54
0	17	155	5	39	0	0	0	39
0	36	99	18	102	0	0	0	53
0	20	18	3	112	0	0	0	19
0	0	0	3	0	0	0	0	2
0	0	0	5	0	0	0	0	1
0	0	0	0	8	0	0	0	2
0	0	0	0	2	0	0	0	11
0	1	0	0	0	0	0	0	2
0	1	0	0	0	0	0	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	292	2,923	75	14,015	70	4	1	1,022
0	0	2	0	0	0	0	1	2
0	0	11	10	3	0	0	0	6
4	48	56	6	74	4	1	0	8
3	72	63	1	3,272	37	0	0	112
6	47	752	5	8,600	24	3	0	265
4	35	1,398	11	1,714	4	0	0	442
0	88	641	42	342	1	0	0	168
0	2	0	0	10	0	0	0	19

③ ガ類 (2025)

月半旬	アカエ グリバ	アメリカ カシロ ヒトリ	アワヨ トウ	イチジ クヒト リモド キ	イネヨ トウ	イラガ	オオタ バコガ	オビカ レハ	カブラ ヤガ	キクキ ンウワ バ
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
5.2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
5.3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
5.4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
5.5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
5.6	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0
6.1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
6.2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
6.3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6.4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
9.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
9.6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
10.1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
10.2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10.3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
10.4	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
10.5	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
10.6	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
11.1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
11.2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11.3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11.4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
11.5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年計	1	0	0	1	0	0	68	3	0	0
4月	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
5月	0	0	0	1	0	0	15	0	0	0
6月	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0
7月	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
8月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
10月	1	0	0	0	0	0	28	0	0	0
11月	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0

キハラ ゴマダ ラヒト リ	クワゴ マダラ ヒトリ	コナガ	コブノ メイガ	シロイ チモジ マダラ メイガ	シロイ チモジ ヨトウ	シロオ ビノメ イガ	タバコ ガ	タマナ ギンウ ワバ	タマナ ヤガ	ニカメ イガ
2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	22	0	0	0	1	0	0	0	0
0	3	28	0	0	0	2	0	1	0	0
0	3	60	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	35	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	2	0	0	2	1	0	0	1	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	0	16	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	47	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	72	0	0	0	0
0	2	0	0	0	0	24	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	10	0	0	0	0
0	0	1	1	0	7	19	0	5	0	0
0	0	1	1	0	21	6	0	1	0	0
0	0	3	1	0	14	28	0	0	0	0
0	0	0	1	0	7	42	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	74	0	0	0	0
0	0	3	0	0	5	42	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
0	0	2	0	0	3	6	0	0	0	0
0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0
0	0	1	0	0	3	4	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
66	15	488	7	0	66	472	0	7	2	0
24	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3	310	0	0	0	3	0	1	0	0
27	8	98	0	0	4	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0
3	1	3	1	0	0	143	0	0	0	0
4	3	1	1	0	0	90	0	0	0	0
0	0	8	5	0	54	211	0	6	0	0
0	0	7	0	0	8	19	0	0	0	0

[illegible]

④ コガネムシ・ゾウムシ類 (2025)

月半旬	アオドウ ガネ	アカビロ ウドコガ ネ	イネミズ ゾウムシ	オオクロ コガネ	クロコガ ネ	セマダラ コガネ	ドウガネ ブイブイ	ヒメコガ ネ
4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	0	0	1	0	1	0	0	0
5.5	0	0	0	0	0	4	0	0
5.6	0	0	0	0	1	3	2	0
6.1	0	0	0	0	0	7	1	0
6.2	0	0	0	0	0	26	3	1
6.3	0	0	0	0	0	50	12	0
6.4	0	0	0	0	0	25	27	1
6.5	1	0	0	0	1	8	15	4
6.6	1	1	0	0	0	9	22	9
7.1	0	1	0	0	0	4	27	16
7.2	0	1	0	0	0	1	23	2
7.3	1	1	0	0	0	1	12	7
7.4	6	1	0	0	0	1	16	17
7.5	10	0	0	0	0	1	12	16
7.6	4	0	0	0	0	0	27	26
8.1	2	0	0	0	0	1	25	8
8.2	5	0	0	0	0	1	13	9
8.3	8	3	0	0	0	1	48	9
8.4	6	0	0	0	0	0	21	2
8.5	3	0	0	0	0	0	8	0
8.6	4	0	0	0	0	0	20	0
9.1	2	1	0	0	0	0	15	0
9.2	1	0	0	0	0	0	17	0
9.3	1	0	0	0	0	0	6	0
9.4	2	0	0	0	0	0	2	0
9.5	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	2	0	0	0	0	0	2	0
10.1	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	0	0	0	0	0	0	1	0
10.4	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	0	0	0	0	0	0	0	0
年計	59	9	1	0	3	143	377	127
4月	0	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	1	0	2	7	2	0
6月	2	1	0	0	1	125	80	15
7月	21	4	0	0	0	8	117	84
8月	28	3	0	0	0	3	135	28
9月	8	1	0	0	0	0	42	0
10月	0	0	0	0	0	0	1	0
11月	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 農業試験場府中果樹研究所（坂出市府中町）


月・半旬	チャバネアオ カメムシ		ツヤアオカメムシ		クサギカメムシ		モモノゴマダラノ メイガ		クワゴマダラヒトリ		吸蛾類 (アカエグリバ, ヒメエグリバ)	
	2025	平年値	2025	平年値	2025	平年値	2025	平年値	2025	平年値	2025	平年値
4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.1
4.2	0	0.0	0	0.1	0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.1
4.3	0	0.1	0	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
4.4	0	0.2	0	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.1
4.5	0	1.8	0	26.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.1
4.6	0	8.4	0	108.2	0	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.1	0	6.2	0	24.7	0	0.1	0	0.2	0	0.0	0	0.0
5.2	0	4.2	0	18.6	0	0.1	0	0.4	0	0.0	0	0.1
5.3	1	6.6	1	36.7	0	0.7	0	1.2	0	0.0	0	0.1
5.4	12	40.5	8	32.8	1	1.1	1	2.3	0	0.0	0	0.0
5.5	1	47.4	1	46.4	0	1.8	0	1.8	0	0.0	1	0.0
5.6	3	197.8	1	50.7	0	2.8	1	3.5	0	0.0	2	0.3
6.1	2	17.5	0	27.1	0	2.1	4	1.9	0	0.0	0	0.2
6.2	4	35.2	3	120.5	2	4.0	3	2.0	0	0.0	1	0.9
6.3	13	47.8	6	200.2	4	8.1	0	1.6	0	0.0	0	1.4
6.4	9	87.9	10	182.5	0	9.4	0	0.9	0	0.0	0	1.4
6.5	19	174.8	10	261.5	6	11.1	0	0.2	0	0.0	2	2.0
6.6	19	308.2	2	209.4	3	17.3	0	0.1	0	0.0	0	1.2
7.1	20	305.4	11	336.3	3	22.1	0	0.2	0	0.0	3	1.4
7.2	19	247.0	2	372.2	0	24.2	0	0.4	0	0.0	0	0.5
7.3	8	147.5	2	185.4	0	15.3	2	0.9	0	0.0	0	0.0
7.4	9	274.0	3	304.8	0	26.3	1	0.5	0	0.0	0	0.1
7.5	12	256.7	1	220.9	2	36.1	1	0.2	0	0.0	1	0.0
7.6	16	310.1	0	265.3	6	60.0	0	0.9	0	0.0	0	0.4
8.1	32	249.1	0	143.9	6	45.3	1	1.6	0	0.0	3	0.1
8.2	31	149.4	1	99.8	4	43.8	0	0.5	0	0.0	6	0.4
8.3	83	113.2	2	82.9	46	44.3	0	0.7	0	0.0	6	0.4
8.4	88	83.4	3	55.4	18	49.8	0	0.4	0	0.0	1	0.7
8.5	49	105.4	5	45.4	4	51.4	4	0.4	0	0.2	5	0.6
8.6	57	76.8	4	33.7	4	34.7	3	0.6	1	1.5	4	0.5
9.1	42	45.6	3	20.9	1	15.4	1	1.0	3	9.4	0	0.5
9.2	58	31.0	0	20.3	3	7.3	1	0.9	2	31.0	0	1.2
9.3	64	26.2	4	19.8	7	5.6	0	0.3	1	19.1	0	0.7
9.4	29	21.8	2	22.1	0	2.1	0	0.3	6	4.8	0	0.4
9.5	19	17.7	19	22.2	0	1.0	0	1.4	3	1.7	2	0.2
9.6	47	14.0	13	44.9	2	0.8	0	0.3	4	1.4	0	0.5
10.1	39	4.9	40	14.4	0	0.2	0	0.4	0	0.1	1	1.2
10.2	15	4.4	11	24.6	0	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6
10.3	15	2.0	26	16.4	0	0.0	0	0.1	0	0.0	3	0.6
10.4	6	1.0	7	5.6	0	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4
10.5	0	0.1	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.4
10.6	0	0.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3
11.1	0	0.1	0	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.4
11.2	0	0.2	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
11.3	0	0.1	0	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.1
11.4	0	0.1	0	0.8	0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.1
11.5	0	0.0	0	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11.6	0	0.0	0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	841	3,471.8	206	3,723.3	122	545.0	23	28	20	69.2	45	20.9
4月	0	10.5	0	142.7	0	0.3	0	0	0	0.0	1	0.4
5月	17	302.7	11	209.9	1	6.6	2	9	0	0.0	3	0.5
6月	66	671.4	31	1,001.2	15	52.0	7	7	0	0.0	3	7.1
7月	84	1,540.7	19	1,684.9	11	184.0	4	3	0	0.0	4	2.4
8月	340	777.3	15	461.1	82	269.3	8	4	1	1.7	25	2.7
9月	259	156.3	41	150.2	13	32.2	2	4	19	67.4	2	3.5
10月	75	12.4	88	65.2	0	0.5	0	1	0	0.1	6	3.5
11月	0	0.5	1	8.1	0	0.1	0	0	0	0.0	1	0.8

2) フェロモントラップ等


(1) 農業試験場本場 (綾川町北)

月半旬	オオタバコガ	シロイチモジ ヨトウ	タバコガ	ハスモンヨトウ	フタオビコヤガ
4.4	0.0	1.8	0.0	2.2	0.0
4.5	0.0	4.2	0.0	2.8	0.0
4.6	0.0	8.0	1.0	1.0	0.0
5.1	10.0	11.4	0.0	2.2	0.0
5.2	5.8	20.2	0.0	2.6	0.0
5.3	4.2	24.4	0.0	2.2	0.0
5.4	5.0	24.0	2.0	0.0	0.0
5.5	4.2	24.2	2.5	9.2	0.0
5.6	2.4	20.8	0.5	14.1	0.0
6.1	2.4	53.0	0.0	11.7	0.0
6.2	3.0	50.0	1.0	19.0	0.0
6.3	1.7	53.3	1.7	30.0	0.0
6.4	1.3	96.7	3.3	44.0	0.0
6.5	22.0	62.0	2.0	26.0	0.0
6.6	18.0	20.0	0.0	9.0	0.0
7.1	4.2	56.4	2.8	6.6	0.0
7.2	2.8	51.6	2.2	5.4	0.0
7.3	0.0	35.0	1.0	7.0	0.0
7.4	7.2	87.2	5.0	6.4	0.0
7.5	3.8	45.8	3.0	7.6	0.0
7.6	3.0	41.0	2.0	15.0	0.0
8.1	3.0	127.0	4.0	30.0	0.0
8.2	7.8	53.4	0.8	46.4	0.0
8.3	4.2	40.6	1.2	29.6	0.0
8.4	4.0	141.0	6.0	6.0	0.0
8.5	3.3	15.0	3.3	20.0	0.0
8.6	0.7	24.7	4.9	24.8	0.0
9.1	0.3	56.8	2.0	33.2	0.0
9.2	1.7	232.5	0.8	55.0	0.0
9.3	1.7	198.3	0.0	35.0	0.0
9.4	12.3	156.3	8.6	29.0	0.0
9.5	21.0	77.4	14.4	28.0	0.0
9.6	25.0	47.0	4.0	115.0	0.0
10.1	35.8	196.7	8.3	90.0	0.0
10.2	15.2	262.3	8.7	202.0	0.0
10.3	6.0	229.0	12.0	134.0	0.0
10.4	58.0	172.0	26.0	184.0	0.0
10.5	23.6	139.2	6.4	460.8	0.0
10.6	33.4	147.8	2.6	385.2	0.0
11.1	22.0	111.0	0.0	269.0	0.0
11.2	7.0	128.0	1.0	419.0	0.0
11.3	4.8	49.2	0.0	138.0	0.0
11.4	9.2	30.8	0.0	145.0	0.0
11.5	3.0	31.0	0.0	102.0	0.0
11.6	4.2	7.5	0.8	57.5	0.0
12.1	0.8	10.5	0.2	47.5	0.0
12.2	2.0	2.0	0.0	18.0	0.0
12.3	0.0	2.0	0.0	3.0	0.0
年計	411.0	3,480.0	146.0	3,331.0	0.0
4月	0.0	14.0	1.0	6.0	0.0
5月	31.6	125.0	5.0	30.3	0.0
6月	48.4	335.0	8.0	139.7	0.0
7月	21.0	317.0	16.0	48.0	0.0
8月	23.0	401.7	20.2	156.8	0.0
9月	62.0	768.3	29.8	295.2	0.0
10月	172.0	1,147.0	64.0	1,456.0	0.0
11月	50.2	357.5	1.8	1,130.5	0.0
12月	2.8	14.5	0.2	68.5	0.0


頭
オオタバコガの誘殺虫数(綾川町北)
(成虫の発生と作物の被害にはズレがあるので注意)




頭
シロイチモジヨトウの誘殺虫数(綾川町北)
(成虫の発生と作物の被害にはズレがあるので注意)




頭
タバコガの誘殺虫数(綾川町北)
(成虫の発生と作物の被害にはズレがあるので注意)



頭
ハスモンヨトウの誘殺虫数(綾川町北)
(成虫の発生と作物の被害にはズレがあるので注意)



頭
フタオビコヤガの誘殺虫数(綾川町北)
(成虫の発生と作物の被害にはズレがあるので注意)





コナガ:フェロモントラップ
アブラムシ:黄色水盤

月半旬	コナガ	アブラムシ
1.1	0.0	2.2
1.2	0.0	0.4
1.3	0.0	0.0
1.4	0.0	0.0
1.5	0.0	0.0
1.6	0.0	0.0
2.1	0.0	0.0
2.2	0.0	0.0
2.3	0.0	0.0
2.4	0.0	0.0
2.5	0.0	0.0
2.6	0.0	0.0
3.1	0.0	0.0
3.2	0.0	0.0
3.3	0.0	0.0
3.4	0.0	0.3
3.5	0.0	1.7
3.6	10.0	6.0
4.1	8.8	4.5
4.2	9.2	7.5
4.3	31.0	10.7
4.4	35.0	13.6
4.5	28.0	25.7
4.6	19.0	15.0
5.1	40.8	18.6
5.2	48.6	33.8
5.3	43.3	58.1
5.4	43.3	116.5
5.5	75.8	51.7
5.6	75.4	108.6
6.1	50.8	36.7
6.2	52.5	90.0
6.3	46.5	110.0
6.4	20.6	30.0
6.5	2.9	4.2
6.6	2.5	0.8
7.1	2.0	1.0
7.2	0.0	0.0
7.3	0.0	1.0
7.4	0.8	1.4
7.5	0.2	0.6
7.6	0.0	0.0
8.1	0.0	0.0
8.2	0.0	0.0
8.3	0.0	0.0
8.4	0.0	0.0
8.5	0.0	5.0
8.6	0.0	10.3
9.1	0.0	33.7
9.2	0.0	24.2
9.3	0.0	22.4
9.4	0.4	13.2
9.5	0.6	11.2
9.6	0.0	14.0

月半旬	コナガ	アブラムシ
10.1	0.0	16.7
10.2	3.0	6.3
10.3	0.8	7.5
10.4	0.2	6.5
10.5	1.3	1.2
10.6	1.9	5.8
11.1	0.8	0.0
11.2	2.0	7.0
11.3	0.0	8.3
11.4	0.0	6.7
11.5	0.0	42.5
11.6	0.8	27.7
12.1	0.2	35.8
12.2	0.0	22.0
12.3	0.0	5.0
12.4	1.1	9.0
12.5	0.8	5.0
12.6	0.1	1.0


月別	コナガ	アブラムシ
1月	0.0	2.6
2月	0.0	0.0
3月	10.0	8.0
4月	131.0	77.0
5月	327.2	387.3
6月	175.8	271.7
7月	3.0	4.0
8月	0.0	15.3
9月	1.0	118.7
10月	7.2	44.0
11月	3.6	92.2
12月	2.2	77.8
年計	661.0	1098.6




(2) 農業試験場府中果樹研究所（坂出市府中町）

月・半旬	チャノコカクモン ハマキ		ナシヒメシクイ		モモシクイガ		コスカシバ		モモハモグリガ	
	2025	平年値	2025	平年値	2025	平年値	2025	平年値	2025	平年値
4.1	0	0.5	4	31.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.2	1	1.2	28	24.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.3	0	2.6	12	22.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.4	12	7.9	37	15.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5	16	8.9	14	12.0	0	0.0	0	0.4	0	0.0
4.6	14	9.2	4	6.3	0	0.0	0	0.3	0	0.0
5.1	23	11.7	8	8.8	0	0.0	1	1.3	0	0.1
5.2	14	7.6	6	5.7	0	0.0	0	0.7	0	0.2
5.3	15	4.5	11	6.0	0	0.0	1	0.3	0	1.2
5.4	9	1.4	13	11.5	0	0.0	1	0.5	0	1.4
5.5	1	0.9	23	31.4	0	0.0	0	0.6	0	1.2
5.6	0	0.4	67	66.0	0	0.4	1	0.8	0	0.7
6.1	1	0.6	46	54.2	0	0.1	0	1.0	0	0.6
6.2	2	3.0	30	36.6	0	0.5	0	0.4	0	1.2
6.3	7	4.8	11	25.2	0	0.5	1	0.5	0	2.0
6.4	12	11.3	20	24.0	0	1.3	0	0.5	0	3.1
6.5	32	9.2	26	33.5	0	0.5	1	0.4	0	3.4
6.6	17	7.9	40	52.0	0	0.7	0	0.1	0	1.9
7.1	11	12.7	92	56.9	0	0.4	0	0.5	0	2.3
7.2	1	2.5	63	55.9	0	0.0	0	0.2	0	6.0
7.3	1	2.1	74	56.0	0	0.4	0	0.8	0	4.4
7.4	0	2.2	45	53.1	0	0.3	1	0.1	0	2.7
7.5	3	2.7	71	49.7	0	0.2	0	0.8	0	4.2
7.6	3	4.5	57	64.9	0	0.8	1	0.5	0	2.2
8.1	4	3.4	52	60.4	0	0.4	1	1.0	0	0.8
8.2	1	1.5	34	55.2	0	0.1	0	0.6	0	1.0
8.3	2	1.5	32	53.8	0	0.2	0	0.9	0	0.5
8.4	3	1.4	80	51.8	0	0.2	0	0.4	0	0.6
8.5	2	0.8	39	58.1	0	0.0	0	1.5	0	0.3
8.6	2	0.8	54	67.8	0	0.2	2	3.1	0	0.3
9.1	0	1.7	54	66.9	0	0.1	0	5.8	0	0.5
9.2	0	1.1	108	98.9	0	0.0	2	10.4	0	0.6
9.3	4	1.8	96	126.9	0	0.3	3	10.8	0	0.2
9.4	4	2.1	111	116.5	0	0.0	5	10.5	0	0.8
9.5	11	2.8	66	87.0	0	0.0	10	10.3	0	1.8
9.6	3	5.3	38	57.0	0	0.2	17	10.5	0	2.1
10.1	11	5.4	44	33.5	0	1.1	8	11.0	0	0.9
10.2	13	4.2	31	18.6	0	3.0	5	7.2	0	0.2
10.3	13	3.3	13	11.1	0	1.3	3	3.1	0	0.9
10.4	9	4.6	6	5.0	0	1.3	4	1.6	0	0.8
10.5	3	3.5	2	2.5	0	0.2	0	0.6	0	0.1
10.6	5	3.5	2	2.1	0	0.1	0	0.1	0	0.1
11.1	10	4.7	1	1.8	0	0.0	0	0.2	0	0.0
11.2	3	2.6	1	1.3	0	0.0	0	0.1	0	0.0
11.3	0	0.9	0	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11.4	0	1.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11.6	1	0.2	0	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	300	178.9	1667	1781.3	0	14.8	68	100.4	0	51.3
4月	43	30.3	99	112.1	0	0.0	0	0.7	0	0.0
5月	62	26.5	128	129.4	0	0.4	4	4.2	0	4.8
6月	71	36.8	173	225.5	0	3.6	2	2.9	0	12.2
7月	19	26.7	402	336.5	0	2.1	2	2.9	0	21.8
8月	14	9.4	291	347.1	0	1.1	3	7.5	0	3.5
9月	22	14.8	473	553.2	0	0.6	37	58.3	0	6.0
10月	54	24.5	98	72.8	0	7.0	20	23.6	0	3.0
11月	15	9.9	3	4.7	0	0.0	0	0.3	0	0.0


(高圧水銀灯)



(高圧水銀灯)



(フェロモントラップ)



(3) 各地区シロイチモジトウ、ハスモンヨトウ調査

① シロイチモジトウ


月・半旬		善通寺市生野町		観音寺市大野原町	
		2025	平均	2025	平均
5月	1	2	0.0	1	10.2
	2	2	0.2	4	7.2
	3	0	0.8	10	12.4
	4	3	1.0	6	11.8
	5	2	0.6	3	21.4
	6	3	1.0	17	38.2
6月	1	0	1.2	19	39.6
	2	0	2.2	18	40.8
	3	3	4.0	36	72.4
	4	5	3.6	48	110.0
	5	3	7.8	105	153.4
	6	1	2.6	70	280.4
7月	1	3	15.8	82	275.0
	2	5	18.0	147	285.6
	3	6	16.6	189	352.6
	4	7	6.0	435	331.0
	5	11	4.0	212	217.6
	6	10	4.4	221	282.6
8月	1	11	14.4	280	302.8
	2	6	13.0	483	533.0
	3	7	6.0	798	599.6
	4	5	4.4	952	558.6
	5	0	8.0	910	837.8
	6	8	8.2	550	1,198.8
9月	1	10	7.2	997	853.2
	2	11	12.0	434	880.0
	3	10	11.8	578	919.2
	4	16	23.0	571	748.4
	5	21	18.2	593	660.2
	6	25	10.0	832	663.0
10月	1	21	6.8	958	728.2
	2	14	6.2	991	634.2
	3	16	8.6	402	419.8
	4	9	8.8	307	228.6
	5	2	8.6	193	243.2
	6	8	7.6	190	225.6
11月	1	14	6.0	48	127.0
	2	19	4.6	20	70.4
	3	25	2.6	5	27.0
	4	18	4.8	15	24.0
	5	14	6.0	7	5.8
	6	2	3.4	0	10.2
12月	1	3	1.4	0	5.8
	2	1	1.0	0	1.4
	3	0	0.6	0	0.2
	4	0	0.0	0	0.0
	5	0	0.0	0	0.0
	6	0	0.0	0	0.0
計		362	303	12,737	14,048

② ハスモンヨトウ


月・半旬		高松市香川町		三木町		坂出市青海町	
		2025	平年	2025	平年	2025	平年
5月	1	2	1.1	0	0.5	1	7.8
	2	0	1.0	0	1.4	5	5.2
	3	13	1.6	1	2.1	6	10.3
	4	4	3.9	1	4.9	12	14.7
	5	11	5.5	18	12.1	30	16.7
	6	22	4.5	23	10.7	28	19.0
6月	1	1	3.0	3	9.8	7	14.8
	2	1	3.5	2	9.5	10	15.5
	3	4	5.5	2	23.2	21	25.0
	4	8	7.6	7	33.6	42	40.9
	5	15	8.3	6	26.8	60	45.1
	6	25	11.3	9	21.4	89	51.0
7月	1	2	11.6	8	36.3	59	48.4
	2	4	12.2	10	22.3	47	44.5
	3	10	10.7	23	30.5	25	44.2
	4	9	16.0	6	21.3	7	40.9
	5	12	19.0	7	25.7	3	39.3
	6	14	40.4	12	59.6	51	64.7
8月	1	1	34.0	19	53.2	39	69.3
	2	15	52.4	29	78.2	52	80.7
	3	17	36.0	1	46.4	26	72.7
	4	4	27.9	1	33.2	8	56.1
	5	14	36.8	1	76.7	15	68.4
	6	11	89.0	12	193.8	41	102.6
9月	1	7	72.9	44	175.4	18	122.5
	2	16	65.0	14	180.7	8	109.3
	3	5	46.7	16	141.5	7	96.0
	4	22	52.2	16	116.2	7	115.3
	5	26	48.7	44	101.5	8	120.7
	6	96	65.1	50	139.8	77	174.7
10月	1	14	129.8	10	245.6	119	274.1
	2	30	127.4	21	285.5	123	268.3
	3	32	173.4	63	279.0	138	234.0
	4	181	163.4	107	256.8	202	236.0
	5	124	196.0	118	278.6	249	193.1
	6	185	268.3	115	373.6	344	292.7
11月	1	118	228.2	53	239.3	210	255.4
	2	154	245.2	79	285.5	198	277.4
	3	107	189.3	35	207.7	207	221.5
	4	167	251.3	31	262.3	266	198.0
	5	93	144.8	12	151.1	324	151.9
	6	48	77.3	13	59.9	198	87.0
12月	1	24	32.4	2	32.5	46	64.0
	2	22	16.0	0	10.6	25	8.8
	3	3	9.3	0	6.3	9	6.0
	4	1	0	0	0	6	5
	5	0	0	0	0	5	1
	6	0	0	0	0	0	0
計		1,694	3,047	1,044	4,666	3,478	4,518

①シロイチモジヨトウ

ア 善通寺市生野町




イ 観音寺市大野原町




②ハスモンヨトウ


ア 高松市香川町



イ 三木町



ウ 坂出市青梅町



4 病害虫防除員の設置・活動

1) 病害虫防除員の設置

病害虫防除員延べ 39 名を設置し、病害虫の発生と防除状況を把握するとともに、市町及び関係団体と連携し、適正防除と農薬の安全使用の推進を図った。

(1) 地区別病害虫防除員の設置数と調査の分類

地区	設置数	普通作物	果樹	野菜・花き	特殊調査
東讃	11	3	1	6	1
小豆	2	1	0	1	0
中讃	14	3	4	4	3
西讃	12	1	3	8	0
計	39	8	8	19	4

(2) 調査作物別病害虫防除員の設置数

調 査 作 物	地 区 別 防 除 員 数					
	東讃	小豆	中讃	西讃	合 計	
普 通 作 物	3	1	3	1	8	
カ ン キ ツ			1	1	2	8
カ キ			1	1	2	
モ モ			1	1	2	
ブ ド ウ	1		1		2	
キ ャ ベ ツ	1				1	19
アスパラガス	1			1	2	
ブロッコリー			1	1	2	
レ タ ス			1	2	3	
青 ネ ギ	1			1	2	
タ マ ネ ギ			1	1	2	
キ ュ ウ リ	1			1	2	
イ チ ゴ	2			1	3	
キ ク		1	1		2	
特殊調査						4
斑点米カメムシ	1		2		3	
オオタバコガ			1		1	
合 計	11	2	14	12	39	

(3) 調査時期一覧表

①通常調査

調 査 作 物	調査 回数	調 査 時 期 (月・日)										
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
普通作物 麦 水稻 育苗期 水稻 本田期	8	20 20	20 20	20	20	20						20
カンキツ	7	20	20	20	20	20	20	20				
カ キ	7	20	20	20	20	20	20	20				
モ モ	7	20	20	20	20	20	20	20				
ブ ド ウ	7	20	20	20	20	20	20	20				
キャベツ	3					20	20	20				
アスパラガス	6	20	20	20	20	20	20					
ブロッコリー	7					20	20	20	20	20	20	20
レ タ ス 年内どり 年明どり 5月どり	2 4 1						20	20	20	20	20	20
青 ネ ギ	6	20	20	20	20	20	20					
タマネギ	3									20	20	20
キュウリ 夏どり 秋どり	2 2		20	20	20	20						
イ チ ゴ 育苗 本圃	4 7	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
キ ク	5	20	20	20	20	20						

②特殊調査

調 査 対 象	調査 回数	調 査 時 期 (月・日)										
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
水稻 (早期栽培) 斑点米カメムシ類 休耕田 本 田	2 1			10, 20	5							
オオタバコガ (キク)	30		6/1～10/31 (5 日おき/月)									

2) 病虫害防除員の研修と防除指導

(1) 防除員研修

病虫害防除員の自覚を高め、職務及び活動の徹底、充実を図るための研修を行った。

①対象者

令和7年度に新たに病虫害防除員の委嘱を受ける者（調査作物を変更して委嘱される者を含む）

地区名	受講対象者
東 讃	1
小 豆	0
中 讃	6
西 讃	3
計	10名

②実施時期、場所

令和7年5月15日：農業試験場会議室

③研修内容

- ア 病虫害防除員の職務及び活動
- イ 病虫害発生及び防除状況報告書の記載方法（調査作物別）
- ウ その他

(2) 病虫害防除員の防除指導

- ①病虫害の発生状況調査
- ②発生予察情報の収集
- ③病虫害について、市町及び関係団体との連携、協力
- ④病虫害防除の推進
- ⑤農薬安全使用の指導
- ⑥その他

Ⅲ 【防除指導関係】

1 病害虫防除方針策定に関すること

- 1) 病害虫・雑草防除指針に関すること
令和8年度香川県主要農作物病害虫・雑草防除指針の作成に協力した。
- 2) 主要農作物防除体系策定（防除暦等）
水稻、麦、大豆、果樹、野菜等の防除暦の作成に協力した。
- 3) 新農薬効果確認実証試験に関すること
本年度は、病害虫防除所が担当すべき要望が無く、実施しなかった。
- 4) 環境に配慮した農業
特別栽培農産物等について生産計画のうち、病害虫防除等の使用計画の作成に協力した。

2 殺虫・殺菌剤受託試験に関すること

日本植物防疫協会からの依頼を受け、下記の作物について、農薬登録促進のための防除効果試験を実施した。

- 1) 殺菌剤
3剤の殺菌剤について、ブロッコリーおよびキャベツにおける防除効果と薬害を検討する試験を実施したが、試験期間中に発病が確認されなかったため、評価ができず未了となった。
- 2) 殺虫剤
5剤の殺虫剤について、ブロッコリー、ナス、ハウレンソウ、やぶつばき、べにかなめもちにおける防除効果と薬害を検討した結果、ブロッコリーの1剤、やぶつばき、べにかなめもちの各1剤は効果が認められ、薬害も認められなかったことから、普及性があると判断した。ナスの1剤については、効果は認められたがその程度はやや低かった。ハウレンソウの1剤については、試験期間の対象害虫の発生が少なく、評価ができず未了となった。

3 特殊病害虫侵入防止対策

- 1) 重要病害虫等の侵入調査
重要病害虫の侵入を早期に発見し、速やかに的確な防除を実施することを目的に、国が指定した侵入警戒有害動植物21種・種群について侵入調査を行った。
このうち、トマトキバガが令和7年4月4日に農業試験場（綾川町）に設置したフェロモントラップにおいて成虫1頭の誘殺が確認され、その後、12月までに合計291頭が誘殺された。
そのほか20種・種群については確認されなかった。

侵入警戒有害動植物の調査方法

No.	侵入警戒有害動植物	調査方法	調査作物	調査地点数 (調査場所)
1	ミカンコミバエ種群	誘引物質による トラップ調査	カンキツ	4 (高松市、 小豆島町、 善通寺市、 三豊市)
2	ウリミバエ			
3	セグロウリミバエ			
4	クインスランドミバエ			
5	チチュウカイミバエ	誘引物質による トラップ調査	トマト	2 (さぬき 市、観音寺 市)
6	トマトキバガ	フェロモントラ ップ調査	トマト	1 (綾川町 (農業試験 場))

7	<i>Meloidogyne enterolobii</i>	目視調査	トマト	2 (さぬき市、観音寺市)
8	<i>Columnea latent viroid</i> (CLVd)			
9	<i>Pepper chat fruit viroid</i> (PCFVd)			
10	トマト退緑萎縮ウイルス (TCDVd)			
11	<i>Tomato apical stunt viroid</i> (TASVd)			
12	<i>Pepino mosaic virus</i> (PepMV)			
13	<i>Tomato brown rugose fruit virus</i> (ToBRFV)			
14	<i>Tomato mottle mosaic virus</i> (ToMMV)			
15	<i>Tomato leaf curl New Delhi virus</i> (ToLCNDV)			
16	バナナネモグリセンチュウ			
17	コロンビアネコブセンチュウ			
18	ジャガイモやせいもウイルス (PSTVd)	目視調査	オリーブ	2 (高松市、小豆島町)
19	カンキツネモグリセンチュウ			
20	<i>Xylella fastidiosa</i>	目視調査	オリーブ	2 (高松市、小豆島町)
21	ウメ輪紋ウイルス (PPV)	目視調査	ウメ	1 (高松市)

No. 1 ～No. 5 : 4月～11月に毎月1回捕獲数を調査。

No. 6 : 5月～3月に毎月2回捕獲数を調査。

No. 7 ～No. 19 : 7月～9月に発生の有無を調査。

No. 20 : 5月～8月に発生の有無を調査。

No. 21 : 観賞用苗生産園地における母樹を対象として6月に発生の有無を調査。

2) キウイフルーツ苗木等検査

キウイフルーツかいよう病 (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* biovar3 (Psa3)) のまん延防止に万全を期す必要があることから、清浄な苗木等が国内に流通するよう、香川県内の苗木等の生産園地を神戸植物防疫所と協力して検査した結果、Psa3の感染は確認されなかった。

4 特殊病虫害緊急防除対策事業

1) カンキツにおけるアザミウマ対策の検討

ハナアザミウマの発生モニタリング手法について検討した結果、初発の確認には青色トラップが有利と思われた。一方で、青色トラップは誘殺数が多いため、調査にかかる労力や時間の負担という課題が示された。また、誘殺数と果実被害との関係を調査した結果、青色トラップの総誘殺数が7,000頭を超えた圃場(殺虫剤2回散布)と殺虫剤1回散布の圃場において果実被害が認められた。

2) キウイフルーツのカイガラムシ類防除対策の検討

キウイフルーツにおけるクワシロカイガラムシの発生消長について県内7か所で調査したところ、第1世代のふ化は4月下旬からふ化が確認され、5月上旬まで発生が確認された。防除時期としては、4月下旬に薬剤を散布することでクワシロカイガラムシの被害を低減することができると考えられる。

5 輸出用マツ盆栽の病虫害対策

EU及び米国へ輸出を予定している全生産者の全盆栽において、輸出先が侵入を警戒しているマメコガネ、マツコナカイガラムシ、マツ類そうほう病、ゴマダラカミキリ等の発生実態を調査した結果、上記病虫害の発生は確認されなかった。また、マメコガネ成虫のマツ属への加害状況に基づく食餌選好性を調査し、同成虫によるマツ茎葉の食害は確認されなかった。このことからマメコガネ成虫はマツの茎葉を加害する可能性は低いと推察された。

6 農薬適正使用総合啓発

1) 農薬適正使用総合啓発

ロメインレタスの主要産地にモニター農家を設置し（ロメインレタス：観音寺市）、病害虫の発生状況や農薬使用の実態調査を行った結果、農薬の使用は安全かつ適正であった。また農産物の農薬残留分析に基づき、農薬安全使用の啓発指導を行った。

7 マイナー作物農薬登録促進

本県で栽培されているマイナー作物の防除薬剤について、薬登録促進のための防除効果試験等を実施した。

1) ビワのビワキジラミ

ビワキジラミに対するスタークル液剤 10 のドローン散布の防除効果を確認した結果、防除効果が認められた。薬害は認められなかった。

2) ラナンキュラスの株枯病

株枯病に対するペンコゼブ水和剤の防除試験では、株枯病が発生せず防除効果を確認できなかった。

3) パセリのアブラムシ類

アブラムシ類に対するセフィーナDCの防除効果を確認した結果、防除効果が認められた。薬害は認められなかった。

4) マーガレットのヨトウムシ類

ヨトウムシ類に対するベリマークSCの防除効果を確認した結果、防除効果が認められた。薬害は認められなかった。

8 鳥獣害防止対策事業

カモ 4 種とオオバンにおける麦類被害の実態について調査した。11 月～翌 3 月にかけて毎月 2 回、多度津町、高松市の被害ほ場近傍に位置するため池に生息するカモ等の頭数を計測した。併せて、周辺圃場の被害状況や被害対策の有無について調査した。

9 その他防除指導に関する課題

1) イチゴ炭疽病の防除対策

イチゴの炭疽病に登録のあるベノミル、ジエトフェンカルブ、フルジオキシニルに対する感受性について、2025 年に採取した 44 菌株について検定を行った。また、本試験で供試した菌株について PCR 検定により種を確認したところ、すべて *Colletotrichum gloeosporioides* 種複合体の一種である *Colletotrichum fructicola* であった。

2) イネカメムシの防除対策の検討

イネカメムシに関する知見を得るため、農試および現地において発生消長調査を実施し第 2 世代までの交代が行われていることを確認した。また、水稻栽培しおりに掲載されている斑点米カメムシ対象薬剤のうち 6 剤について薬剤感受性検定を実施した。

3) マーガレットの病害防除対策

本県のマーガレット栽培で問題となっている、8～9 月の高温期に商品価値を著しく低下させる斑点症状を引き起こす病原菌を特定し、今後の防除指導に資することを目的として試験を実施した。

4) アボカドにおけるカメムシ類対策の検討

接種試験の実施を検討したが、接種に供試可能な個体数が不足していたため、本年度は試験を実施できなかった。

Ⅳ 農薬指導取締

1 農薬指導取締に関すること

1) 農薬販売届の受理

農薬を販売する者が農薬取締法に基づき提出しなければならない農薬販売届や届出事項中の変更届に関する手続きを受け付けた。

農薬販売者の届出状況（令和8年3月31日現在）

地区	保健所	農協	卸	薬業	種苗	肥料	スーパー	ホームセンター	その他	合計
東讃	東讃	21	3	17	2	1	11	7	11	73
	高松市	38	30	82	10	5	37	19	31	252
小豆	小豆	9	0	5	0	0	3	1	1	19
中讃	中讃	37	11	53	11	2	30	16	27	187
西讃	西讃	15	6	19	4	7	15	10	14	90
合計		120	50	176	27	15	96	53	84	621

2) 農薬販売者の立入検査

農薬販売状況及び保管状況、農薬の譲受、譲渡数量と帳簿の記帳等について検査を行い、農薬の適正な流通と安全使用を図った。

立入検査時期は、危害防止月間（6～8月）を中心に年間を通して実施した。

令和7年度 農薬販売業者指導取締実績

業 種	立入件数	違反件数	検 査 事 項							
			新規届	変更届	廃止届	帳簿の備え付	種類別に記載	譲受譲渡数量の明確化	帳簿の保存	指定農薬の譲渡先明記
農協	18	1	0	1	0	0	0	0	0	0
卸	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
薬業	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
種苗	3	2	0	1	0	0	0	1	0	0
肥料	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0
スーパー	32	4	0	1	0	1	1	3	2	0
ホームセンター	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	12	1	0	0	0	0	1	1	1	0
合計	126	9	0	3	0	1	2	6	4	0

業 種	検 査 事 項							処理事項	
	無登録農薬の販売	不適切表示の農薬	虚偽の宣伝	分割販売	保管庫の設置	保管庫の整理		指導	報告命令
農協	0	0	0	0	0	0		1	0
卸	0	0	0	0	0	0		0	0
薬業	0	0	0	0	0	0		0	0
種苗	0	0	0	0	0	0		2	0
肥料	0	0	0	0	0	0		1	0
スーパー	0	0	0	0	0	0		3	1
ホームセンター	0	0	0	0	0	0		0	0
その他	0	0	0	0	0	0		1	0
合計	0	0	0	0	0	0		8	1

2 農薬の安全使用に関すること

1) 農薬の安全使用及び危害防止指導

農薬安全対策等について、防除に関する各種の協議会、講習会、研修会等を通じ指導の徹底を図るとともに、農薬販売者、病虫害防除員等を通じ末端使用者の指導を図った。

(1) 農薬販売者、防除業者及びゴルフ場職員等の研修

農薬危害防止運動（6～8月）の実施にあわせ、農薬取締法の遵守、農薬の安全対策等について研修会を開催し、農薬の適正な流通と使用を推進した。

①開催実績

月・日	地 区	場 所	参 集 範 囲	対 象 業者数	出席 者数
7月14日	中 讃	丸亀市綾歌総合文化会館 アイレックス	丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡	187	56
7月16日	西 讃	三豊合同庁舎	観音寺市、三豊市	90	32
7月17日	小 豆	小豆総合事務所	小豆郡	19	9
7月22日	東 讃	JA 香川県東讃営農センター	高松市、東かがわ市、さぬき市、三木町、直島町	325	37
計				621	134

②研修内容

- ア. 毒物及び劇物の取り扱いについて（保健福祉事務所）
- イ. 農薬の適正な取り扱いについて（病虫害防除所・農業経営課）
- ウ. 農薬を巡る最近の情勢について（病虫害防除所・農業経営課）

(2) 農薬管理指導者の養成及び更新研修

農薬の適正な取り扱いと安全使用の推進を図る上から、農薬管理指導者の養成と更新研修に協力した。

① 養成研修

- ア. 期日 令和8年2月4日、5日
- イ. 場所 丸亀市岡田コミュニティセンター 会議室
- ウ. 研修内容 農薬の一般知識と施用技術、農薬安全適正指導と農薬使用者の責務、ほか

② 更新研修

資料配布による自主研修

V 気象概況 令和7年度（2025年4月～2026年3月）

1 天気の概況

1) 各月の特徴

【4月】高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。

平年と比べ、降水量は多くの地点でかなり少なくなり、高松では4月の月降水量の少ない方からの値が、統計開始以来の1位を更新しました。

〔上旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、気圧の谷や寒気、湿った空気の影響で曇りや雨の日もありました。

〔中旬〕前半は低気圧や寒気、湿った空気の影響で曇りや雨の日がありましたが、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。

〔下旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、湿った空気の影響で曇りや雨の日もありました。

【5月】天気は数日の周期で変わり、発達した低気圧の影響で9日と10日は荒れた天気となったところがありました。

四国地方は5月17日頃に梅雨入りしたとみられ（確定値）、平年（6月5日頃）より19日早く、昨年（6月17日頃）より31日早くなりました。

〔上旬〕天気は数日の周期で変わり、発達した低気圧の影響で9日と10日は荒れた天気となったところがありました。降水量は多くの地点でかなり多くなりました。

〔中旬〕前半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、後半は前線や気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりました。平均気温は多くの地点でかなり高くなりました。

〔下旬〕天気は数日の周期で変わりましたが、低気圧や前線、気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多くなりました。日照時間はかなり少くなりました。

【6月】低気圧や梅雨前線、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなり、10日は大雨となったところがありました。後半は高気圧に覆われて晴れた日もあり、平年と比べ、平均気温はかなり高くなりました。

このため、滝宮では6月の日最高気温の高い方からの値が、高松、内海、引田では6月の月平均気温の高い方からの値が、それぞれ統計開始以来の1位となりました。

四国地方は6月27日頃に梅雨明けしたとみられ（確定値）、平年（7月17日頃）、昨年（7月17日頃）より20日早くなりました。

〔上旬〕低気圧や梅雨前線、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなり、10日は大雨となったところがありました。降水量はかなり多くなりました。

〔中旬〕前半は梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりましたが、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。平均気温はかなり高くなりました。

〔下旬〕前半は梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりましたが、後半は高気圧に覆われて晴れました。平均気温はかなり高く、日照時間はかなり多くなりました。降水量は多くの地点でかなり少くなりました。

【7月】高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や湿った空気の影響で曇りや雨の日もありました。平年よりも晴れた日が多かったため、平年と比べ、平均気温は全地点でかなり高く、日照時間は全地点でかなり多くなりました。

滝宮、香南、引田では通年の日最高気温の高い方からの値が、高松、滝宮、香南、引田では7月の日最高気温の高い方からの値が、高松、内海、香南、引田では7月の月平均気温の高い方からの値が統計開始以来の1位となりました。

〔上旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、午後は湿った空気や強い日射の影響で雨や雷雨の日もありました。平均気温は全地点でかなり高く、日照時間は全地点でかなり多くなり、降水量は多くの地点でかなり少なくなりました。

〔中旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や湿った空気の影響で曇りや雨の日もありました。

〔下旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、午後は湿った空気や強い日射の影響で雨や雷雨の日もありました。平均気温は多くの地点でかなり高く、日照時間は全地点でかなり多く、降水量は多くの地点でかなり少なくなりました。

【8月】高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日もありました。平年よりも晴れた日が多かったため、平年と比べ、平均気温は全地点でかなり高くなりました。

高松、多度津、内海では8月と通年の月平均気温の高い方からの値が、多度津では8月と通年の日最低気温の高い方からの値が、滝宮、香南、引田では8月と通年の日最高気温の高い方からの値がそれぞれ統計開始以来の1位となりました。

〔上旬〕前半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、後半は低気圧や前線、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなり、10日は引田を除く全地点で大雨となりました。

〔中旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、前線や湿った空気、強い日射の影響で曇りや雨の日もありました。

〔下旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、熱帯低気圧や湿った空気、強い日射の影響で雨や雷雨の日もありました。平均気温は全地点でかなり高く、降水量は多くの地点でかなり少なくなりました。

【9月】台風第15号や前線、湿った空気や強い日射の影響で曇りや雨の日が多くなり、5日は全地点で大雨となりました。また、高気圧に覆われて晴れた日もありました。

平年と比べ、平均気温は全地点でかなり高くなり、香南、財田では9月の日最高気温の高い方からの値が、統計開始以来の1位となりました。

〔上旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、台風第15号や前線、湿った空気の影響で曇りや雨の日もあり、5日は全地点で大雨となりました。平均気温は全地点でかなり高くなりました。

〔中旬〕前線や湿った空気、強い日射の影響で曇りや雨の日が多くなりましたが、高気圧に覆われて晴れた日もありました。平均気温は全地点でかなり高くなりました。

〔下旬〕前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりましたが、高気圧に覆われて晴れた日もありました。平均気温は香南を除く全地点でかなり高くなりました。

【10月】天気は数日の周期で変わり、低気圧や前線の影響で31日は全地点で大雨となりました。

平年と比べ、平均気温は全地点でかなり高くなり、高松では10月の日最低気温の高い方からの値が、多度津では10月の日最低気温の高い方からと月平均気温の高い方からの値が統計開始以来の1位となりました。

〔上旬〕前半は低気圧や前線、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりましたが、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。平均気温は全地点でかなり高くなりました。

〔中旬〕天気は数日の周期で変わりましたが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりました。平均気温は全地点でかなり高くなりました。

〔下旬〕天気は数日の周期で変わり、低気圧や前線の影響で31日は全地点で大雨となりました。降水量は多くの地点でかなり多くなりました。

【11月】高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、寒気の影響で曇りや雨の日もありました。

平年と比べ、降水量は多くの地点でかなり少くなりました。

〔上旬〕天気は数日の周期で変わりました。

〔中旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。降水量は滝宮を除く全地点でかなり少くなりました。

〔下旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。日照時間は全地点でかなり多くなりました。

【12月】天気は周期的に変わりました。冬型の気圧配置が長続きせず、高気圧に覆われる日が多くなりました。

平年と比べ、日照時間は多くの地点でかなり多くなりました。

〔上旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。

日照時間は財田を除く地点でかなり多く、降水量は全地点でかなり少くなりました。

〔中旬〕天気は数日の周期で変わりました。

〔下旬〕天気は数日の周期で変わりました。

【1月】上旬と下旬は冬型の気圧配置となりやすく、中旬は高気圧に覆われやすく、月を通して低気圧の影響を受けにくくなりました。

平年と比べ、日照時間は多くの地点でかなり多くなり、降水量は竜王山を除く地点でかなり少くなりました。そして、多くの地点で統計開始以来、1月として1位の少雨となりました。

〔上旬〕寒気や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりましたが、高気圧に覆われて晴れた日もありました。

平年と比べ、降水量は竜王山を除く地点でかなり少くなりました。

〔中旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、前線や寒気の影響で雨や雪の日もありま

した。平年と比べ、平均気温は引田を除く地点でかなり高く、日照時間は全地点でかなり多くなり、降水量は竜王山を除く地点でかなり少なくなりました。

〔下旬〕寒気や湿った空気の影響が続いたため、晴れた日もありましたが雨や雪の降った日が多くなりました。平年と比べ、降水量は竜王山を除く地点でかなり少なくなりました。

【2月】冬型の気圧配置が長続きせず、高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。25日は前線や低気圧の影響でまとまった雨が降り、滝宮、香南、財田では2月の日降水量の値が、統計開始以来の1位となりました。

平年と比べ、月平均気温は財田を除く地点でかなり高くなり、香南では2月の日最高気温の高い方からの値が、統計開始以来の1位となりました。

また、2月22日に四国地方で「春一番」が吹きました。

〔上旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、前線や寒気の影響で雨や雪の日もありました。

〔中旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の日もありました。

〔下旬〕前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなり、25日は大雨となったところがありました。平年と比べ、平均気温は全地点でかなり高くなり、降水量は内海を除く地点でかなり多くなりました。

【3月】天気は数日の周期で変わりました。31日は低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、引田では風速15メートル以上の強い風が吹きました。

平年と比べ、日照時間は多くの地点でかなり多くなりました。内海、香南、引田では3月の日最高気温の高い方からの値が、引田では3月の日最大風速・風向、日最大瞬間風速・風向の値が統計開始以来の1位となりました。

〔上旬〕天気は数日の周期で変わりました。

〔中旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線の影響で雨の日もありました。平年と比べ、日照時間は全地点でかなり多くなりました。

〔下旬〕高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、気圧の谷や湿った空気の影響で雨の日もありました。平年と比べ、平均気温は全地点でかなり高くなりました。

(資料：高松地方气象台提供)

2) 旬毎の値（主要要素）

＜高松：2025年4月～2026年3月＞

		平均気温(℃)		最高気温(℃)		最低気温(℃)		降水量の合計(mm)		日照時間(h)	
		本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比(%)	本年	平年比(%)
4月	上旬	13.4	0.5	18.7	0.7	8.4	0.3	11.5	43.0	75.9	120.0
	中旬	15.8	0.9	21.4	1.5	10.8	0.7	9.0	36.0	67.2	105.0
	下旬	17.6	1.2	22.9	1.3	12.5	1.0	7.0	31.0	73.0	109.0
5月	上旬	17.9	-0.8	22.8	-1.1	13.3	-0.6	48.0	176.0	77.9	115.0
	中旬	21.0	1.6	26.2	1.8	16.5	1.7	12.5	35.0	68.8	102.0
	下旬	20.4	-0.6	24.4	-1.6	17.0	0.5	21.0	56.0	44.5	59.0
6月	上旬	21.8	-0.3	25.7	-1.0	18.5	0.4	70.5	296.0	35.0	55.0
	中旬	26.0	2.7	30.7	3.2	22.4	2.5	21.0	38.0	49.8	93.0
	下旬	27.8	3.3	32.4	3.9	24.1	2.6	7.5	10.0	82.5	200.0
7月	上旬	30.8	4.7	36.2	6.0	27.0	4.1	0.0	0.0	102.5	208.0
	中旬	29.3	1.8	33.9	2.2	25.4	1.3	32.0	60.0	70.2	116.0
	下旬	30.9	2.2	36.4	3.4	26.4	1.3	0.0	0.0	136.6	166.0
8月	上旬	30.8	1.6	35.3	1.7	26.8	1.2	44.0	105.0	77.8	102.0
	中旬	30.2	1.4	35.0	1.8	26.7	1.4	6.0	24.0	78.9	111.0
	下旬	30.8	2.9	35.5	3.3	27.1	2.8	2.5	6.0	90.9	124.0
9月	上旬	29.9	3.4	34.7	4.0	26.2	3.1	97.0	189.0	75.1	129.0
	中旬	28.3	3.4	32.4	3.4	24.7	3.3	95.5	171.0	54.4	101.0
	下旬	25.0	2.3	28.5	1.9	21.6	2.5	7.5	13.0	39.2	82.0
10月	上旬	24.3	3.2	28.3	3.2	20.8	3.4	9.5	21.0	60.5	121.0
	中旬	23.8	4.6	27.0	3.6	20.6	5.4	22.0	60.0	39.0	71.0
	下旬	16.8	-0.2	20.3	-1.0	13.7	0.7	73.0	191.0	53.6	90.0
11月	上旬	15.5	0.3	19.7	0.2	11.2	0.2	23.0	129.0	49.0	94.0
	中旬	13.1	-0.1	17.8	0.5	8.9	-0.3	0.0	0.0	61.4	132.0
	下旬	12.1	0.7	16.9	1.4	7.4	0.3	5.0	31.0	65.8	141.0
12月	上旬	9.6	0.1	14.6	1.0	4.8	-0.6	0.0	0.0	66.7	139.0
	中旬	9.0	1.1	13.3	1.6	4.9	0.8	9.0	62.0	52.7	120.0
	下旬	8.2	1.0	11.7	0.6	4.2	0.9	8.5	51.0	50.4	99.0
1月	上旬	6.4	0.0	10.6	0.2	1.9	-0.6	0.0	0.0	57.7	119.0
	中旬	7.3	1.4	13.1	3.5	2.0	-0.2	0.5	3.0	65.9	148.0
	下旬	4.2	-1.2	8.0	-1.2	1.1	-0.6	0.0	0.0	58.1	120.0
2月	上旬	5.3	-0.2	10.2	0.5	0.9	-0.7	2.0	18.0	60.4	125.0
	中旬	7.8	1.5	12.3	1.8	3.6	1.4	5.0	29.0	60.3	118.0
	下旬	11.3	4.1	15.6	4.0	6.7	3.8	41.5	240.0	42.3	97.0
3月	上旬	8.6	0.4	12.4	-0.2	4.7	0.7	21.5	88.0	62.9	123.0
	中旬	8.9	-0.4	14.2	0.0	3.8	-0.8	10.0	38.0	78.7	134.0
	下旬	13.2	2.5	18.7	3.2	8.3	2.2	37.0	121.0	74.0	114.0


資料：高松地方気象台観測値

＜滝宮：2025 年 4 月～2026 年 3 月＞

		平均気温(℃)		最高気温(℃)		最低気温(℃)		降水量の合計(mm)		日照時間(h)	
		本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比(%)	本年	平年比(%)
4月	上旬	12.0	0.3	19.2	1.2	5.1	-0.4	13.0	48.0	78.4	127.0
	中旬	14.8	1.1	21.7	1.8	8.1	0.5	23.5	85.0	68.4	109.0
	下旬	16.0	0.7	23.2	1.4	8.8	-0.1	15.5	63.0	70.5	107.0
5月	上旬	16.4	-1.2	22.5	-1.6	9.8	-1.6	54.5	180.0	72.7	112.0
	中旬	19.7	1.4	26.5	1.9	14.0	1.8	18.5	48.0	66.4	103.0
	下旬	19.3	-0.5	24.3	-1.9	15.0	1.2	22.0	52.0	42.6	58.0
6月	上旬	20.7	-0.3	25.7	-1.2	15.9	0.3	71.0	267.0	49.7	84.0
	中旬	24.8	2.5	30.9	3.4	20.1	2.2	26.0	44.0	51.6	100.0
	下旬	26.8	3.2	32.8	4.5	21.6	1.7	6.0	8.0	77.6	200.0
7月	上旬	29.1	3.9	35.7	5.7	24.0	2.7	34.5	41.0	104.9	218.0
	中旬	27.6	1.2	33.5	1.9	22.8	0.5	33.5	68.0	69.6	116.0
	下旬	29.3	1.8	36.4	3.4	23.1	0.0	0.0	0.0	127.3	156.0
8月	上旬	29.2	1.3	34.8	1.1	24.2	0.8	66.5	168.0	77.7	103.0
	中旬	28.8	1.3	34.8	1.6	24.3	1.3	6.0	22.0	86.6	124.0
	下旬	29.1	2.6	35.3	3.1	24.3	2.2	26.0	66.0	93.3	130.0
9月	上旬	28.2	3.1	34.2	3.6	23.8	2.9	105.5	174.0	73.1	132.0
	中旬	26.9	3.4	32.2	3.3	22.9	3.7	64.5	126.0	55.8	109.0
	下旬	23.3	2.2	28.2	1.8	19.0	2.3	21.5	37.0	37.8	82.0
10月	上旬	22.3	2.8	28.1	3.2	18.0	3.1	12.0	28.0	58.3	119.0
	中旬	22.2	4.8	27.1	3.9	17.8	5.3	15.0	40.0	38.3	72.0
	下旬	14.8	-0.5	19.4	-1.5	10.7	0.3	70.5	181.0	53.0	93.0
11月	上旬	13.6	0.1	19.3	0.0	8.3	-0.1	18.5	89.0	49.0	96.0
	中旬	11.1	-0.5	17.5	0.6	6.0	-0.6	1.5	6.0	58.5	129.0
	下旬	10.3	0.6	17.1	2.0	4.3	-0.3	9.0	50.0	64.7	145.0
12月	上旬	8.0	0.2	14.1	1.0	2.3	-0.7	0.0	0.0	60.4	138.0
	中旬	7.4	0.9	13.5	2.3	2.1	0.3	15.5	104.0	53.4	135.0
	下旬	6.7	1.0	11.3	0.7	2.0	0.9	10.5	56.0	40.7	89.0
1月	上旬	5.1	0.1	9.9	0.0	-0.6	-0.8	0.0	0.0	50.9	115.0
	中旬	6.1	1.6	13.0	3.9	-0.5	-0.5	0.5	3.0	62.1	150.0
	下旬	3.3	-0.8	7.7	-0.9	-0.8	-0.5	0.0	0.0	52.9	114.0
2月	上旬	4.0	-0.2	9.9	0.7	-1.4	-0.8	3.5	27.0	56.6	123.0
	中旬	6.2	1.2	12.7	2.6	0.6	0.5	7.0	38.0	62.5	130.0
	下旬	10.5	4.7	16.2	4.9	4.1	3.7	47.0	267.0	40.4	92.0
3月	上旬	7.2	0.2	12.6	0.4	1.7	0.0	25.5	101.0	62.1	125.0
	中旬	7.3	-0.8	14.3	0.3	0.3	-1.7	13.5	48.0	74.3	134.0
	下旬	11.6	2.1	19.1	3.7	5.0	1.4	44.0	138.0	73.8	118.0

資料：滝宮アメダス観測値

3) 半旬別気象図 【高松市伏石町：2025年4月～2026年3月】



半旬別気象図 【綾川町滝宮：2025年4月～2026年3月】

