

3 月 8 日にプランクトン調査（播磨灘）を行いましたので、その結果をお知らせします。

【概況】

- ・貝毒の原因となるアレキサンドリウム属の出現が 2 地点で確認されました。
- ・魚毒性を示す有害プランクトンの出現は確認されませんでした。
- ・ユーカンピアの出現が確認されました。
- ・その他の小型珪藻類は低密度でした。

表：2023 年 3 月 8 日 プランクトン調査結果（海水 1 ミリリットルあたりの細胞数）

調査地点	水深 (m)	アレキサンドリウム属	シャットネラ属	カレニア・ ミキモトイ	コクロディニウム・ ポリクリコイデス	ユーカンピア
KA1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
KA2	0	<u>0.3</u>	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
KA3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KA4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KA5	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KA6	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	<u>0.1</u>	0.0	0.0	0.0	0.0
KA7	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K2	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K4	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T3	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
屋島湾	0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
千振 (臨時)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2
	10	0.0	0.0	0.0	0.0	57.3
妙見 (臨時)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
	10	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3
櫃石 (臨時)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


* 試水は 200mL を 10 mL に濃縮して、そのうち 1 mL 中のプランクトンを計数しています(20 倍濃縮)。

【有害・有毒プランクトンに関するお問い合わせ】

香川県農政水産部 赤潮研究所(担当:小川・松下) 電話 087-843-6511

香川県農政水産部 水産課漁業振興・流通グループ(担当:和田・岡田) 電話 087-832-3471

図：調査定点（播磨灘：貝毒プランクトン調査）



* 貝毒プランクトン調査は合計 12 定点(KA1~7、K1、2、4、T3、屋島湾)で行っています。

【参考】表：香川県の有害・有毒プランクトンの基準密度

種名	注意基準	警戒基準
シャットネラ・アンティカ	1 細胞/mL (3 種の合計値)	10 細胞/mL (3 種の合計値)
シャットネラ・マリーナ		
シャットネラ・オバータ		
カレニア・ミキモトイ	10 細胞/mL	500 細胞/mL
コクロディニウム・ポリクリコイデス	100 細胞/mL	1000 細胞/mL
At complex (旧) <i>A. tamarense</i> (旧称)アレキサンドリウム・タマレンセ	—	5 細胞/mL
At complex(旧) <i>A. catenella</i> (旧称)アレキサンドリウム・カテネラ	—	50 細胞/mL