## （１０） いちじく

| 防除法<br>病害虫名 | 防除のポイント | 薬剤防除<br>防除時期 | RACコード | 薬剤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 疫病<br>*Phytophthora palmivora* | 1.密植を避け、採光、通風を図る。<br>2.病枝は切り取る。なお、病葉や病果は土中に埋没する等処分する。<br>3.敷き藁等でマルチをする。<br>**〈薬剤使用の特記事項〉**<br>1.Ｚボルドー、ムッシュボルドーＤＦには炭酸カルシウム水和剤（クレフノン）を加用する。 | ５～７月<br>（２～３回） | 11<br>21<br>40<br>M1<br>M1<br>M5 | アミスター１０フロアブル<br>ランマンフロアブル<br>レーバスフロアブル<br>Ｚボルドー<br>ムッシュボルドーＤＦ<br>ダコニール１０００ |
| 2 黒かび病<br>*Rhizopus stolonifer* var. *stolonifer* | 1.収穫は晴天の日にする。<br>2.発病果は集めて土中に埋没する。 | 収穫前 | 1<br>M5 | トップジンＭ水和剤<br>ダコニール１０００ |
| 3 そうか病<br>*Sphaceloma caricae* | 1.樹勢を適正に保つように肥培管理を行う。 | ５月上旬<br>～７月上旬 | 1<br>3<br>11 | トップジンＭ水和剤<br>トリフミン水和剤<br>アミスター１０フロアブル |
| 4 さび病<br>*Phakopsora nishidana* | 1.被害葉は集めて処分する。<br>2.結果枝の密度を減らし、通風を図る。 | ７月～９月 | 3<br>3<br>3<br>7<br>7<br>11<br>M5 | トリフミン水和剤<br>ラリー水和剤<br>アンビルフロアブル<br>フルーツセイバー<br>カナメフロアブル<br>アミスター１０フロアブル<br>ダコニール１０００ |
| 5 株枯病<br>*Ceratocystis ficicola* | 1.罹病苗を持ち込まない。<br>2.育苗は未発生地で行う。<br>**〈薬剤使用の特記事項〉**<br>1.ＩＣボルドー６６Ｄは新根に薬害が発生するおそれがあるので定植1年目までの苗木には使用をさけること。<br>2.オンリーワンフロアブルは生育抑制などの薬害のおそれがあるので、ポット栽培などの根域が抑制される栽培条件や、移植一年目の幼木での使用は避けること。 | 定植時 | 1<br>3<br>M1 | トップジンＭ水和剤<br>トリフミン水和剤<br>ＩＣボルドー６６Ｄ |
| | | 生育期<br>（５～10月） | 1<br>3<br>3<br>M1 | トップジンＭ水和剤<br>トリフミン水和剤<br>オンリーワンフロアブル<br>ＩＣボルドー６６Ｄ |
| | | 収穫後～休眠期 | 1 | トップジンＭオイルペースト |
| 6 切り口及び傷口のゆ合促進 | | せん定整枝時、病患部削り取り直後及び病枝切除後 | 1 | トップジンＭペースト |
| 7 カミキリムシ類<br>クワカミキリ<br>キボシカミキリ | 1.成虫の捕殺及び卵、幼虫を刺殺する。<br>2.被害の枝を剪除する。<br>**〈薬剤使用の特記事項〉**<br>1.モスピラン顆粒水溶剤はキボシカミキリに登録がある。<br>2.園芸用キンチョールＥはクワカミキリに登録がある。<br>3.ピレスロイド系剤(RACコード3A)の注意事項<br>・蚕毒が特に強いので注意する。<br>・散布後、ハダニ類が増えることがあるので注意する。 | ４～７月 | 1B<br>4A<br>4A | ガットサイドＳ<br>モスピラン顆粒水溶剤<br>ダントツ水溶剤 |
| | | 食入後 | 3A | 園芸用キンチョールＥ |

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

いちじく

| 防除法<br>病害虫名 | 防除のポイント | 薬剤防除 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 防除時期 | RACコード | 薬剤 |
| 8 アザミウマ類 | 1.園周辺の雑草を処理する。<br>2.シルバーマルチ等をすると忌避効果がある。<br>**〈薬剤使用の特記事項〉**<br>1.コテツフロアブルはヒラズハナアザミウマでの登録である。<br>2.ピレスロイド系剤(RACコード3A)の注意事項<br>・蚕毒が特に強いので注意する。<br>・散布後、ハダニ類が増えることがあるので注意する。 | 発生初期 | 3A<br>3A<br>4A<br>4A<br>5<br>5<br>13<br>28 | アディオン乳剤<br>スカウトフロアブル<br>モスピラン顆粒水溶剤<br>ダントツ水溶剤<br>スピノエース顆粒水和剤<br>ディアナWDG<br>コテツフロアブル<br>エクシレルSE |
| 9 カイガラムシ類 | 1.寄生密度の高い枝を切り落とす。 | 発芽前 | UN<br>4C | 石灰硫黄合剤<br>トランスフォームフロアブル |
| 10 ハダニ類 | 1.下草、周辺雑草を処分する。<br>**〈薬剤使用の特記事項〉**<br>1.ピラニカ水和剤、サンマイト水和剤はイチジクモンサビダニにも登録がある。<br>2.コテツフロアブルはカンザワハダニでの登録である。<br>3.ピレスロイド系剤(RACコード3A)の注意事項<br>・蚕毒が特に強いので注意する。<br>・散布後、ハダニ類が増えることがあるので注意する。 | 発生初期<br>(5月から) | 3A<br>10A<br>10B<br>13<br>20D<br>21A<br>21A<br>25A<br>－ | アーデント水和剤<br>ニッソラン水和剤<br>バロックフロアブル<br>コテツフロアブル<br>マイトコーネフロアブル<br>ピラニカ水和剤<br>サンマイト水和剤<br>ダニサラバフロアブル<br>サンクリスタル乳剤 |
| 11 ハマキムシ類 | 1.被害葉は見つけ次第除去する。 | 発生初期 | 11A<br>11A<br>11A<br>11A<br>11A<br>11A<br>11A | ゼンターリ顆粒水和剤<br>デルフィン顆粒水和剤<br>エスマルクDF<br>クオークフロアブル<br>ファイブスター顆粒水和剤<br>チューンアップ顆粒水和剤<br>トアロー水和剤CT |
| 12 イチジクヒトリモドキ | 1.葉裏に寄生している若齢幼虫集団を取り除いて処分する。<br>**〈薬剤使用の特記事項〉**<br>1.ピレスロイド系剤(RACコード3A)の注意事項<br>・蚕毒が特に強いので注意する。<br>・散布後、ハダニ類が増えることがあるので注意する。 | 発生初期 | 3A<br>4A | アディオン乳剤<br>モスピラン顆粒水溶剤 |
| 13 ケムシ類 | | 発生初期 | 11A<br>11A<br>11A | デルフィン顆粒水和剤<br>エスマルクDF<br>ファイブスター顆粒水和剤 |
| 14 土壌線虫<br>ネコブセンチュウ | 1.有機物の施用や冬期の耕耘を行い、根の活力を高める。<br>2.寄生した苗を本圃に持ち込まない。<br>3.汚染場所から線虫類を持ち込まないように注意する。<br>**〈薬剤使用の特記事項〉**<br>1.ネマトリンエース粒剤は樹冠下全面に処理し、栽培様式から見て可能で有れば、軽く土壌混和し、散水することが望ましい。<br>2.クロルピクリン剤はパストリア水和剤に影響を与えるので併用しない。<br>3.パストリア水和剤は生育期のいちじくに使用する場合は、土壌表面散布後灌水等により土壌中に均等に分布させる。 | 植付前、生育期 | 1B<br>－(生) | ネマトリンエース粒剤<br>(生)パストリア水和剤 |

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する