（9） すもも

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬剤防除 防除時期	RACコード	薬剤
1 黒斑病 *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni*	1.かたよった施肥は発病をしやすくするので、適正な肥料を施用する。 2.せん定の際に、病枝を切り取る。 3.防風樹を植える。 4.栽植に当たっては風当りの弱い場所を選ぶ。 **〈薬剤使用の特記事項〉** 1.４～５月に重点防除する。 2.ビューティ、メスレー、ケルシーなどの品種は発生が多い。	休眠期	M1 M1 M1	ＩＣボルドー４１２ ムッシュボルドーＤＦ Ｚボルドー
		４月中旬 ～６月下旬	25 25 U18	アグレプト水和剤 マイシン２０水和剤 バリダシン液剤５
2 ふくろみ病 *Taphrina pruni*	1.被害果を見つけしだい除去し、処分する。	発芽前	M3	トレノックスフロアブル
3 灰星病 *Monilinia fructicola* *Monilinia fructigena*	1.花腐れ、実腐れ（収穫期の被害果を含む）を除去し、土中に埋没する。 2.密植、多肥、過繁茂を避ける。 3.園を清掃し、被害枝をせん除する。 4.もも、うめ、あんず、おうとうが付近にある場合は、これらの被害果等の処分もあわせて行う。 **〈薬剤使用の特記事項〉** 1.収穫期の約20日前から果実に散布する。 2.アフェットフロアブルは黒星病にも登録がある。	開花始め ４月上旬 ～６月下旬	1 2 2 3 3 3 3 7 7 7 7 11 M7 M7	トップジンＭ水和剤 ロブラール水和剤 スミレックス水和剤 トリフミン水和剤 オーシャイン水和剤 オーシャインフロアブル アンビルフロアブル アフェットフロアブル フルーツセイバー パレード１５フロアブル カナメフロアブル ファンタジスタ顆粒水和剤 ベルクート水和剤 ベルクートフロアブル
4 切り口及び傷口のゆ合促進		せん定整枝時、病患部削り取り直後及び病枝切除後	1	トップジンＭペースト
5 アブラムシ類	1.下草、周辺雑草を処分する。 **〈薬剤使用の特記事項〉** 1.アドマイヤー水和剤・顆粒水和剤は品種により、葉に薬害を生ずることがあるので注意する。 2.本虫対象に防除を実施しているところでは、シンクイムシ類、ハマキムシ類の発生が少ない。 3.ピレスロイド系剤(RACコード3A)の注意事項 ・蚕毒が特に強いので注意する。 ・散布後、ハダニ類が増えることがあるので注意する。	４月上旬 ～６月上旬	1A 3A 3A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4C 14 23	オリオン水和剤４０ アディオンフロアブル スカウトフロアブル アドマイヤー水和剤 アドマイヤー顆粒水和剤 モスピラン顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤 ダントツ水溶剤 トランスフォームフロアブル パダンＳＧ水溶剤 モベントフロアブル
6 カイガラムシ類	1.タワシなどでこすり落とす。2.寄生の多い枝は切除して処分する。 **〈薬剤使用の特記事項〉** 1.本虫対象に石灰硫黄合剤で防除を実施しているところでは、ふくろみ病の発生が少ない。 2.マシン油乳剤をハウスで使用する場合は12月上旬までとする。 3.本虫対象にマシン油乳剤で防除を実施しているところでは、ハダニ類の発生が少ない。 4.アプロード水和剤は定着直後の幼虫に散布する。	発芽前	UN UNM UNM UNM UNM UNM	石灰硫黄合剤 機械油乳剤９５ トモノール スプレーオイル トモノールＳ ハーベストオイル
		４月下旬 ～５月中旬 ７月上旬 ～７月中旬 ８月下旬 ～９月下旬	4C 9B 16 23	トランスフォームフロアブル コルト顆粒水和剤 アプロード水和剤 モベントフロアブル

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する

すもも

防除法 病害虫名	防除のポイント	薬剤防除		
		防除時期	RACコード	薬剤
7 カメムシ類	1.ピレスロイド系剤(RACコード3A)の注意事項 ・蚕毒が特に強いので注意する。 ・散布後、ハダニ類が増えることがあるので注意する。	発生期 （５～６月）	3A	アグロスリン水和剤
8 ハダニ類	1.下草、周辺雑草を処分する。 2.株元にバンドを巻き、粘着剤で捕獲する。	発生期	10B 20B 20D 21A 25A UN	バロックフロアブル カネマイトフロアブル マイトコーネフロアブル サンマイト水和剤 ダニサラバフロアブル ダニオーテフロアブル
9 シンクイムシ類	1.粗皮下の越冬幼虫を捕殺する。 **〈薬剤使用の特記事項〉** 1.ピレスロイド系剤(RACコード3A)の注意事項 ・蚕毒が特に強いので注意する。 ・散布後、ハダニ類が増えることがあるので注意する。	４月下旬 ～８月中旬	1B 3A 3A 3A 4A 4A 28 28 28 28	ダイアジノン水和剤３４ スカウトフロアブル アディオンフロアブル アーデントフロアブル モスピラン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤 フェニックス顆粒水和剤 フェニックスフロアブル ヨーバルフロアブル エクシレルＳＥ
10 ハマキムシ類		発生初期	11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 28	ゼンターリ顆粒水和剤 デルフィン顆粒水和剤 エスマルクＤＦ クオークフロアブル ファイブスター顆粒水和剤 チューンアップ顆粒水和剤 トアロー水和剤ＣＴ フェニックスフロアブル
11 ケムシ類	1.せん定時に卵がついている枝を切り取る。	発生初期	11A 11A 11A 28 28 28 28	デルフィン顆粒水和剤 エスマルクＤＦ ファイブスター顆粒水和剤 フェニックスフロアブル フェニックス顆粒水和剤 ヨーバルフロアブル エクシレルＳＥ
12 コスカシバ	1.秋期に虫糞の出ているところを小槌でたたき、若齢幼虫を圧殺する。 2.４月に小刀で加害部分を削って、幼虫を捕殺する。 **〈薬剤使用の特記事項〉** 1.ピレスロイド系剤(RACコード3A)の注意事項 ・蚕毒が特に強いので注意する。 ・散布後、ハダニ類が増えることがあるので注意する。	発生初期	3A	ロビンフッド

農薬の使用方法や注意事項はラベルで確認する