

# 麻しん(はしか)について

2024年2月、アラブ首長国連邦から帰国した男女5人が、麻しんウイルスに感染していることが報告されました。

はしかにかかったことがなく、ワクチン接種がお済みでない方は速やかに接種していただくことをお勧めします。

※本年において、3月15日現在で、香川県での患者発生の届出はありません。

## ○麻しん(はしか)とは？

感染力が極めて強い「麻しんウイルス」に感染することによって発症する感染症です。免疫がなければ、感染者と同じ空間にいただけで感染し発症する危険性が高くなります。

麻しん(はしか)を疑う症状がある場合は、更なる感染拡大の予防のため、公共交通機関の使用や、人が集まる場所に行くのは避けていただき、事前に医療機関に電話連絡し、症状や行動歴等を伝え、医療機関の指示に従い受診してください。

## ○感染経路は？

空気感染、せきやくしゃみ、会話などによる飛沫感染、患者の唾液や鼻水の中にあるウイルスに直接または間接的に触れてしまうことで感染します。

## ○潜伏期間と症状は？

感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われていています。死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われていています。

## 予防するためには？

麻しん(はしか)は、ワクチン(麻しん風しん混合ワクチン)を2回接種することで、予防することができます。

麻しん風しん混合(MR)ワクチンの定期予防接種対象者は、①1歳児、②小学校入学前1年間です。(定期予防接種については、お住まいの市町にお問合せください。)

また、定期予防接種対象者以外の方についても、ご自身を守るために母子健康手帳等で予防接種歴や麻しん(はしか)にかかったことがあるか確認を行い、1歳以上で未接種の場合、小学生以上で2回の接種記録がない場合、麻しんにかかったことを検査で確認できていない場合、麻しん(はしか)に対する抗体免疫がないか低い場合は、予防接種をおすすめします。

<参考>

	麻しんワクチン接種の状況 (0歳での接種は接種回数に含めません)
昭和47年9月30日以前生まれの方	定期接種は行われていないが、自然に麻しん(はしか)にかかったことが多い世代でもあり、免疫がある人となない人がいる。
昭和47年10月1日～平成2年4月1日以前生まれの方	定期接種対象者だが、接種回数が1回であり、麻しん(はしか)に対する免疫が低い可能性がある。
平成2年4月以降生まれの方	定期接種対象者で、2回接種の世代。母子健康手帳を確認し、1歳以上で2回接種していれば、感染の可能性は低い。

※過去に、麻しん(はしか)にかかったことが確実である場合は、免疫を持っていると考えられます。

